




1
1
30
ROMA

72 VITT. EMANUELE







8-24

PROSPETTO
DELLE
PIANTE VASCOLARI

SPONTANEE O COMUNEMENTE COLTIVATE
NELLA PROVINCIA DI BRESCIA
AGGIUNTE LE ESOTICHE

che hanno uso e nome volgare

DISPOSTE IN FAMIGLIE NATURALI

dal Professore

ELIA ZERSI

—

Estratti dai Commentari dell'Ateneo di Brescia
per gli anni 1868, 1869.

Prezzo L. 2.



h. 11.

207.26. I 30

PROSPETTO
DELLE
PIANTE VASCOLARI

SPONTANEE O COMUNEMENTE COLTIVATE

NELLA PROVINCIA DI BRESCIA

AGGIUNTE LE ESOTICHE

che hanno uso e nome volgare

DISPOSTE IN FAMIGLIE NATURALI

dal Professore

ELIA ZERSI



BRESCIA

TIPOGRAFIA DI F. APOLLONIO

1871.



Se il presente opuscoletto pervenisse per avventura alle mani d'alcun provetto Botanico, depongalo pur tosto senza scrupolo; perocchè egli nulla vi troverebbe che valga la pena del leggerlo, ed offra alla scienza qualche notevole incremento. Giacchè, siccome le nostre prealpi, le nostre valli, le rive de' laghi nostri, le torbiere, le *lame*, la pianura tutta furono da distintissimi botanici prima d'ora replicatamente, estesamente e minutamente ricercate, così i novelli investigatori della Flora nostra vennero quasi ridotti alla condizione di Alessandro Magno, che, giovinetto, piangeva dolendosi, che il padre suo, conquistando tutto il mondo, nulla più lasciassegli a conquistare: o tutto al più a rimangersi contenti alla descrizione di alcune varietà, o mostruosità singolari.

Siccome però nè il Bertoloni, che nella sua opera colossale, la *Flora Italica*, inserì pur molte delle nostre specie vegetabili più importanti, che il De-Bracht, lo Zantedeschi, il Pollini, il Cesati sollecciti gli spedivano; nè il Pollini stesso, che nella *Flora Veronese* intese ad abbracciare quella di tutta l'Italia settentrionale, poterono, per la natura stessa dell'opere loro, notare di tutte le specie bresciane le speciali località; ed il barone Cesati nel suo *Prospetto delle piante fanerògame della Lombardia* volle limitarsi alla esposizione dei soli nomi; così scopo di questo lavoro è di presentare un prospetto possibilmente completo delle piante vascolari della provincia Bresciana, indicandosi delle meno volgari anche la stazione precisa, ove a mano sicura si possano rinvenire.

Il tratto di paese adunque abbracciato dal presente *Prospetto* è quello che resta circoscritto dai limiti attuali della provincia Bresciana, della Val Camonica in fuori; perocchè questa regione mi parve abbastanza illustrata nel *Prospetto della Flora della provincia di Bergamo* del d.r Lorenzo Rota. Nè tampoco vi si accoglie quel lembo del Mantovano, che, per necessità politiche, rimase per alcun tempo annesso alla provincia nostra; il quale d'altra parte venne già naturalmente compreso nella *Storia naturale di Mantova* del prof. Lanfossi.

Il metodo di classificazione da me seguito è quello delle *Famiglie naturali* di De-Candolle, e precisamente in quell'ordine che appare nella seconda edizione della *Sinopsis Floræ Germanicæ et Helveticæ* del Koch. Ma nella considerazione che pei giovani principianti, cui è diretto questo

lavoro, tornerebbe per avventura più facile la determinazione dei generi e della specie secondo il *Sistema sessuale* di Linnèo, seguito dal Bertoloni, così credetti opportuno soggiungere al nome di ciascun genere, ed, ove occorse, anche a quello delle singole specie, la corrispondenza delle classi e degli ordini Linneani, con quelle modificazioni che al Bertoloni stesso parve necessario di applicarvi. E nell'intento di appianare maggiormente le prime vie al giovane che s'accingesse a tali studj, per verità un po' ardui da principio, oltre alle denominazioni italiane applicate a ciascuno de' nomi sistematici, si troveranno soggiunte anche moltissime del nostro vernacolo, tratte in parte dal *Vocabolario bresciano-italiano* del Melchiori, nel quale si dovettero emendare alcune inesattezze; in parte raccolte dalla viva voce de' pastori e degli agricoltori nelle mie frequentissime escursioni. Molti altri di questi nomi volgari resteranno, senza dubbio, ancora da raccogliere; e parecchi de' notati non corrisponderanno a quelli che si danno all'identica specie in altri luoghi della provincia: ma spero che si vorrà prima por mente a ciò, che specie moltissime, o poco appariscenti all'occhio volgare, o di niuna pratica applicazione, non hanno nome vernacolo, come a mo' d'esempio molti *càrici* e molte *graminacee*; poi perdonare al buon volere il difetto portato dalla qualsiasi difficoltà dell'impresa. Di tali nomi vernacoli si troverà in fine del libro un *Indice alfabetico* in seguito ad altro indice dei generi.

A chi volesse confrontare il numero delle specie spontanee bresciane, qui poste in rassegna, con quello delle bergamasche, quale appare dalla succitata Flora del d.r Rota,

parrà strana la prevalenza del secondo sul primo; molto più se si consideri che le condizioni geografiche e orografiche delle due provincie sono pressochè uguali, anzi, per la splendida plaga Benacese, avvantaggiata la nostra. Sul quale proposito pregherei anzi tutto di considerare, che alla Valle Camonica omessa nel nostro campo di ricerche, e abbracciata in vece in quello della Flora bergamasca, e pur sì ricca in acque sorgenti, in vallette laterali, in pizzi elevatissimi e spesse volte granitici, in ghiacciai, nè ancora affatto strema di boschi, appartengono peculiari specie vegetabili, che nelle nostre più umili montagne in vano si cercherebbero. Poi dovremo qui confessare, che nelle opere degli autori oltremontani, p. es. del Koch, seguito, e talvolta forse esagerato nella Flora bergamasca, o per vaghezza di novità, o gara di autori, od intimo convincimento, parvemi vezzo troppo spinto quello di dilaniare, sopra caratteri molte volte accidentali, una specie già ben definita, in parecchie; e che perciò, anche a costo che mi si tacci di pusillanimità o di presunzione, ho preferito attenermi al nostro grande italiano, il Bertoloni, e raccogliere entro ben determinati confini il numero delle specie. Che se talora, adescato da caratteri, che mi parvero evidenti, trascorsi a scindere una specie Bertoloniana in due o tre specie distinte, anche al presente non posso non risentirne un po' di rimorso.

Corredare delle solite sinonimie le singole specie non era richiesto dalle condizioni d'un semplice prospetto. Si è però creduto, a maggiore ajuto de' giovani che imprendessero i loro studi o sui libri di Bertoloni, o su quelli del Koch, di soggiungere le sinonimie o dell'uno o del-

l'altro di questi due autori dove nella denominazione specifica si trovino discordi.

Mentre posso dire con compiacenza, che quasi tutte le specie vegetabili qui segnate, furono, senza risparmio di tempo, di fatiche e di spesa, dalle mie mani raccolte, e da me stesso determinate, mi trovo in dovere di soggiungere, che alcune, benchè in piccol numero, sfuggirono alle mie ricerche; le quali specie ho tuttavia inserite sulla fede dell'autore che le ascrisse alla provincia nostra, e, a scanso di responsabilità, contrassegnate col nome dell'autore medesimo.

Ma la fisionomia speciale, che per la vegetazione acquista un paese, non si desume soltanto dalle specie erbacee od arboree che spontaneamente vi appariscono: bensì ancora da quelle altre esotiche, che, dall'industria ivi trasportate, e a cielo aperto comunemente coltivate, quasi vi prosperano come nel loro luogo originario. Per questa considerazione, che mi pare di qualche peso, ho allargato, più che non siasi fatto finora dagli autori di flore speciali, il novero delle piante importate, e massimamente di quelle che per lungo e largo uso ottennero un nome volgare; e di parecchie v'ho anche notate le varietà più comuni.

Anzi per completare in qualsiasi modo il Vocabolario bresciano-botanico aggiunti, come appendice ai generi, o alle famiglie, i nomi scientifici e vernacoli, e il luogo di provenienza di molte specie, che, d'impossibile coltura nel paese nostro, offrono tuttavia materia al commercio, alla medicina, alla cucina ed alle industrie.

Questo libro, il quale, come ognuno potè rilevare dalle

cose fin qui discorse, è limitato alle sole *fanerògame*, e alle *crittògame vascolari*, sarà forse seguito da un altro che abbracci le *crittògame cellulari*: tuttavia mi terrei fortunatissimo se questo potesse intanto essere sprone ai giovani bresciani a tentare, sulle nobili orme del Pollini, del Venturi e del Garavaglio, il campo vastissimo e non ancora abbastanza esplorato delle *crittògame*.

RILIEVO

d'alcuni luoghi sul livello dell'Adriatico

M. Gazzo (lago di Garda) estr. sett.	M. 2403
M. Blumone Conf. Tirolese e Camonio alle fonti del Caffaro	» 2844
M. Colombine	» 2209
M. Doss' alto	» 2065
M. Maniva	» 2043
M. Guglielmo	» 1949
Selva piana presso il M. Dragone	» 965
Collio	» 858
Colle Maddalena	» 850
Rocca d'Anfo	» 678
Provaglio	» 650
Mont' Orfano	» 459
Lago d'Idro	» 378
Lavenone	» 346
Gardone V. T.	» 338
Vestone	» 321
Nozza	» 312
Barghe	» 295
Tremosine	» 290
Sabbio	» 278

Vobarno	M. 224
Gavardo	» 203
Lago d' Iseo	» 192
Urago Mella	» 157
Palazzolo	» 152
Fiumieello	» 145
Pontoglio	» 143
Roncadelle	» 132
Ponte Gattello	» 106
Ponte sopra Montechiaro	» 102
Manerbio	» 69, 31
Lago di Garda	» 69, 16
Pavone	» 53
Pontevico	» 53
Foce del Mella	» 41, 30
Brescia { Castello	» 245
{ Pavimento del Duomo nuovo	» 156, 94

I seguenti sono appena approssimativi:

M. Broffione	M. 2500
M. Catino	» 2300
M. Muffetto	» 2150
Vette di Vaja	» 2100
M. Ario	» 2000
Giogo	» 1700
Lago di Vaja	» 1700
M. Desdana	» 1700
M. Rondenino	» 1600
Crux Domini	» 1600
M. Dragone	» 1200
M. Quarone	» 700
Castello di Serle	» 600



PLANTÆ VASCULARES

CLASSIS I.^a

DICOTYLEDONEÆ

SUBCLASSIS I. THALAMIFLORÆ.

ORDO I. RANUNCULACEÆ.

Clematis L. Sist. Sex. Polyandria Polygynia.

C. recta L. It. Vitalbino. Br. *Idasse bastarde*.

Prati e macerie di collina. Aprile-Agosto.

C. Vitalba L. It. Vitalba, Clematite. Br. *Vidàrbola, Idassa, Idorèla, Zuta*.

Siepi e muri dal piano ai monti, volgarissima. Mag. - Ag.

Atragène L. Sist. Sex. Polyandria Polygynia.

A. alpina L. It. Vitalbino dei sassi.

Rupi e selve dei monti Arlo, Pajo, Broffione, Brumino. Giugno-Luglio.

Thalictrum L. Sist. Sex. Polyandria Polygynia.

T. aquilegifolium L. It. Talitto colombino.

Selve umide dei colli e dei monti, frequente (p. es. Costalunga). Maggio-Luglio.

β. Filamentis albis. — Costalunga.

T. alpinum L. It. Pigamo alpino.

Rarissimo. Presso il laghetto del Broffione. Giugno-Luglio.

T. foetidum. L. It. Pigamo puzzolente.

Raro. Rupì della valle d'Inzino. Maggio-Giugno.

T. minus L. It. Erba scopaja.

Colli e monti, frequente (Urago Meila, Guglielmo, Pezzate).
Giugno-Agosto.

T. simplex L. It. Erba scopaja.

Raro. Lungo l'Oglio tra Orzinuovi ed Acquafredda. Giugno.

T. angustifolium Jacq. (*T. flavum* β Bertol.) It. Pigamo,
Erba pina, Ruta selvatica.

Margine dei fossi fra Desenzano e Lonato. Giugno-Luglio.

T. majus Jacq. It. Pigamo ombrellato.

Prati di collina e di monte, freq. (colle Badia). Giug.-Lug.

T. flavum L. It. Pigamo, Erba pina, Ruta selvatica.

Margini de' fossi e de' fiumi, frequente. Giugno-Agosto.

T. elatum Jacq. It. Pigamo gigante.

Raro. Monti fra Limone e il confine tirolese. Giugno-Luglio.

Anemone L. Sist. Sex. Polyandria Polygynia.

A. hepatica L. It. Erba Trinità. Br. *Figadela*.

Luoghi ombrosi dei colli e dei monti, frequentissima. febbrajo-
Aprile. (1).

A. vernalis L. It. Anemolo primaticcio.

Pascoli altissimi delle Colombine. Giugno-Luglio.

A. Pulsatilla L. It. Pulsatilla.

Colli aprici (Maddalena, Tremosine, Tignale). Marzo-Aprile.

β . *montana* Hopp. Colle Badia, Lonato al Tiraculo (2).

A. narcissiflora L. It. Anemone narcissino.

Pascoli montani, frequente (Guglielmo, Muffetto, Fronden,
Colombine). Maggio-Giugno.

A. alpina L. It. Anemolo d'alpe.

Pascoli montani ed alpini, frequente (Guglielmo, Muffetto,
Ario, Cigoletto). Maggio-Giugno.

A. baldensis L. It. Anemolo fragolino.

Rara. M. Rondenino poco distante dal laghetto. Lug.-Ag.

(1) *Anemone hepatica*.

Locus 1. Involucro tetraphyllo. Frequente.

Locus 2. Involucro maximo, foliis lato-ovatis, indivisis, floribus superan-
tibus. A. S. Enaclo. Aprile.

(2) Tum in specie, tum in varietate *involucrum verticillatum, basi connatum*.

A. nemorosa L. Anemolo bianco.

Sponde del Mella, e tutti i colli, frequentissima. Marzo-Apr.

β. *polysepala* (1). In un prato alla Bornada. Aprile.

A. ranunculoides L. It. Anemolo de' boschi.

Luoghi erbosi dal piano ai monti, frequente (Mella, Strone a Verolanuova, Monte Vezegno). Marzo-Aprile.

A. trifolia L. It. Anemone trifogliata.

Luoghi ombrosi de' colli, rara (sponde Benacesi). Mar.-Apr.

Si coltiva comunemente per la bellezza dei fiori:

A. Coronaria. L. originaria dell'Asia.

Adonis L. Sist. Sex. Polyandria Polygynia.

A. aestivalis L. It. Adonides, Camomilla rossa, Occhio del diavolo. Br. *Gosse de sang*.

Fra le messi dei terreni aridi (Montechiaro, Desenzano).

Aprile-Maggio (2).

Ranunculus L. Sist. Sex. Polyandria Polygynia.

R. aquatilis L. (β. Bertol.) It. Ranuncolo soldinello

Stagni e fossi, poco frequente (tra Iseo e Clusane). Mag.-Giug

R. divaricatus Schrank (*R. circinatus* Bertol.) It. Ranuncolo a cerchiello.

Stagni e fossi, frequente. Maggio-Settembre.

R. fluitans Lamk (*R. fluviatilis* Wild. Bertol.). It. Peucedano acquajolo.

Acque correnti (Oglio, qua e là). Maggio-Luglio.

R. glacialis L. It. Caralina. Br. *Erba camossera*.

Estreme vette delle Alpi presso le nevi perpetue, discende talvolta nelle prealpi nei recessi nevosi a tramontana.

(Vette del Broffione, raro). Luglio-Agosto.

(1) *Anemone nemorosa*. β. *polysepala*: *Sepalis* 12-16 *oblongo-linearibus*, *pedicellis involucri brevissimis*.

(2) In uno eodemque agro inveni semper individua uberiora ramosa, petalis calyce duplo triploque longioribus, et individua macriora simplicata, petalis calycem vix superantibus: item carpella promiscue apice recto et incurvo, interne dentato, vel edentulo. Itaque Bertolonium acutus sub uno hoc nomine collegi *A. aestivalem* et *A. autumnalem* Kochii.

- R. rutæfolius L. It. Ranunculo coriandolino.**
Pascoli montani ed alpini, raro (Piane sotto M. Catino). Giugno-Luglio.
- R. Seguierii Wild. It. Ranuncolo serpentino.**
Rupi alpine e subalpine, raro (Piane orient. sotto il M. Catino, e a *Gera alta*). Giugno-Luglio.
- R. alpestris L. It. Ranuncolo alpestre.**
Vette alpine e subalpine (Dosso alto, Muffetto, Fronden). Luglio-Agosto.
- R. crenatus L. It. Ranuncolo crenellato.**
Rupi alpine e subalpine (Pajo, Cornablacca, Dosso alto). Giugno-Agosto.
- R. aconitifolius L. It. Piè di cornacchia.**
Selve montane, subalpine ed alpine, frequente (versanti meridionale ed orientale del Guglielmo, M. Muffetto e Cascine di Pesseda). Giugno-Luglio.
- R. pirenaeus L. (R. bupleurifolius DC. Koch.). It. Ranuncolo lanciuola.**
Alpi e prealpi nei luoghi umidi, rarissimo (Vallette erbose del Broffone). Luglio-Agosto.
- R. Flammula L. It. Ranuncolo delle passere.**
Prati umidi e turfosi (Iseo, Poncarale, frequentiss.). Giu.-Ag.
β. reptans L. Prati turfosi ad Iseo.
- R. Lingua L. It. Ranuncolo delle Canne.**
Paludi, frequente (al Castello di Sirmione). Luglio-Agosto.
- R. Ficaria L. It. Chelidonio minore, Favagello. Br. Stele.**
Orti, prati, siepi, rive de' fossi, abbondantissimo. febbrajo-Aprile.
- R. Thora L. It. Erba Tora.**
Rupi e prati montani, frequente (Dragone, Guglielmo, Cornablacca, Fronden). Aprile-Luglio.
- R. Phthora Cesat. (R. brevifolius Ten. Bertol.; R. hybridus DC. Koch.).**
Boschetti montani (Val Bertone presso Caino). Glug-Lugl.
- R. auricomus L. It. Bottoncini d'oro.**
Rupi erbose, raro (presso Tignale). Aprile.

- R. Montanus** Wild. It. Ranuncolo montano.
Alpi e prealpi, freq. (Vette del Guglielmo, Ario, Gera alta, Muffetto, Colombine presso *Ravènola vaga*). Giug.-Lug.
β. Villarsii DC. Ove la specie.
- R. acris** L. It. Batrachio. Br. *Pedenèbol*, *Stele*, *Brüza occ.*
Prati, frequentissimo. Aprile-Ottobre.
- R. lanuginosus** L. It. Ranuncolo lanato.
Luoghi erbosi del piano e dei monti (lungo il Mella a Urago e Collebeato, sommità del Guglielmo, freq.). Mag.-Set.
- R. velutinus** Ten. Bertol. (R. *Haarbachii* D. Not. Ces.).
It. Ranuncolo velutino.
Vicino a Castellara presso Sirmione, raro. Maggio-Giugno.
- R. nemorosus** DC. (R. *montanus* \times Bertol.). It. Ranuncolo de' boschi.
Prati e selve de' monti, poco frequente (presso S. Gottardo, M di Conche). Maggio-Giugno.
- R. repens** L. It. Crescione selvatico, Stelletine. Br. *Pedenèbol de foss*, *Sèleno bastard*.
Rive de' fossi e luoghi umidi, frequentissimo. Aprile-Giugno.
- R. bulbosus** L. It. Lappio, Faugello.
Rive secche e margini dei campi, frequentissimo. Apr.-Giug.
- R. Philonitis** Ehrhart. It. Stroscone.
Prati e messi nella bassa pianura (Verolanuova, S. Gervasio). Maggio-Giugno.
- R. sceleratus** L. It. Appio riso, Erba Sardonia. Br. *Pedenèbol*.
Paludi e fossati, freq. (presso Iseo e Sirmione). Apr.-Mag.
- R. arvensis** L. It. Signorine selvatiche. Br. *Prezoli*, *Sprezoli*.
Nelle messi, frequentissimo. Aprile-Giugno.
- R. parviflorus** L. It. Ranuncolo pargoletto.
Terreni secchi calcari (oliveti a Sirmione e Gargnano).
Aprile Maggio.
Cultivasi per ornamento:
R. asiaticus L. It. Ranuncolo. Br. *Naroncol* dell'Asia.
- Caltha** L. Sist. Sex. Polyandria Polygynia.
C. palustris L. It. Farfarugine. Br. *Cocleariòt*.

Fossi paludosi dei monti (M. Ario, Colombine presso Ravenna), frequente). Aprile-Luglio.

Trollius L. Sist. Sex. Polyandria Polygynia.

T. europæus L. It. Luparia, Vulparia. Br. Rasi.

Pascoli montani e subalpini, frequente (Guglielmo, Corti di Campo Molle, falde del Cigoletto). Giugno-Luglio.

Helleborus L. Sist. Sex. Polyandria Polygynia.

H. niger L. It. Erba Nocca, Rosa di Natale. Br. Campuren.

Luoghi ombrosi di collina, frequente (lungo il Mella, a Collebeato, Nave, Serle, Mondisola). Gennaio-Marzo.

H. viridis L. It. Erba Nocca, Cavolo di lupo. Bres. Campuren vert.

Colli e monti, frequente (S. Gottardo, Maddalena, Collebeato). Febbrajo-Aprile.

H. foetidus L. It. Cavolo di lupo. Br. Erba de biss, Rais de bo, Campuren.

Colline, margini di fossi, frequentissimo (Mella, Badia, Nave, Caino, lungo il Ponale). Febbrajo-Aprile.

Isopyrum L. Sist. Sex. Polyandria Polygynia.

I. thalictroides L. It. Anemolo aquilegino.

Boschetti sulle vette del Dragone, raro. Aprile-Maggio (1).

Nigella L. Sist. Sex. Polyandria Oligogynia.

N. damascena L. It. Anigella, Scapigliata. Bres. Ragn.

Olivetti a Sirmione, frequente. Maggio-Luglio.

Aquilegia L. Sist. Sex. Polyandria Oligogynia.

A. vulgaris L. It. Aquilegia, Amor perfetto. Br. Perfet amur, Calse e braghe.

Tutti i monti delle Valli Trompia e Sabbia. Maggio-Giugno.

β. atrata Koch. M. Dragone.

A. pyrenaica DC. (2). It. Aquilegia mezzana. Br. Perfet amur ecc.

Rupi estreme del monte Cornabla in densi cespugli. Lug.

A. alpina L. It. Aquilegia maggiore. Br. Perfet amur ecc.

(1) In stirpibus Brixianis nectaria semper cucullata, nec tubulosa.

(2) A. diagnosi Kochiana paullo recedit calcaribus apice incurvatis.

Monte Fronden e Dosso alto nel fesso delle rupi (Zanted).
Luglio-Agosto.

Delphinium L. Sist. Sex. Polyandria Oligogynia.

D. Consolida L. It. Cappucci, Consolida regale, Erba cornetta. Br. *Speroncle salvadeghe*.

Campi a frumento, abbondantissima. Maggio-Settembre.

D. Ajacis L. It. Delfinio, Sprone da Cavaliere. Br. *Speronela*.

Originario della Svizzera, del Piemonte e della Liguria, trovasi da noi qua e là quasi spontaneo, e coltivasi nei giardini. Giugno-Settembre.

Il D. Staphisagria L. Br. *Strafusare*, la polvere de' cui semi è a tutti nota, è spontaneo a Nizza e in tutto il litorale d' Italia.

Aconitum L. Sist. Sex. Polyandria Oligogynia.

A. lycoctomum L. It. Lupaja, Strozza lupo. Br. *Erba de piacc*.

Monti e prealpi frequentissimo (Conche, Nave, Dragone, ecc.).
Maggio-Settembre.

A. cernuum Wulf. It. Aconito pannocchiato.

Selve presso Collio, e monti Desdana e Colombine. Giug.-Ag.

A. Cammarum L. It. Cammaro.

Boschi alle falde del monte Cornabla (Zant). Giug.-Lug.

A. Napellus L. It. Aconito, Napello. Br. *Mapèl*.

Monti e prealpi, frequentissimo. Luglio-Settembre.

A. Anthora L. It. Antidòra, Antòra.

Rupi delle Colombine, raro. Luglio-Settembre.

Actaea L. Sist. Sex. Polyandria Monogynia.

A. spicata L. It. Barba di capra.

Siti ombrosi de' monti (Dragone, Guglielmo ecc.). Mag.-Lug.

Paeonia L. Sist. Sex. Polyandria Oligogynia.

P. officinalis L. (P. peregrina Koch). It. Peonia femina.
Br. *Peonie salvadeghe*, *Ræze*.

Boschetti dei colli, frequente (Campiani, S. Eufemia, Dragone, Limone). Maggio-Giugno.

- P. corallina** Retz. It. *Peonia maschio*. Br. *Peonia salvàdegà*.
Selve dei colli e dei monti, rara (colli tra Clusane e Paratico). Maggio.

Segue la famiglin delle Magnoliaceæ, del cui genere Magnolia L. si coltivano per ornamento e per la bellezza dei fiori principalmente le specie seguenti:

- M. glauca* L. dell'America settentrionale.
M. discolor Venten. del Giappone.
M. Yulan Desf. della China.
M. grandiflora L. dell'America settentrionale.

Alle Magnoliaceæ appartiene pure il

Calycanthus præcox L. It. e Br. *Calicanto*; del Giappone.

ORDO II. BERBERIDEÆ.

Berberis L. Sist. Sex. Hexandria Monogynia.

- B. vulgaris* L. It. *Berberi*, *Crespino*. Br. *Crispi*, *Ua de la Madona*.

Colli e monti nelle siepi e nei cespugli, frequentiss. Apr.-Mag.

Epimedium L. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.

- E. alpinum* L. It. *Epimedio*.

Selve dei colli e dei monti (monte Guglielmo lungo il sentiero da Costaricca a Niidi). Apr.-Maggio. — I montanari usano della radice a purgare le vacche dopo il parto.

Seguirebbe la famiglia delle *Menispermæ*, col Genere *Menispermum Còccolus* L. (della Diæcia Dodecandria) It. *Còccola di Levante*, Br. *Còcola*; dell'India.

ORDO III. NYMPHÆACEÆ.

Nymphæa L. Sist. Sex. Polyandria Monogynia.

- N. alba* L. It. *Ninfea*, *Copripentole*, *Càrfano*. Br. *Stalaàs*, *Naàsse*, *Anasse bianche*, *Ninfa*.

Acque palustri (al Sebino e al Benaco frequentis.). Mag.-Ag.

Nuphar Smith. Sist. Sex. Polyandria Monogynia.

N. luteum Smith. It. Ninfèa gialla. Br. *Anasse zalde*.

Acque palustri (al Sebino e al Benaco frequentiss.). Mag.-Ag.

ORDO IV. PAPAVERACEÆ.

Papaver L. Sist. Sex. Polyandria Monogynia.

P. pyrenaicum DC. (*P. alpinum* β Koch, non Linnei).

It. Argemòne giallo.

Raro. Vette del monte Blennone. Luglio-Agosto.

P. Argemòne L. It. Argemone, Papavero selvatico. Br. *Madonine smorte*.

Messi e margini de' campi, frequente. Maggio-Luglio.

P. hybridum L. Papavero spinoso.

Messi a Camignone, raro. Maggio.

P. dubium L. It. Rosolaccio a mazza. Br. *Madonine*.

Messi a Pontoglio, raro. Maggio.

P. Rhæas L. It. Papavero, Rosolaccio, Bubboline. Br. *Madonine*, *Rosolie*, *Madòl*.

Messi, margini delle strade, muri del piano e dei monti.

Maggio-Luglio.

β . *Strigulosum* Bönning. — Colla specie.

Coltivansi per ornamento, pei semi oleosi, e per l'oppio che geme dalle capsule.

P. somniferum L. It. Papavero bianco. Br. *Papàer*, *Sdor-mia*; originario dell'Asia.

P. officinale Gmel. egualmente dell'Asia.

Chelidonium L. Sist. Sex. Polyandria Monogynia.

C. majus L. It. Chelidonia, Erba de' porri, Erba Nocca.

Br. *Erba maistra*, *Erba del lat zald*.

Ruderati, muri, luoghi ombrosi, frequentissimo. Apr.-Sett.

ORDO V. FLUMARIÆ.

Corydalis DC. Sist. Sex. Diadelphia Hexandria

C. cava Comolli (*C. tuberosa* Bertol.). It. Radice cava.

Boschi e prati montani (dorso orientale del monte Dragone, e nella vicina Selvapiana), rara. Marzo-Aprile.

C. fabacea Pers. It. Fumaria minore.

Frequente lungo il fiumicello *Strone* presso Verolanuova. Marzo-Maggio.

C. solida Smith. It. Fumaria ditarnola.

Pendici erbose lungo il Chiese; rarissima. Aprile.

C. lutea Pers. It. Coridali.

Frane, torrenti, e rupi di Val Trompia, frequente. Aprile-Giug.

C. ochroleuca Koch. It. Coridali pallida.

Rupi al Benaco (Bertol. senza indicarne il luogo preciso)

Fumaria L. Sist. Sex. Diadelphia Hexandria.

F. officinalis L. It. Fumosterno. Br. *Farm.*

Muri, ruderali, rive secche, frequentissima. Marzo-Maggio.

F. capreolata L. It. Fumosterno bianco.

Colli al Benaco, rara (campi presso Limone). Apr.-Maggio.

ORDO VI. CRUCIFERÆ.

Matthiola DC. Sist. Sex. Tetradynamia Siliquosa.

M. varia DC. It. Violaciocca variopinta.

Rarissima (rupi a Limone). Giugno.

La *M. incana*, Br. *Viale rosse*, da noi si coltiva, ma è spontanea in parecchi luoghi d'Italia.

Cheiranthus DC. Sist. Sex. Tetradynamia Siliquosa.

C. Cheiri L. It. Violaciocca gialla. Br. *Viale zalde.*

Qua e là erratico sui muri vecchi. Coltivasi ad ornamento.

Nasturtium R. Br. Sist. Sex. Tetradynamia Siliquosa.

N. officinale DC. It. Agretto, Crescione, Nasturzio. Br.

Grassù.

Fossi e rigagnoli, frequentissimo. Marzo-Settembre.

N. amphibium L. It. Radice di Chiana.

α. *indivisum* DC. Laghetto Lavajone presso Venzago.

β. *variifolium* DC. Risaje, paludi, frequentissimo (Iseo, Sirmione).

γ. *auriculatum* DC. Margini essiccati al sud del Benaco.

N. sylvestre DC. It. Radicina serpeggiante.

Strade, margini dei fossi e dei campi, frequentiss. Magg.-Ag.
 N. palustre DC. Radicina palustre.

Poco frequente (luoghi umidi tra Iseo e Clusane). Mag.-Ag.
 N. Pyrenaicum DC. It. Radicina sottile.

Lungo l'Oglio sotto Palazzolo, ed al Chiese presso Goglione.
 Maggio.

Barbarèa R. Br. Sist. Sex. Tetradynamia Siliquosa.

B. vulgaris DC. It. Barbarèa, Erba barbara.

Ai fossi del piano e dei monti, frequente Aprile-Giugno.
 β. arcuata Rehb. Più frequente nelle valli.

B. bracteosa Guss. It. Barbarea.

Monte di Conche, e sopra Serle, rara. Aprile-Giugno

Turrilis L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliquosa.

T. glabra L. It. Baccellina verdemare.

Muricciuoli e rupi, frequente (rupi fra Botticino e Serle).
 Maggio-Luglio.

Arabis L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliquosa.

A. brassicæformis Wallroth (Erysimum alpinum DC. Bertol.) It. Bràssica d'alpe.

Monti e prealpi, rara (dorso merid. del Guglielmo). Magg.-Giugno.

A. alpina L. It. Pelosella d'alpe.

Rupi e frane umide delle prealpi, frequente (alle Zerle sommità del Biennone, e rupi di Gera alta). Aprile-Maggio.

A. hirsuta L. It. Baccellina.

Muri, rupi, e pascoli del piano e dei monti, frequentissima.
 (Colle Badia, monti a Lumezzane; Dragone). Apr.-Maggio.

β. sagittata DC. Ove la specie, ma meno frequente.

A. ciliata R. Br. It. Arabetta cigliosa.

Rupi e prati montani e alpini, rara (monti sopra Lumezzane S. Apollonio). Maggio-Giugno.

β. hirsuta. Ove la specie, ma più frequente.

A. muralis Bertol. It. Arabetta dei muri.

Sassi e muricciuoli montani sopra Limone, rara. Magg-Giug.

A. serpyllifolia Vill. It. Arabetta pepolina.



Monti e prealpi, rara. (Val di Fasane al confine Tirolese).
Maggio-Luglio.

A. arenosa Scop. It. Arabetta sbandellata.

Fessure delle rupi, rara. (al Benaco presso Piovè) Magg.-

A. Hålleri L. It. Arabetta delicata.

Val di Marone fra le siepi verso il Guglielmo, rara. Giugno.

A. turrita L. It. Cavolesses selvatiche.

Pascoli montani, frequente. (al Sebino fra Iseo e Vello;
lungo la via tra Caino e S. Eusebio). Maggio-Giugno.

A. pumila Jaq. It. Arabetta stellata.

Frane, torrenti e rupi prealpine, frequente (rupi a Corna-
blacca). Giugno-Luglio.

A. bellidifolia L. It. Arabetta lucida.

Monti e subalpi, rara. (rupi del monte Cigoletto; Val di
Paver presso il Blennone). Maggio-Luglio.

Cardamine L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliquosa.

C. asarifolia L. It. Billeri rotondifoglio. Br. *Cocleargia*,
perchè si usa come succedaneo della *Coclearia offi-*
cinalis che manca nella nostra provincia.

Luoghi e pascoli umidi della Valle Trompia, frequente.
(Monte Prada, frequentissima). Maggio-Luglio.

C. alpina Willd. It. Billeri d'alpe.

Pascoli sassosi umidi delle prealpi, rara. (monte Brof-
fione). Luglio-Agosto.

C. resedifolia L. It. Billeri pennato.

Rupi prealpine frequente. (Vetta delle Colombine, Desdana,
Muffetto). Giugno-Luglio.

C. impatiens L. Billeri.

Pascoli montani, e margini dei fiumi anche al piano, fre-
quente (Val di Marone, Roggia Fusa sopra Palazzolo).
Aprile-Giugno.

C. hirsuta L. It. Billeri primaticcio.

Muri, ruderali, campi, orti, vigne, frequentis. Febr.-Magg.
β. sylvatica Link. Terreni morbidi ed umidi.

C. amara L. It. Billeri amaro. Br. *Grassù*.

Ai fossi dei monti e del piano, frequente. (Fossi suburbani).
Aprile-Maggio.

S. grandifolia Bertol. Ad un fosso suburbano presso la Conchiglia.

C. pratensis L. It. Billeri lilacino-venato.

Prati a marcia. (Folzano, Flero, Dello), poco frequente.
Aprile-Maggio.

C. Mathioli Bertol. It. Billeri de' prati a fior candido.

Prati umidi della pianura, poco frequente. Aprile-Maggio

Dentaria L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliquosa.

D. enneaphyllos L. It. *Dentaria* biternata Br. *Dentanèla*.

Colline al Sebino fra Glusane e Paratico, frequentissima.

S. Eusebio salendo sul Dragone, rupi occidentali dell'Ario.
Maggio-Giugno. (1)

D. trifolia Waldst. et Kit. It. *Dentaria* trifogliata. Br. *Dentanèla*.

Selve del monte Dragone, rara. Aprile-Maggio (2).

D. digitata Lamk. (*D. pentaphyllos* All. Bertol.) It. *Dentaria* maggiore. Br. *Dentanèla*.

Luoghi ombrosi, lungo i torrenti montani, frequente. (Monte
Dragone, Val Bertone oltre Caino). Aprile-Maggio.

D. pinnata Lamk. It. *Dentaria* pennata. Br. *Dentanèla*.

Selve ombrose montane frequente (S. Eusebio) Apr.-Mag.

D. bulbifera L. It. *Dentaria* minore. Br. *Dentanèla*

Selve montane (Costalunga, monte Dragone). Apr.-Giugno.

Hesperis L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliquosa.

H. matronalis L. It. *Esperide*, *Viola* matronale, *Violacciocco* svizzero.

Margini dei ruscelli, muri vecchi, rarissima. (A mezzodi
del Cimitero, ed a Goglione di sotto). Maggio-Giugno.

(1) *Persæpe* loco tertii follii ternarii existat folium bractæiforme minimum, integerrimum; hoc præcipue in speciminibus Sebinianis. Ceterum ubique corolla semper ochroleuca.

(2) In meis speciminibus conveniunt quidem omnes notæ speciei, sed glandulae axillares desunt.

Silvestris L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliquosa.

S. officinale Scop. It. Erba cornacchia, Erisamo.

Ruderati, vie, frequentissimo. Maggio-Agosto.

S. strictissimum L. It. Sisembre a lanciuola.

Da Bagolino al monte Fontana, raro. Giugno-Agosto.

S. Sophia L. It. Erba Sofia. Br. *Erba Falcuna*.

Dal monte al piano qua e là, raro. (Campi ad Urago d'Oglio).
Maggio-Agosto.

S. Alliaria Scop. (*Erysimum Alliaria* L. Bertol.) It. Erba Alliaria.

Ruderati, margini dei fossi, siepi, frequentissimo. Apr.-Maggio.

S. thalianum Gaud. It. Pelosella.

Luoghi arenosi, margini dei campi, muri, frequentissimo.
Marzo-Aprile.

Erysimum L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliquosa.

E. cheiranthoides L. It. Violacciocche selvatiche. Br. *Viale salvadeghe*.

Presso Muslone al Benaco, raro. Giugno-Luglio.

E. lanceolatum Ait (*E. Cheiranthus* Pers. Koch.) It. Cre-spinaccio giallo.

Sul Castello di Brescia, Mura a Porta Pile, margini della Campagnola di Calcinatello. Giugno-Luglio (1).

Brassica L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliquosa.

B. oleracea L. It. Cavolo. Br. *Vers*.

La specie cresce spontaneamente nella forma selvatica sulle rupi litorali, p. es. a Genova ed a Nizza. Dalla coltura derivarono poi le moltissime varietà, di cui quelle che vengono più comunemente coltivate nella provincia nostra sono le seguenti:

a) *B. oleracea capitata* L. a foglie concave cappucciate; la primaticcia a capo o palla oblunga, sapore acidetto, Br. *Gabàs*; l'invernale a palla sferica, sapore dolcigno, Br. *Vers*.

(1) *E. ochroleucum*, *E. canescens*, *E. rheticum*, *E. helveticum*- *E. diffusum* auctorum apud Reichenbachium Cent. 42 sunt lusui huius speciei (Bert. Fl. It. Vol. VII pag. 38).

b) *B. oleracea botrytis* L. coll' infiorescenza da principio carnosa riunita come a palla, in seguito poi alta ed espansa. Se ne coltivano egualmente due varietà; la prima a caule cortissimo, foglie oblunghie, capi grossi bianchi o giallognoli, Br. *Càoi fur*; la seconda a caule più alto, foglie più strette, capo più piccolo violaceo carico, Br. *Bideoi*.

c) *B. oleracea gongyloides* L. col caule all' inserzione delle foglie grosso e carnoso. Br. *Vers rae*.

d) *B. oleracea acephala* Pollin. col caule lunghissimo, foglie non cappucciate, infiorescenza non carnosa, Br. *Verzècc*. Coltivasi di raro.

B. Rapa (*B. Rapa* et *B. campestris* L., *B. campestris*? Bertol. ex Koch. Synon.).

La specie cresce qua e là nei campi, a foglie verdi ruvidette, radice esile, siliques piccole. It. Rapa selvatica. Due varietà se ne coltivano principalmente:

a) *B. rapa oleifera biennis*: foglie e radice come nella selvatica, siliques e semi più grossi, oleosi. Br. *Coltât*, *Consér*.

b) *B. rapa rapifera*: foglie e semi come nella selvatica, radice grossa, carnosa, mangereccia; e di questa tre forme principali:

1.° Rapa compressa, quasi discoide, corteccia vinacea, Br. *Rae rosse*, *Rae de mont*.

2.° Rapa compressa, quasi discoide, corteccia bianca, Br. *Rae bianche*.

3.° Rapa lunga, fusiforme, Br. *Nau*.

B. Napus L. It. Rapaccione, Rapo selvatico.

Anche questa specie cresce quasi spontanea nei campi; foglie verdi-glauche affatto lisce, radici sottili, siliques piccole; ma se ne coltivano principalmente due varietà:

a) *B. Napus oleifera annua et biennis*, radice sottile, siliques grandi, semi oleosi, Br. *Raissa*.

b) *B. Napus esculenta*; radice carnosa, fusiforme, siliques piccole, Br. *Nau*.

Sinapis L. Sist. Sex. *Tetradynamia Siliquosa*.

S. nigra L. It. Senape. Br. *Senàer*.

Spontanea nella media e bassa Italia, qui coltivasi, benchè in poca estensione, per comporne coi semi macinati *Mostarda* e *Senapismi*. Aprile-Maggio.

S. arvensis L. It. Erba falcona, Rapaccini, Senapini. Br. *Senàer bastard*.

Nei campi a frumento, frequente. Aprile-Luglio.

S. alba L. It. Ruchettone, Senepa bianca. Br. *Senàer*.

Spontaneo nell'Italia media e meridionale; coltivasi da noi agli stessi usi della Senape nera, ed anche per sovescio. Maggio-Giugno.

Diplotaxis DC. Sist. Sex. Tetradynamia Siliquosa.

D. tenuifolia DC. It. Ruchetta selvatica.

Margini dei campi, ruderali, muri, vie anche in città. Apr. Luglio.

♀. *muralis* DC. (*D. tenuifolia* x. Bertol.) Ove la specie.

Alyssum L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.

A. calycinum L. It. Alisso calicino.

Margini secchi, frane, raro. (Castello di Brescia). Maggio.

Farselia Brown. Sistema Sex. Tetradynamia Siliculosa

F. incana R. Br. (*Berterò incana* DC. Bertol.). It. Alisso Croce di Cavaliere.

Colti pochi individui sullo spalto di S. Giovanni, presso la Porta S. Nazaro. Luglio.

F. clypeata Ait. fil. It. Alisso a scudo.

Colli ad Urago Mella (Bert.) Marzo-Aprile.

Lunaria L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.

L. biennis Mœnch. It. Lunaria greca. Br. *Fiur de rass*, *Fiur d'arzent*, *Medàe*.

Qua e là erratica. Coltivasi ad ornamento, principalmente pe' suoi grandi repli lucidi come raso. Aprile-Maggio.

L. rediviva L. It. Lunaria odorosa.

Boschetti e siepi alla Badia, rara. Aprile-Maggio.

Petrocallis R. Br. Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.

P. pyrenaica R. Br. It. Pelosella palmata.

Vette del monte Blennone (Zant). Giugno-Luglio.

Draba L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.**D. aizoides** L. It. Aizoide.

Rupi delle prealpi più alte (monte Blennone, monte Malghetta). Maggio-Luglio.

β. Zahlbruckneri Host. Vette altissime a tramontana.

D. frigida Sauter. It. Pelosella spuntata.

Rupi prealpine sulle vette (M. Broffione). Giugno-Luglio.

D. Walemborgii Hartm.

Vette del M. Cigoletto, rarissima (1).

D. muralis L. It. Draba muricciuola.

Margini dei campi, muri campestri, rara (Muricciuolo sulla via tra Iseo e Sulzano, e al sud di Camignone). Mag.-Giug.

D. verna L. It. Pelosella.

Vie, margini dei campi, muri, frequentissima (Mura di S. Giovanni, Badia). Febbrajo-Aprile.

Coclearia L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.**C. Armoracia** L. (*Armoracia rusticana* Koch. ed. II, p. 71).

It. Cren, Rafano volgare. Br. Cren.

Coltivasi e nasce qua e là nelle vigne, e sui margini dei campi. Giugno-Agosto.

C. saxatilis Rehb. (*Kernera saxatilis* Koch. ed. II, p. 72).

It. Coclearia d'alpe.

Rupi e frane prealpine. (Lumezzane S. Apollonio, M. Guglielmo a Sponda ricca, Fronden, Dosso alto, Cornablaeca, frequente). Maggio-Giugno

La vera *C. officinalis* da noi nè cresce spontanea, nè comunemente coltivasi. Vedi *Cardamine Asarifolia*.

Camelina Crantz. Sist. Sex. Tetradynamia Siliquosa.**C. sativa** Crantz. It. Dorella, Camelina, Miagro. Br. *Sommensine*.

Fra le messi, rara (alla Bornada). Aprile-Maggio.

β. dentata Pers. Fra le messi ed il lino nelle valli (Collio). Maggio-Giugno.

Thlaspi L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.

(1) Est fortasse varietas *D. Aizoidis*.

T. arvense L. It. Erba storna.

Cigli delle strade e dei campi (ferrovia Bezzato). Mag. Lug.

T. perfoliatum L. It. Erba montanella.

Margini delle strade, ruderali, muri, frequentiss. Feb.-Apr.

T. præcox Wulf. (*T. montanum* L. Bert. β). It. Tlaspi montano.

Fessure delle rupi prealpine, raro (Cornabla). Apr.-Mag.

T. rotundifolium Gaud. (*Hutchinsia rotundifolia* DC. Bertol.). It. Iberidella, Erba grassa.

Fessure e frane delle estreme vette, raro (Colombine). Lug.-Ag.

Biscutella L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.

B. levigata L. It. Biscutella montanina.

Ruderali, luoghi incolti ghiaiosi del piano e dei monti, frequente. (Colli a S. Eufemia, Campagna di Montechiaro). Aprile-Giugno.

β *saxatilis* DC. più frequente sui monti Dragone, Arlo.

B. hispida It. Biscutella pelosa.

Colli a Soprazocco, Campagna di Ghedi, rara. Magg.-Lug.

Lepidium L. Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.

L. Draba L. It. Còcola, Lattona.

Margini de' campi, ruderali, vie, raro (Palazzolo) Aprile-Mag.

L. campestre DC. It. Erba storna.

Terreni coltivati, raro (al Benaco presso Manerba). Apr.-Mag.

L. ruderale L. It. Lepidio de' calcinacci.

Ruderali, vie, margini secchi, frequente (vie di Brescia, strada di circoscrizione a S. Giovanni ecc.). Apr.-Mag.

L. graminifolium L. It. Lepidio, Iberide. Br. Erba de sciateghe.

Ruderali, vie, muri, frequentissimo. Aprile-Agosto.

Hutchinsia R. Br. Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.

H. alpina DC. It. Iberidella alpina.

Frane, torrenti, rupi prealpine, frequente (Fronden, Cornabla). Giugno-Luglio.

H. petraea DC. It. Iberidella rupina.

Rupi tra Tignale e Tremosine, rara. Aprile-Maggio.

Capsella DC. Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.

C. Bursa-pastoris Mœnch. It. Borsa pastore, Sacco montagnolo. Br. *Erba borsa*.

Vie, ruderali, campi, frequentissima. Marzo-Autunno.

Ethlonema R.Br. Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.

E. saxatile R. Br. It. Tlaspi carnicino.

Frane, e fessure delle rupi prealpine, raro (Fronden, Colombine). Aprile-Giugno.

Seneciera Knaut. Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.

S. Coronopus Poiset. It. Lappoline.

Luoghi erbosi, strade (vie di Salò) Maggio-Luglio.

Myagrum Mœnch. Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.

M. perfoliatum L. It. Miagro liscio.

Campi, margini di fossi, poco frequente (Navo). Apr.-Mag. Coltivasi, ma assai di raro, perchè traesi da altri paesi la *Isatis tinctoria* L. It. Guado, Br. *Guad*, *Guado*, che serve a tingere le lane in azzurro.

Neslia Desvaux, Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.

N. paniculata Desv. It. Miagro panocchiato.

Fra le messi, frequente (Bornada, e campi suburb.). Apr.-Mag.

Caleplina Desvaux, Sist. Sex. Tetradynamia Siliculosa.

C. Corvini Desv. It. Miagro rostellato.

Campi a Milzano e Milzanello, rarissima. Marzo-Maggio.

Boulas L. Sist. Sex. Tetrad. Siliculosa.

B. Erucago L. It. Cascellore. Br. *Lanser*.

Fra le messi dappertutto. Marzo-Ottobre.

β. *integrifolia* (L). Margini asciutti dei campi.

Rapistrum Boerhave, Sist. Sex. Tetrad. Siliculosa.

R. rugosum Allion. It. Miagro peloso.

Campi, messi, poco frequente (a destra del Mella al sud della ferrovia). Maggio-Giugno.

Raphanus L. Sist. Sex. Tetrad. Siliquosa.

R. Landra Moret. It. Landra.

Messi in tutta la pianura, frequentissimo. Maggio-Settembre.

(4) *Folius omnibus integerrimis.*

R. Raphanistrum L. It. Rafanistro, Rapastrello. Br. *Raanèi salvadeg*

Messi del piano, frequente (Ospedaletto). Aprile-Maggio.

R. sativus L. It. Ramolaccio, Ravanello.

Cultivansene molte varietà, di cui le principali:

- a) Grosso, scorza nera. Br. *Ramolàs negher*.
- b) Grosso, scorza biancastra. Br. *Ramolàs bianc*.
- c) Piccolo, precoce, scorza rossa. Br. *Raanèl ross*.
- d) Piccolo, precoce, scorza bianca. Br. *Raanèl bianc*.
- e) Mezzano, oblungo, scorza bruna. Br. *Ramolassi*.

ORDO VII. CAPPARIDÆ.

Capparis L. Sist. Sex. Polyandria Monogynia.

C. spinosa L. It. Capperò. Br. *Càpero*.

Muri al castello di Brescia, Gargnano, Bogliacco, Salò. Maggio-Settembre.

Royle crede provare che questa specie sia il vero *Hissopus* della Bibbia.

C. rupestris Sibth. et Smitt. It. Capperò senza spine. Br. *Càpero*.

Insieme col precedente, più raro. Maggio-Settembre.

Segue la famiglin delle Bixinæ, il cui tipo è il genere Bixa (Sist. Sex. Polyandria Monogynia) colla specie BIXA ORELLANA L. dell'America meridionale, arboscello da cui si trae la fecola rossa caustica, detta impropriamente Terra Oriana.

ORDO VIII. CISTINÆ

Cistus L. Sist. Sex. Polyandria Monogynia.

C. Salvifolius L. It. Cisto, Brentina, Scornabecco.

Selvette del colli, poco frequente (Val Bertone sopra Caino) Aprile-Maggio.

Hellanthemum Tournef. Sist. Sex. Polyand. Monogyn.

H. guttatum Hock. It. Fior gallinaccio.

Selvette ombrose, raro (Lumezzane Pieve). Maggio-Giugno.

H. Fumana Mill. It. Fumana.

Colli e monti aprici, frequente (Dragone, Serle, Badia, Monte Vezegno, Quarone). Giugno-Agosto.

H. Oelandicum Wahl. (H. alpestre Coll. Bertol.). It. Eliantemo rupino.

α) glabrum. Vertice del Corno dei 30 passi al Sebino. Mag.-Lug.

β) alpestre. Rupi a Lumezzane e alle Coste di S. Euseb. Mag.-Lug.

γ) italicum Pers. Sentieri da Pisogne al Guglielmo. Magg.-Lugl.

H. marifolium Coll. (H. oelandicum γ. Koch.). It. Eliantemo teucrino.

Colli e campi tra Bogliaccio e Toscolano; Venzago. Giug.-Sett.

H. vulgare Gärtner. It. Eliantemo, Panace chironio.

Colli e monti all'aprico, frequentissimo. Marzo-Agosto.

α. tomentosum. Colli sopra Provezze.

β. hirsutum. Varietà più comune dappertutto.

γ. glabrum. Monte Guglielmo in luoghi ombrosi frequentissimo.

δ. grandiflorum. Valle d'Inzino, Vetta del Gugliel., M. Fronden.

H. polifolium Hook. It. Eliantemo canutola.

Colli e monti aprici, raro (Madonna della Corna sopra Provaglio).

ORDO IX. VIOLARIEÆ.

Viola L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

V. palustris L. It. Violetta palustre. Br. *Viola*.

Lama Scòvola presso Bagnolo. Aprile.

V. hirta L. It. Violetta senza odore. Br. *Viola bastarda*.

Luoghi arenosi del piano e dei monti, frequente. Mar.-Apr.

V. odorata L. It. Mammola. Br. *Viola sapa*.

Luoghi erbosi, muri, dappertutto. Febbraio-Aprile.

β. alba. It. Mammola bianca. Br. *Viola bianca*.

Frequentissima. Ove la specie.

γ. suavis MB. rarissima, sui colli. Adro (1).

(1) Collegi specimen ex eodem loco insigniter notatum calcaris filiformi recto, vel apice incurvato calycis longitudinem æquante; ceterum petalis a basi ad medium albis, odoris.

V. canina L. It. Viola mammola senza odore. Br. *Viole mate*.

β. lactea Coll. foliis basi ovatis vel truncatis (V. canina α. Bertol.). Dal Maddalena a Botticino.

γ. lactea Smith. foliis basi cuneatis (V. canina α. Bertol.). Dal Maddalena a Botticino.

δ. sylvestris Reichb. caule firmo, exsucco, flexuoso, foliis cordato-ovatis (V. canina δ. Bertol.). Monte Dragone.

ε. montana L. caule erecto clato, stipulis grandibus foliaceis. (V. montana Bertol.). Collina a Sirmione.

ζ. sylvestris-apetala M. Dragone.

η. montana-apetala. Sirmione.

V. calcarata L. It. Pensieri odorosi, Viola farfalla grande; Br. *Penser viola*.

Luoghi erbosi delle vette (Colombine, Muffetto, Cigoletto). Luglio-Agosto.

V. heterophylla Bertol. It. Viola sbrandellata.

Pascoli montani, poco frequente (Val di Marone)-Mag.-Lug.

V. cenisia L. It. Mammola rupina.

Frane e rupi prealpine (Pendio occid. del Muffetto, falde del Cigoletto alle Corti di Campo molle, Monti Fronden e Ario). Luglio.

β. valderia Wild. Monti Ario e Cigoletto, più frequente che la specie.

V. biflora L. It. Violetta gialla.

Luoghi erbosi rupestri delle prealpi, frequente (Colombine; rupi sopra *Ravénola vaga*; falde settentrion. del Muffetto; rupi di Cornabla). Luglio-Agosto.

V. tricolor L. It. Minuti pensieri, Farfallini. Br. *Penser salvadeg*, tipo di tutte le varietà coltivate dette in Br. *Penser*.

Pascoli alpini e montani; messi del piano, frequente (1).

β. rotomagensis Desf. stipularum lacinia media latiore, integerrima. M. Marchione, rara.

(1) Varietates petitarum a varietate colorum, et magnitudine petalorum innumere mihi videntur, ut designare nequeam.

ORDO X. RESEDACEÆ.

Reseda L. Sist. Sex. Dodecandria Trigynia.

R. *Phyteuma* L. It. Reseda selvatica. Br. *Miglionèt salvadeg.*

Muri, campi sterili, poco frequente (Campagnola di Calcinatello, colli di Gargnano e di Salò). Maggio-Giugno.

R. *lutea* L. It. Guaderella cruciata. Br. *Miglionèt salvadeg.*

Campi sterili, e margini delle strade, frequente (margini del Mella, Campagna di Calcinatello e di Montech.). Mag.-Giug.

R. *lutèola* L. It. Erba gialla, Erba guada, Luteolo.

Campi sterili e letto dei torrenti e fiumi del piano, rara (Oglio) Maggio-Agosto.

Coltivasi per la soavità dell'odore dei fiori:

R. *odorata*. L. It. Amorino. Br. *Miglionèt, Reseda*, originaria dell'Egitto.

ORDO XI. DROSENACEÆ.

Drosèra L. Sist. Sex. Pentandria Pentagynia.

D. *longifolia* L. It. Rosolida lunga.

Prati turfosi e fossi paludosi, rara (presso Bovegno). Lug.

β *foliis obverse lineari-lanceolatis*. Lama della Bissa e del Chiado. Luglio

D. *rotundifolia* L. It. Rosolida.

Come la precedente (Lama Pranduna).

Parnassia L. Sistema Sex. Pentandria Tetragynia.

P. *palustris* L. It. Parnassia.

Luoghi paludosi dal piano alle prealpi, frequentiss. Mag.-Ag.

ORDO XII. POLIGALÆÆ.

Polygala L. Sist. Sex. Diadelphia Octandria.

P. *vulgaris* L. It. Bozzolina, Vecciolina.

Luoghi erbosi di collina e di montagna, frequentissima.

La varietà a fior porporino è comunissima: quella a fior bianco o violaceo è frequente dal S. Gottardo alla Margherita. Aprile-Settembre.

- β. *oxiptera* Rehb. γ. *densiflora* Tausch; trovansi colla specie.
- P. comosa** Schk? It. Bozzolina chiomata.
Luoghi erbosi laterali al sentiero da Pisogne al Guglielmo, insieme colla precedente, rara.
- P. amara** L. It. Bozzolina amara.
Luoghi erbosi dai colli alle prealpi, frequente. Magg. Sett.
β. *amblyptera* Rehb., colla specie.
γ. *alpestris* Rehb. Monte Dragone.
δ. *austriaca* Rehb. Vette erbose sopra Lumezzane.
- P. Chamæbuxus** L. Bozzolina fruticulosa. Br. *Martilina*.
Ericeti e selvette, frequentissima (Maddalena, Camaldoli, S. Vigilio, Serle). Marzo-Giugno (1).

ORDO XIII. SILENEÆ.

Gypsophila L. Sist. Sex. Decandria Digynia.

G. repens L. It. Garofanina sdrajata.

Ghiaie, rupi, torrenti prealpini, rara (alpe di Vaja, poco lungi dal laghetto). Luglio-Agosto.

G. muralis L. It. Garofanina minuta.

Rara nella provincia. Margini dei campi a Lograto. Lug.-Ag

Tunica Scop. Sist. Sex. Decandria Digynia.

T. saxifraga Scop. (*Gypsophila saxifraga* L. Bertol.). It. Garofanina spaccasassi.

Rupi, margini ghiaiosi, muri, frequentissima. Aprile-Ottobre.

β. *floribus fasciculatis*. Colli fra Virle e Rezzato, rara.

Dianthus L. Sist. Sex. Decandria Digynia.

D. prolifer L. It. Strigoli, Violine di tallo.

Luoghi aridi di collina (S. Eufemia, Rezzato). Giug.-Ott.

β. *diminutus* L. Luoghi aridissimi; colli a Nuvolento e Paitone.

D. Armeria L. It. Armeria, Violine a mazzetti. Br. *Garofoline de camp.*

Raro fra lo messi. Colline di Gussago frequente. Giug.-Sett.

(1) *Varietas floribus rubra frequentior quam varietas floribus flava aut alba. Lobi dentesque carinas in ditione nostra semper flavi.*

- D. *barbatus* L. It. Garofanini a mazzetti Br. *Garofoli a massècc.*

Spontaneo nei monti della Valtellina e del Tirolo, coltivasi largamente nei giardini.

- D. *Carthusianorum* L. It. Garofanini di prato. Br. *Garofoli de mont.*

Luoghi erbosi ed aprici dei colli, frequentiss., Maggio-Ottob.

- D. *atro-rubens*. Jaq. (D. *Carthusianorum* β . Bertol.) (1).

Colli aprici; a Gussago, al Camaldoli, Desenzano, Venzago, frequente. Maggio-Settembre.

- D. *Seguierii* (D. *Carthusianorum* α . Bertol.).

Colli suburbani, Maddalena, raro. Settembre-Ottobre (2).

- D. *glacialis* Hænke. It. Garofanino sgambato.

Ammassi nevosi sul Broffione. Luglio.

- D. *sylvestris* Wulfen (D. *Cariophyllus* Smith, Bertol.).

It. Garofanino scempio. Br. *Garofoi salvadeg.*

Colli aprici, frequentissimo. S. Eufemia, Maddalena, Urago. Giugno-Agosto.

β . *squamis calicinis* 6-8 imbricatis. Colia specie.

γ . *pigmaeus* Bertol. Alpi ed alveo dei torrenti fino al piano.

- D. *plumarius* L. It. Garofanini, Pennini.

Monti di Lumezzane, rarissimo. Luglio.

- D. *superbus* L. It. Garofano a pennacchio. Br. *Garofoi piæmè.*

Pascoli montani ed alpini, frequente (Poffe ratte, Crux domini). Luglio-Agosto.

(1) Proximus præcedenti, ut clarissimi auctores hunc illius varietatem dixerint, nisi quod robustior est planta. Sed si robustior et major, cur etiam flores illarum partium proportionales non sequuntur? eae e contrario duplo triploque minores sunt quam in D. *Carthusianorum*? Adde capitulum coaginatam, plerumque 20-30 florum, et plantæ in locis natalibus habitum, quæ omnia videntur confirmare, hanc esse speciem ab aliis distinctam, nisi amplecti velimus Darwinii sententiam de formis specierum. Elementum excole ex seminibus, et faciem servavit.

(2) Hunc quoque a D. *Carthusianorum* L. squamis calycem involuerantibus sensim in acumine mucroemque protractis, et vagina latitudinem folii subaequantibus, satis puta distinctum.

D. monspessulanus L. It. Garofanino frastagliato. Br. *Garofoline salvadeghe*.

Colli e monti aprici, frequente. Guglielmo presso Caregn; Muffetto. Luglio-Agosto.

Le numerose e svariatissime forme di garofani coltivati derivano probabilmente dalla specie selvatica *D. sylvestris*; oppure dal *D. Caryophyllus* x. L. che nella provincia nostra non m'occorre mai spontaneo. I doppioni che sbucciando rompono lateralmente il calice diconsi in Besc. *S-ciopis*. Altra specie coltivata è il *D. chinensis* della China; Br. *Garofol vetudi*.

Quella droga che nel dialetto chiamiamo *Cioddi*, *Garofoi*, non appartiene già a questa famiglia, bensì alle *Myrtaceæ*; e sono i fiori di un albero dell' India e dell' isola di Giava (*Cariophyllus aromaticus*) spiccati col loro peduncolo prima che sbuccino.

Saponaria L. Sist. Sex. Decandria Digynia.

S. Vaccaria L. (*Gypsophila Vaccaria* Bertol.) It. Strigolo.

Fra le messi principalmente del piano, frequente. Mag.-Giug.

S. ocymoides L. It. Ocimoide rossa.

Colli e monti fra le rupi frequente (S. Eufemia, Cajonvico, Guglielmo). Aprile-Giugno.

S. officinalis L. It. Saponaria. Br. *Saponaria*, *Erba grassa*

Luoghi arenosi e lungo le vie del piano e dei colli, frequentissima. Giugno-Settembre.

Cucubalus L. Sist. Sex. Decandria Trigynia.

C. bacciferus L. It. Baccolo, Erba cucco.

Nelle siepi rarissimo; (presso Mompiano). Giugno-Agosto.

Silene L. Sist. Sex. Decandria Trigynia.

S. gallica L. It. Mezzettino.

Colli e campi, frequente; (Badia, Flero, Pontoglio). Giugno-Agosto.

S. italica Sibth. It. Silene della selva.

Colli aprici, frequente; (Badia, Costalunga). Maggio-Giugno.

S. nutans L. It. Silene ciondola.

Luoghi erbosi dei colli e dei monti, frequentissima. Mag.-Giug.

β. insubrica Comoll. }
 γ. livida Wiid. } qua e là colla specie, rare.

S. Otites Smith. It. Otite, Sesamoide grande.

Colli asciutti, rara; (Boschetti occidentali della Badia.) Maggio-Giugno

S. inflata Smith. It. Bubbolini, Strigoli. Br. Verzoli, S-ciopi, Erba issigheta.

Prati, campi, vie, muri, frequentissima. Maggio-Agosto.

S. Elisabethæ Jan. It. Fiore della Vice-Regina.

Somme vette del M. Dossalto, frequente. Luglio-Agosto.

S. vallesia L. It. Viscagine persichina.

Vette prealpine, rara; (monti Dossalto e Maniva). Lug.-Ag.

S. Armeria L. It. Silene a mazzetti.

Campi, colli, lungo i fiumi, poco frequente (tra Paratico e Clusane). Luglio-Agosto.

S. saxifraga L. It. Silene rupina.

Rupi montane e prealpine frequente (strada lacuale al Sebino; monti Marchione, Fronden, Pesseda) Magg.-Luglio.

S. quadrifida L. It. Silene de' fonti.

Rupi prealpine (declivio settent. del Muffetto; rupi di Cornabla e di Pesseda). Luglio-Agosto.

S. alpestris Wild? It. Silene dentellata.

Rupi del M. Fronden (Zant).

S. rupestris L. It. Silene orecchio di topo.

Rupi prealpine, frequente (M. Marchione; al Castellino presso Collio; via tra S. Colombano e il Glojo).

S. acaulis L. It. Ocimoide muscoso.

Vette del Blennone e del Brofflone alle Cornette Giug.-Ag.

L. ychnis L. Sist. Sex. Decandria Pentagynia.

L. alpina L. It. Violina d'alpe.

Rupi a picco sulle vette del M. Fronden, rarissima. Lug. Ag.

L. Flos-cuculi L. It. Fior del cuculio, Femerone. Br. Garofolete.

Prati e luoghi erbosi frequentissima. Aprile-Giugno.

L. vespertina Sibthorp (*L. dioica* β . Bertol.). It. Gittone bianco. Br. *Glottù salvadeg*, *Gæsmine salvadeghe*.

Siepi, margini dei campi, frequentissima. Giugno-Settembre.

L. diurna Sibthorp (*L. dioica* Bertol.). It. Gittone rosso. Br. *Glottù ross*.

Prati montani e prealpini, frequentissima; rara nella pianura. Maggio-Agosto (1).

L. Flos Jovis Lamk. (*Agrostemma Flos Jovis* L. Bertol.). It. Fior di Giove.

Selve apriche della Val Trompia (Zant.).

Agrostemma L. Sist. Sex. Decandria Pentagynia.

A. Githago L. Ital. Gettajone, Giolio, Mazzincollo. Br. *Glottù*.

Fra le messi, frequentissimo. Maggio-Giugno.

ORDO XIV. ALSINEÆ.

Sagina L. Sist. Sex. Tetrandria Tetragnia.

S. procumbens L. It. Budellina de' fonti.

Qua e là in luoghi umidi e muscosi del piano e dei monti, rara. Aprile-Maggio.

S. apetala L. It. Budellina dei muri.

Margini delle strade, ruderali, frequentissima. Aprile-Agosto.

S. ciliata Fries. It. Budellina delle vie.

Vie remote della città, muri, ruderali, frequentiss. Apr.-Ag.

β . *depressa* Schulz. Luoghi aridissimi.

Spergula L. Sist. Sex. Decandria Pentagynia.

S. saginoides L. (*Sagina saxatilis* Wimm. Koch.) It. Spergola budellina.

Luoghi umidi alle falde delle *Poffe ratte* sopra Collio. Giugno-Luglio.

S. subulata Swartz (*Sagina subulata* Wimm. Koch.) It. Spergola sottile.

(1) Etiam in editis, multo præcocius floret quam *L. vespertina* in plantis. Forma igitur, dentibusque capsulae, et florendi tempore mihi videtur species ab illa probe distincta.

Terreni sabbiosi montani e prealpini, rara (Ario, Cornabla). Luglio-Agosto.

S. arvensis L. It. Renajola, Spèrgola.

Campi montani a segale e a lino, rara. Aprile-Settembre.

β. sativa. Fra la segale presso Collio.

Ailone L. Sist. Sex. Decandria Trygynia.

A. rubra Walemb. (*Lepigonum rubrum* Koch.). It. Lupinosa, Spèrgola.

Luoghi arenosi del piano e dei monti, rara (Bovegno).
Marzo-Settembre.

A. lanceolata M. et K. (*Arenaria lanceolata* Wild. Bertol.).
It. Renajuola sassefrica.

Versante meridionale delle Colombine, rara. Luglio-Agosto.

A. laricifolia Wahl. (*Arenaria striata et liniflora* Bertol.).
It. Renajola pelosa.

Rupi sopra Limone; M. Gera bassa, rara. Luglio-Agosto.

A. verna Koch. (*Arenaria verna* L. Bertol.). It. Renajuola
primaticcia.

Rupi prealpine frequente (M. Dossalto). Maggio-Luglio.

A. recurva Walemb. (*Arenaria recurva* Willd. Bertol.).
It. Renajola falcata.

M. Malghetta quasi alla sommità (Zant). Luglio-Agosto.

A. tenuifolia Wahl. (*Arenaria tenuifolia* L. Bert.). It. Renajola de' muri.

Muri campestri, e margini erbosi, frequente. Aprile-Giugno.

β. viscosa Schrb. Ove la specie, ma più rara.

Cherleria L. Sist. Sex. Decandria Trigynia.

C. sedoides L. It. Renajola borracina.

Pascoli prealpini, frequente (Cornabla, Ario, Blennone).
Luglio-Agosto.

Meringia L. Sist. Sex. Octandria vel Decandr. Trigyn.

M. muscosa L. (*Octand. Trig.*). It. Centonchio minore.

Rupi umide, frequente (Preseglie fra il muschio, Barghe).

Aprile-Luglio.

M. Ponæ Fenzl. (Decand. Trig.) (*Arenaria bavarica* DC Bertol.). It. *Renajola carnosà*.

Rupi al Sebino oltre Marone, al Benaco presso Tesino.
Maggio-Agosto.

M. polygonoides MK. (Decand. Trig.) (*Arenaria polygonoides* Wild. Bertol.). It. *Renajola uccellina*.

Dorso meridionale del Brofflone, rara. Luglio-Agosto.

M. trinervia MK. (Decand. Trig.) (*Arenaria trinervia* L. Bertol.). It. *Renajola nervosa*.

Luoghi ombrosi, muri a tramontana nel piano e nei monti,
frequente. Aprile-Settembre.

Arenaria L. Sist. Sex. Decandria Trigynia.

A. serpyllifolia L. It. *Renajola de' muri*.

Piano e monti sui muriccioli e margini asciutti, frequente.
Aprile-Giugno.

β. *viscida* Lois. Colla specie, meno frequente.

A. ciliata L. It. *Renajola sermollino*.

Rupi prealpine, frequente (M. Dossalto). Luglio-Agosto.

β. *multicaulis* Wulf. Rupì sulle Colombine.

A. biflora L. It. *Renajola quattrinella*.

Luoghi umidi ed ombrosi delle prealpi, frequente (Ravenola
vaga, Cigoletto). Luglio-Agosto.

Holosteum L. Sist. Sex. Triandria Trigynia.

H. umbellatum L. It. *Centonchio a ombrella*.

Campi sabbiosi, fra le messi, frequente. (Colli a Lonato, Desenzano, Calino). Marzo-Aprile.

Stellaria L. Sist. Sex. Decandria Trigynia.

S. cerastoides L. It. *Stellaria orecchie di topo*.

Luoghi umidi prealpini, rara. (Intorno al lago di Vaja).
Luglio-Agosto.

S. viscida Marsch von Bieberst. It. *Stellaria beccuta*.

Pascoli umidi presso Venzago, rara. Maggio-Giugno.

S. media Vill. It. *Centonchio, Erba paperina*. Br. *Paarina*.

Comunissima al piano e ai monti. Tutto l'anno.

β. major Koch. Luoghi umidi e pingui (1).

S. nemorum L. It. Centonchio montano.

Boschi montani, frequente (presso la chiesa di Conche).

Maggio-Agosto.

S. holostea L. It. *Stellaria garofanina*.

Monti e prealpi, frequente. (Dragone, Guglielmo, Marchione etc.). Maggio-Luglio (2).

S. graminea L. It. *Stellaria gramignole*.

Luoghi erbosi e siepi dal colle ai monti frequente. (S. Eusebio, colli a Salò). Maggio-Luglio.

β. bracteæ scariosis, nervo vividi, floribus duplo majoribus. An

S. glauca Koch? Siepi e cespugli lungo la strada della Valsabbia.

S. uliginosa Murray. It. *Stellaria palustre*.

Luoghi umidi dal piano ai monti, frequente (lungo l'Oglio;

Monte Muffetto alle *Paghere*; via da S. Colombano al Giego).

Giugno-Agosto.

***Menchia* Ehrh.**

M. Mantica Burtling. (Decandria Pentagynia) (*Cerastium manticum* L. Bertol.). It. *Cerastio stellato*.

Prati turfosi del colle di Poncarale. Aprile-Luglio.

***Malachium* Fries. Sist. Sex. Decandria Pentagynia.**

M. aquaticum Fries (*Cerastium aquaticum* L. Bertol.).

It. Budellina d'acqua. Br. *Paarina grossa*.

Lungo i fossi e le siepi umide, frequente Aprile-Luglio (3).

***Cerastium* L. Sist. Sex. Decandria Pentagynia.**

C. glomeratum Thuillier. (*C. vulgatum* L. Bertol.). It.

Orecchio di topo.

(1) *M. natum* singulare, quod in horto meo suburbano longe lateque repens collegi: panicula dichotoma quidem, sed contractissima; pedicelli quoque brevissimi; bractearum immixtae; sepala lutea et bractearum similissima; petala quoque herbacea minora unguiculata, indivisa; filamenti cum antheris immixta; pistillum nunc immixtum sed sterile, nunc in tot foliola solutum, quot extant capsularum valvae.

(2) Folia inferiora interdum nigris maculis signata.

(3) In siccis sit planta humilis, spithamea, panicula contractiori.

- Campi, strade, muri, frequentissimo. Aprile-Maggio.
- C. brachipetalum* Pers. It. Orecchia di topo barbata.
Luoghi aridi, sabbie del piano e dei monti frequentissimo.
Aprile-Maggio.
- C. viscosum* L. (*C. semidecandrum*, *C. glutinosum* et
C. triviale Koch.). It. Muschio di prato.
Prati aridi del piano e dei colli, muri, frequente (colli sopra Calino e alla Volta) Aprile-Maggio.
- C. campanulatum* Spr. It. Centone pratajolo.
Prati, margini dei campi, frequente. Marzo-Maggio.
- C. latifolium* L. (*C. alpinum* γ . Bert.). It. Orecchio di topo d'alpe.
Alpi di Vaja, frequentiss. Luglio-Agosto.
 β . glaciale Gaud. Vette dell'Alpi di Vaja. Luglio-Agosto.
- C. alpinum* L. It. Orecchio di topo d'alpe.
Frane pluviali dell'alpi di Vaja, e del M. Fronden, frequente.
Luglio-Agosto.
- C. arvense* L. (*C. alpinum* β Bertol.). It. Orecchio di topo montanino.
M. Dragone e Dragoncello, frequentissimo. Maggio-Luglio.
 β . suffruticosum L. Ove la specie.
- C. grandiflorum* WK?
Pascoli del M. Rondenino superiormente al laghetto. (Zant.).

ORDO XV. ELATINEÆ.

- Elatine** L. Sist. Sex. Octandria Tetragynia (excl. specieb.).
- E. hexandra* DC. It. Peperella resellina (Stam. 6-3, pist. 3).
Paludi al sud del Sebino, frequente. Giugno-Agosto.
- E. major*. A. Braun. It. Peperella maggiore.
Risaje a Bagnolo, a Verolanuova, rara. Luglio-Agosto.
- E. Alsinastrum* L. It. Peperella coda cavallina.
Fossi paludosi delle lame Scòvola e Pranduna, frequente.
Giugno-Agosto.

ORDO XVI. LINEÆ.

Linum L. Sist. Sex. Pentandria Pentagynia.**L. catharticum** L. It. Lino selvatico.

Prati del piano e dei monti frequente (Torbole, Bagnolo, monti Guglielmo e Dragone). Maggio-Giugno.

L. gallicum L. It. Lino spigato.

Colli aprici, frequente (Capriano, Montechiaro, Carpenedolo, Mompiano). Giugno-Ottobre.

L. angustifolium Hudson. It. Lino selvatico Br. *Li salvadeg.*

Colli e monti all'aprico, poco frequente (Val di Marone, monti di Lumezzane). Giugno-Luglio.

L. alpinum Jacq. It. Lino celeste.

Luoghi erbosi prealpini, raro (monti Marogna e Tremalzo al confine Tirolese). Luglio-Agosto.

L. perenne Koch (L. *alpinum* β . Bertol.?)

Somme vette del Guglielmo, raro. Luglio-Agosto.

L. tenuifolium L. It. Lino montano. Br. *Li salvadeg.*

Colli e pianura in terreni sassosi, frequentissimo (Badia, Desenzano, Riviera). Giugno-Settembre.

L. viscosum L. It. Lino malvino.

Monti sopra Collio, raro. Luglio-Agosto.

L. usitatissimum L. It. Lino. Br. *Li.*

Coltivasi estesamente nella bassa provincia, e in qualche luogo anche nelle valli. Trovasi però frequente erratico nel piano. Maggio-Luglio.

ORDO XVII. MALVACEÆ.

Malva L. Sist. Sex. Monadelphia Polyandria.**M. alcæa** L. It. Alcèa. Br. *Malvòt.*

Campi, siepi, poco frequente. (Margini del Mella; siepi tra Palazzolo e Pontoglio). Luglio-Agosto.

β . fastigiata Koch. Colla specie a Palazzolo.

M. sylvestris L. It. Malva selvatica. Br. *Malva.*

Orti, campi, vie, frequentissima. Giugno-Agosto.

- M. rotundifolia** L. It. Malva comune. Br. *Malveta*.
Orti, campi, vie principalmente dei monti, frequentissima.
Giugno-Settembre.
- M. borealis** Wallm. It. Malva minuta. Br. *Malvina*.
Sui monti presso le capanne, rara. Giugno-Agosto.
- M. crispa** L. It. Malva crespata. Br. *Malva rossa*.
Orig. della Siria, coltivasi, e cresce anche quasi spontanea
nelle alte valli.

Aithæa L. Sist. Sex. Monadelphia Polyandria.

- A. officinalis** L. It. Altea, Buonvischio, Malvavischio. Br. *Bonaës-cc*.
Margini dei campi e dei fossi nella pianura, frequentissima.
(Bagnolo, Manerbio, S. Gervasio, Sirmione, Pozzolengo).
Giugno-Luglio.
- A. rosea** L. It. Malvarosa. Br. *Malvù*.
Coltivasi per ornamento, ma qua e là cresce erratica.
Giugno-Agosto.
- A. pallida** WK. It. Malvone selvatico.
Trova parecchi individui presso il Mella a S. Giacomo.
Giugno-Luglio.
- A. cannabina** L. It. Alcea, Canapa selvatica.
Penisola di Sirmione, frequente. Luglio-Agosto.
- A. hirsuta** L. It. Cannabina ispida.
Lame di Torbole, Madonna della Corna sopra Provaglio
d' Iseo. Luglio-Agosto.

Hibiscus L. Sist. Sex. Monadelphia Polyandria.

- H. Trionum** L. It. Ipecòo, Alcea vescicosa.
Campi sterili di Prada presso Nave, frequentissimo. Lo-
grato, Torbole, Desenzano. Giugno-Agosto.
- L'H. siriacus** Br. *Altèa*, arboscello coltivato ovunque anche
per siepe, in parecchie varietà, è originario della Siria.
- Il Gossypium herbaceum** L. Cotone, Br. *Cutù*, *Bombàs*, è ori-
ginario delle Indie orientali, ma coltivasi estesamente,
massime in America.
- Il Theobroma Cacao** L. e Br. *Cacao* è dell'America tropicale.

ORDO XVIII. HYPERICINÆ.

Hypericum L. Sist. Sex. Polyadelphia Polyandria.

H. perforatum L. It. Iperico, Perforata; Br. *Perferada*,
Erba de S. Gioàn, Lüssignæl.

Pascoli e margini dei campi dappertutto. Giugno-Agosto.

β. verouense Schrank. Pascoli montani, raro.

H. humifusum L. It. Iperico filiforme.

Rarissimo. Margini dei laghetti sul colle di Poncarale. Giugno-Luglio.

H. dubium Leers. (H. quadrangulum L. Koch.). It. Iperico reticolato.

Pascoli e cespugli montani e prealpini, frequente (val di Pezzaze, Guglielmo). Luglio-Agosto.

H. Richeri Vill. It. Iperico frangiato.

Frane dei monti Cornablaeca ed Ario, rarissimo. Lug. Ag.

H. tetrapterum Fries (H. quadrangulum L. Bertol.). It. Iperico quadrangolare.

Luoghi umidi, frequente (Lame la Bissa, la Pranduna, il Chiodo, al Selino, al Benaco). Luglio-Settembre.

H. montanum L. It. Iperico montano.

Luoghi erbosi, macchie de' colli e de' monti (Costalunga, Maddalena). Giugno-Agosto.

H. hirsutum L. It. Iperico peloso.

Rarissimo. Monti tra S. Onofrio e Conche. Giugno-Agosto.

Androsæmum All. Sist. Sex. Polyadelphia Polyandria.

A. officinale All. (Hypericum Androsæmum L. Bertol.)

It. Androsemo, Erba S. Lorenzo.

Colli e monti fra le rupi ombrose, raro. (Val di Vione presso Tignale). Giugno-Agosto.

Segue la famiglia delle GUTTIFERÆ, di cui la Cambodja gutta L. dell'India, e la Stalagmitis Cambodioides della China danno la gomma gota o Scammonèa gialla.

ORDO XIX. TILIACEÆ.

Tilia L. Sist. Sex. Polyandria Monogynia.

T. parvifolia Ehrh. It. Tiglio selvatico, Br. *Tei*.

Monti e prealpi, raro (Monte Dragone). Giugno.

T. grandifolia Ehrh. It. Tiglio d'Olanda, Tiglio nostrale.
Br. *Tei*.

Monti e prealpi, raro (Dragone, Dragoncello). Giugno.

Queste due specie, ed anche la *T. europæa* che non trovasi spontanea, coltivansi nei viali.

Il *Corchorus japonica*, Br. *Cocordine salde*, è originario del Giappone, e coltivasi comunemente nei giardini.

ORDO XX. ACERINÆÆ.

Acer L. Sist. Sex. Octandria Monogynia.

A. pseudo-platanus L. It. Acerofico, Platano falso. Br. *Àzer*, *Sicomoro*.

Sul monti, frequente (monti di Conche). Aprile-Giugno.

A. platanoides L. It. Acero riccio, Piè d'oca. Br. *Àzer bastard*.

Monti, raro (presso il castello di Serle). Aprile-Giugno.

A. campestre. L. It. Albero da vite, Loppio, Oppio. Br. *Opol*.

Selve montane, frequente. Coltivasi anche nel piano a sostegno delle viti. Aprile-Maggio.

A. monspessulanum L. It. Acero minore. Br. *Opolèt*.

Selve, raro (M. Maddalena, in cespugli). Aprile-Maggio.

1. *A. Negundo* L. originario dell'America coltivasi pe' viali.

ORDO XXI. HIPPOCASTANÆÆ.

Coltivansi: **Æsculus** L. Sist. Sex. Heptandria Monogynia.

Æsculus Hippocastanum. L. It. Ippocastano, Castagno d'India. Br. *Castagne amare*, dell'Asia: coltivasi pe' viali.

Æ. Pavia a fiori rossi, è meno comunemente coltivato.

La *Swietenia Mahagoni* L. della famiglia delle *Meliaceae* dell'America meridionale e delle Antille dà il legno detto *Acajòu* o *Mògano*, Br. *Mòghen*.

ORDO XXII. AURANTIACEAE.

Generi e specie coltivate:

Citrus L. Sist. Sex. Polyadelphia Icosandria.

C. Limonium Riss. It. Limone. Br. *Limù*.

Originario dell'Asia. Coltivasi in vasi e in aranciere sui *Ronchi*, e in molti altri luoghi, ma estesamente nella Riviera l'enacense. Varietà principali:

1. *Limù mazeng.* It. Limone maggengo. Frutti mezzani, ovali, capezzolo umbilicato, scorza sottile quasi liscia, succo abbondante, gradevolmente acido.
2. *Limù modernù* It. Limone madernino, simile all'antecedente, ma più piccolo, e quasi rotondo.
3. *Limù genovès.* It. Limone genovese. Grosso, sferico, corteccia fina, succosissimo.
4. *Limù gropulius* o *Pianta rossa.* Grosso, ovale, scorza grossa, bernoccoluta, capezzolo prominente, succo scarso.
5. *Limù manine.* It. Limone digitato. Frutto spartito a forma delle dita della mano. È una degenerazione mostruosa di tutte le precedenti varietà.
6. *Limù dols.* It. Limone dolce. Succo non acido, ma zuccherino insulso. È una mera curiosità.

C. medica L. It. Cedro Br. *Cedro*, *Sedro*.

Proviene dalla Media. Nella Riviera se ne coltiva principalmente la varietà a frutti grossi, un po' irregolari, a scorza grossa polposa, succo scarso. È il *Citrus Cidra* di Bisso, il quale ne fa una specie distinta.

C. Aurantium L. It. Arancio, Melarancio. Br. *Portogàl*, *Arans*, *Narans*.

Proviene, secondo alcuni, dall'Africa settentrionale; secondo altri fu importato dalle Indie orientali dal Portoghese. Nella Riviera se ne coltivano, ma poco estesamente, le seguenti varietà:

1. *Narans dols*. It. Arancio dolce. Frutto sferico, mezzano, corteccia fina, sucro dolce gustosissimo.
2. *Narans sanguani*. It. Arancio rosso. Quasi simile all' antecedente, ma col succo rosso.
3. *Bergamota*. It. l'ergamotta. Frutti piccoli, ovato-rotondi, odoratissimi, traenti del limone e dell' arancio.

C. *Bigaradia* Riss. (C. *Aurantii* varietas auctorum).

Le principali varietà coltivate sono:

1. *Chineta*. It. Chinetta. Frutti piccolissimi, rotondi, scorza quasi liscia, sottile.
2. *Perète*. It. Perette. Frutto piccolo in forma di pera.
3. *Pom d'Adamo*. It. Pomo d'Adamo. Frutto grossissimo, sferico, scorza bernoccoluta.

A questa famiglia appartengono ancora:

Camellia Japonica L. It. e Br. *Camelia*, originaria del Giappone e della China. Dalla coltura provenne un numero sterminato di varietà che va tuttodi aumentando.

<i>Thèa Fohèa</i> L. It. Te bruno	} arboscelli che crescono nella China.
<i>Thèa viridis</i> L. It. Te verde	

ORDO XXIII. AMPELLIDEE.

Vitis L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

V. *vinifera* L. It. Vite selvatica e domestica. Br. *Vit*, *It*, *Vigna*, *Igna*.

È indigena dell'Italia, e trovasi selvatica o rinselvaticata in vari luoghi montani della provincia lontanissimi da ogni coltivazione, p. es. sul Dragone.

Nella provincia se ne coltivano più di 50 varietà, di cui le più comuni sono le seguenti:

1. *Aliana bianca*. It. Lugliatica bianca. Comune. Acini bianchi, spessi: matura in Luglio.
2. *Aliana rossa*. It. Lugliatica rossa. Varietà dell' antecedente, ad acini rosso-scuri.
3. *Berzamina grossa*. It. Berzamino o Marzimino grosso: acini neri, sferici, rari, grossi: succo dolcissimo.

4. *Berzamina gentile*. It. Perzamino gentile. Varietà dell' antecedente, ad acini molto più piccoli.
5. *Bagnala*. It. Prugnola. Acini neri, sferici, grossissimi, fra i quali s' interpongono alcuni piccolissimi, e tuttavia perfettamente maturi.
6. *Corra*. It. Corvina. Acini ovali, neri con riflessi violaceo-scuri, pelle dura.
7. *Corra del Angiua*. Varietà dell' antecedente, ad acini più grossi.
8. *Erba mat*. It. Gropello bianco. Acini bianchi, spessissimi, aggruppati, e per la vicendevole compressione angolosi. Abbonda nella Riviera.
9. *Grapela negra a pignala*. It. Gropello nero. Come l' antecedente, ma ad acini neri.
10. *Malvazia bianca*. It. Malvasia bianca. Acini d' un bianco giallo dorato, pelle sottile, succo dolceissimo.
11. *Malvazia negra*. It. Malvasia nera. Varietà dell' antecedente, ad acini neri.
12. *'Mbrūnsca bianca*. It. Brumesta bianca. Acini grossi, ovali, resistenti, rari, pelle dura.
13. *'Mbrūnsca rossa*. It. Brumesta rossa. Varietà dell' antecedente, ad acini rossi.
14. *'Mbrūnsca negra*. Varietà ad acini neri.
15. *Negréra o Motenéra*. It. Farinaccia. Acini quasi sferici, pelle duretta, coperta d' un appannamento bianchiccio.
16. *Moscatel bianc*. It. Moscadello bianco. Acini quasi sferici, bianco-aurati, pelle piuttosto sottile, succo dolce moscato.
17. *Moscatel ross*. It. Moscadello rosso. Varietà ad acini rosso-bruni.
18. *Rasséra*. It. Barbarossa. Acini piuttosto spessi, quasi sferici, pelle rossiccia, sottile, succo poco dolce.
19. *S-ciàa, S-ciaéta*. It. Schiava. Acini rari, pelle rosso-carica, esilissima, succo dolce delicato.
20. *Uzilina*. It. Uvetta selvatica. Acini rari, piccolissimi, succo asprello.
21. *Vernassa, Ernassa negra*. It. Vernaccia nera. Acini più o meno densi, neri, sferici mezzani, pelle duretta, succo denso, dolceissimo.

- 22 *Vernassa bianca*. It. Vernaccia bianca. Varietà dell' antecedente, ad acini bianchi.
- 23 *Vernassù*. It. Vernaccia grossa. Varietà della Vernaccia nera, ad acini più grossi.
- 24 *Zebèbo ross.* It. Zibibbo rosso. Acini di color rosso-carico, rari, grossi, lungo-ovali, pelle dura, polpa resistente ai denti, rari, succo d' un dolce suo proprio.
- 25 *Zebèbo bianc.* It. Zibibbo bianco. Come l' antecedente, ma ad acini bianchi.
- 26 *Zebèbo moscatel* It. Zibibbo moscato. Come il bianco, ma con sapore soave di moscadello.
- 27 *Lambrasca*. It. Lambrusca. Varietà vicina alla selvatica; acini mediocri, rari, rosso neri, succo aspro.
- 28 *Ua Isabela*. It. Isabella. Di recente introduzione; acini poco densi, rosso-scuri, sferici: succo dolce traente alla fragola, nauseante. Dà vino mediocre.

Coltivasi anche più per curiosità che per profitto:

V. laciniosa. It. e Br. Uva americana, proveniente dall' America settentrionale, forse dal Canada.

L' Uva passuola o Uva di Corinto, Br. *Ua passa*, è una sorta d' uva ad acini piccolissimi, talvolta senza semi, proveniente così appassita dall' Arcipelago Greco.

L' Uva di Candia, Br. *Ua cangiota*, è uva quasi simile allo Zibibbo, appassita al sole o al forno, proveniente da Candia, dalla Sicilia e dalle Isole vicine.

Coltivasi ad ornamento delle muraglie:

Ampelopsis bederacea Michaux. It. Vite a cinque foglie, Br. *Ligabosc sic fœ*, dell' America settentrionale.

ORDO XXIV. GERANIACEÆ.

Geranium L. Sist. Sex. Monadelphia Decandria.

G. macrorrhizon L. It. Geranio crestato. Br. *Geranio salvàdeg*.

Rupi e frane dei monti e delle prealpi, frequente (monti di Nave, Dragone, Cornablaça v. Aprile-Giugno).

- G. *Phæum* L. It. Geranio stellato. Br. *Geranio salvadeg.*
Boschi cedui, frequentissimo. (Monti di Conche, Val di Pez-
zaze, Irma, Guglielmo). Maggio-Settembre.
- G. *nodosum* L. It. Geranio nodoso.
Boschetti ombrosi dei colli e dei monti, frequentissimo. (Mar-
gherita, Maddalena). Maggio-Ottobre.
- G. *sylvaticum* L. It. Geranio silvano. Br. *Geranio salvadeg.*
Boschi folti dei colli e dei monti, poco frequente (Dossalto).
Maggio-Agosto.
- G. *pratense* L. It. Geranio dei prati. Br. *Geranio de mont.*
Prati alpini, rarissimo (Vette delle Colombine presso Ravè-
nola vaga, Monte Guglielmo a Costaricca). Luglio-Ag.
- G. *aconitifolium* L'Herit. It. Geranio lupajo.
Rupi e frane delle prealpi, raro (Colombine, Broffione).
Luglio-Agosto.
- G. *sanguineum* L. It. Geranio sanguigno, Sanguinaria.
Br. *Geranio de prat.*
Margini dei campi, e prati dei colli e dei monti, frequentis-
simo. Maggio-Agosto.
- G. *pyrenaicum* L. It. Geranio malvino.
Selve montane, rarissimo (Val Bertone presso Caino).
Aprile-Giugno
- G. *argenteum* L. Geranio argentino.
Rupi prealpine, rarissimo (Vette di Vaja). Luglio-Agosto.
- G. *pusillum* L. It. Piè di gallo celestino.
Pascoli dei colli e dei monti, raro (Prati ed orti a Gardone
V. T.). Maggio-Agosto.
- G. *dissectum* L. It. Geranio sbrandellato. Br. *Geranio sal-
vadeg.*
Margini dei campi, fra le messi, frequente (Ferrovia da Bre-
scia a S. Francesco; tra Pozzolengo e il Benaco). Mag-
gio-Giugno.
- G. *columbinum* L. It. Piè colombino. Br. *Geranio salvadeg.*
Colli, campi, strade, frequentissimo (Casiello, Collebeato,
Rezzato). Aprile-Ottobre.

- G. rotundifolium* L. It. Malvaccino. Br. *Malva selvàdega*.
 Margini dei campi, orti, rottami, frequentissimo. Apr.-Giug.
G. molle L. It. Geranio volgare, Piè di gallo.
 Prati, orti, ruderali, vie, frequentissimo. Marzo-Giugno.
G. lucidum L. It. Geranio lucido.
 Rupi dei monti Maddalena e Dragoncello, raro. Aprile-Luglio.
G. robertianum L. It. Cicuta rossa, Erba cimicina, Erba
 roberta. Br. *Erba de S. Roc.*
 Muri, siepi, ruderali, vie, frequentissimo. Aprile-Agosto.
β. purpureum Vill. Colli a Cajonvico.

Erodium L' Herit. Sist. Sex. Monadelphia Pentandria.

- E. cicutarium* Wild. It. Erba cicutaria. Br. *Maigole bastarde*.
 Vie, ruderali, margini dei campi, frequentissimo (Castello,
 Ronchi) Marzo-Agosto.
E. ciconium Wild. It. Becco di grue. Br. *Bec de ozèl, Spilù*.
 Castello presso S. Urbano, Ronchi a S. Eufemia. Apr.-Mag.
E. moschatum Wild. It. Geranio muschiato. Br. *Erba de*
mæs-g.

Coltivasi a ornamento, e si riproduce qua e là spontanea-
 mente. Maggio-Giugno.

Di questa famiglia coltivansi moltissime specie e varietà es-
 otiche, di cui le seguenti hanno anche nomi volgari:

- Pelargonium zonale* Wild. Br. *Erba pèer*,
P. odoratissimum Wild. Br. *Erba canela*,
P. Rhodula Wild. Br. *Erba ræza*,
 tutti e tre del Capo di Buona Speranza.

A questa famiglia appartengono pure:

- Tropæolum majus* } Br. *Nastrassie*, del Perù.
T. minus }

ORDO XXV. BALSAMINEÆ.

Impatiens L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

- I. Noli-tangere* L. It. Erba impaziente.

Boschetti umidi, rive de' torrenti, frequente (strada prima
 di Collio, da Bovegno a Graticelle). Giugno-Luglio.

La *I. Balsamina* L. Br. *Bei om*, indigena delle Indie orientali, è comunemente coltivata per ornamento.

ORDO XXVI. OXALIDÆ.

Oxalis L. Sist. Sex. Decandria Pentagynia.

O. *Acetosella* L. It. *Acetosella*, *Alleluja*, *Pancùculo*. Br. *Alelùja*, *Erba salina*.

Boschetti, margini erosi dei colli e dei monti, frequentissimo. Marzo-Luglio.

O. *stricta* L. It. *Lujola* maggiore. Br. *Alelùja zalda*, *Prat caali*.

Margini dei fossi e dei campi, frequente (dietro il Castello, Costalunga, Lograto). Maggio-Ottobre.

O. *corniculata* L. It. *Acetosella*, *Pancùculo*, *Trifoglio acetoso*. Br. *Alelùja zalda*, *Prat caali*.

Orti, campi, strade, muri, frequentissima. Marzo-Settembre.

ORDO XXVII. ZYGOPHYLLÆ.

Tribulus L. Sist. Sex. Decandria Monogynia.

T. *terrestris* L. It. *Tribolo* terrestre.

Campi sterili, strade, raro (Travagliato). Giugno-Ottobre.

ORDO XXVIII. RUTACÆ.

Ruta L. Sist. Sex. Decandria Monogynia.

R. *graveolens* It. *Ruta*. Br. *Erba rüga*.

Colli aprichi e lungo i laghi Benaco e Sebino, frequentissima. Giugno-Agosto.

Dictamnus L. Sist. Sex. Decandria Monogynia.

D. *albus* L. (D. *Fraxinella* et *obtusiflorus* Koch). It. *Frassinella*. Br. *Frassinèla*.

Colli aprichi (sopra S. Eufemia ed Urago Mella, frequente). Aprile-Giugno.

Il *Guajacum officinale* ed il *G. sanctum* L. It. Guajaco, Legno santo, Br. *Legn sant*, sono alberi delle Antille e del Messico.

Dalla *Quassia excelsa*, albero dell'America, traesi il medicinale *Legno di Quassia*, Br. *Quassia*.

Dalla *Quassia Simaruba*, albero della Giamaica e della Carolina, togliesi la medicinale Simaruba, Br. *Simaruba*, corteccia della sua radice.

SUBCLASSIS II. CALYCIFLORE.

ORDO XXIX. CELASTRINEÆ.

Staphylèa L. Sist. Sex. Pentandria Trigynia.

S. pinnata L. (Stamina 5-8) It. Lacrime di Giobbe, Pistacchio falso. Br. *Biascù, Pistag salvadeg*.

Selvette del colle Badia, e presso Urago Mella. Apr.-Magg.

Evònymus L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

E. europæus L. It. Evònimo, Berretta da prete, Fusagine. Br. *Beretine de pret, Capiline de pret, Legn quader*.

Selve di collina e di monte, frequentissimo. Maggio-Giugno.

E. latifolius Wild. It. Fusaria maggiore. Br. *Beretine de pret*.

Selve montane, raro (lungo la seriola Fusa tra Paratico e Palazzolo). Maggio.

ORDO XXX. RHAMNEÆ.

Pallurus Tournef. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

P. aculeatus Lam. (*P. australis* Bertol.). It. Paliuro, Piatini, Spina giudaica. Br. *Spi de capèla*.

Colle Badia e campagna di Calcinato, frequentissimo. Coltivasi per le siepi. Maggio-Giugno.

Zizyphus Tournef. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

Z. vulgaris Lam. It. Giuggiolo, Zizzolo. Br. *Zèbie, Zizole*.

Vuolsi originario della Siria. Coltivasi pel frutto, e cresce talora spontaneo nelle siepi e nei dumeti. Luglio.

Rhamnus L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

R. catharticus L. It. Ranno, Spin cervino. Br. *Spi servi*, *Spi zardi*, *Spi morèl*.

Boschetti montani, poco frequente (Botticino, Serle). Maggio-Giugno.

R. saxatilis L. It. Licio italiano. Br. *Spine*.

Colli al Benaco, al Sebino fra Marone e Vello, Monticelli, Lumezzane, frequente. Aprile-Luglio.

R. pumilus L. It. Ranno spaccasassi. Br. *Onizi*.

Monti e prealpi fra le rupi, frequente (monte Pajo, monte Fronden a Prada, monte Ario ad oriente. Maggio-Giugno.

R. Frangula L. It. Alno nero, Frangola. Br. *Onès salva-deg*, *Empèrsec*, *Legn negher*.

Selve montane e siepi al piano, frequente (colli di Nave e di Mompiano, margini dei campi a Lograto). Mag.-Giug.

ORDO XXXI. TEREBINTHACEÆ.

Pistacia L. Sist. Sex. Diœcia Pentandria.

P. Terebinthus L. It. Cornucopia, Terebinto. Br. *Scarpalœs*, *Orgna*.

Colli apriel suburbani e Benacesi, frequentissimo. Apr.-Mag. 1.ª infezione di un insetto (*Aphis Pistaciæ*) dà alle foglie una forma di corno, o in altra guisa strana.

La *P. vera* L. It. Pistacchio, Br. *Pistâc*, è spontanea nella Grecia e nell'Asia.

Rhus L. Sist. Sex. Pentandria Trigynia.

R. Còtinus L. It. Còtino, Scòtano. Br. *Ræss*, *Cæden*, *Schæden*.

Tutti i colli apriel della provincia, frequentiss. Magg.-Giug.

Il *R. Coriaria* L. Br. *Sæmâc*, che si usa per la concia delle pelli di capra, è comune sull'Apennino.

Il *R. Typhina*, coltivato nei giardini e nei viali, e rimarchevole per le panocchiette coniche rosso-scure persistenti nell'inverno, è originario della Virginia.

Coltivasi per ornamento dei viali:

Ailantos glandulosa Dest. (Sist. Sex. Monœcia Polyandria) della China.

Dalla *Boswellia thurifera* Roxburg, albero dell' Indie orientali, si trae per incisione l' incenso genuino, Br. *Ensens*. Gommo-resine usate come incenso si traggono anche da altri alberi (V. *Pinus*).

ORDO XXXII. PAPILIONACEÆ.

Spartium L. Sist. Sex. Diadelphia Decandria.

S. junceum L. It. Ginestra di Spagna. Br. *Ginestra, Zenestra*.

Sponde occidentali del Benaco (Gargnano). Maggio-Luglio.

Sarothamnus Wimm. Sist. Sex. ut supra.

S. vulgaris Wimm. (*Spartium scoparium* L. Bertol.). It. Èstrici, Ginestra da granate, Scornabecco. Br. *Ginestra, Zenestra*.

Colli e monti, frequentissimo (Val di Pezzaze fino alla cima). Maggio-Giugno.

Genista L. Sist. Sex. ut supra.

G. pilosa L. It. Ginestra tuberculosa.

Ericeti e luoghi umidi, rarissima (monti sopra Tremosine). Maggio-Giugno.

G. tinctoria L. It. Baccellini, Ginestrella. Br. *Corniaela*. Colli erbosi e lame, frequentissima. Giugno-Settembre.

G. ovata Wild. It. Ginestra pelosa. Br. *Corniaela*.

Colli e monti asciutti, rara (Dragoncello pendio meridionale). Giugno-Settembre.

G. germanica L. It. Bulimàcola, Ginestra spinosa.

Tutti i colli, frequentissima.

Cytisus L. Sist. Sex. ut supra.

C. Laburnum L. It. Averniello, Laburno, Maggiociòndolo. Br. *Èghen, Èzel, Èzen*.

Selve dei colli e dei monti, frequentissimo. Magg.-Giugno.

C. alpinus Mill. It. Averniello d'alpe. Br. *Gali, Èghen*.

Selve del Guglielmo presso Pezzoro, frequente. M. Dragone, raro. Giugno-Luglio.

C. nigricans L. It. Maggio.

Tutti i colli, frequentissimo (Riviera, Badia, Iseo ecc.). Maggio-Luglio.

C. sessifolius L. It. Majella. Br. *Majalègor*.

Tutti i colli della provincia, ed anche in pianura: Apr.-Mag.

C. capitatus Jacq. It. Citiso ombrellato.

Maddalena al Buren. Maggio-Giugno.

C. prostratus Scop. It. Citiso sanguigno.

Colli e mouti, frequentiss. (Selvapiana sopra Serle). Aprile-Giugno.

C. hirsutus L. It. Citiso peloso.

Colline a Collebeato, Urago. Aprile-Giugno.

C. purpureus Scop. It. Citiso rosso.

Riviere del Benaco e del Sebino, presso S. Eusebio, frequentissimo. Aprile-Maggio.

C. radiatus Koch. (Spartium radiatum L. Bertol.). It. Ginestra stellata. Br. *Ginestrina*.

Monte Guglielmo a Costaricca, frequentissimo. Giug.-Agosto.

C. argenteus L. It. Citiso argentino.

Colli a S. Eufemia, a Monte d' Isola, al Benaco, frequente. Aprile-Luglio.

Lupinus L. Sist. Sex. ut supra.

L. albus L. It. Lupino, Ganajoli. Br. *Lui*.

Originario dell' Oriente, ma da tempo immemorabile fatto indigeno. Coltivasi pei semi e per sovesci, e trovasi qua e là spontaneo. Aprile-Giugno.

Il seme del *L. odoratus* Hortul. della Sicilia. Br. *Faa grega*, si mette da taluni nelle scatole da tabacco.

Ononis L. Sist. Sex. ut supra.

O. spinosa L. It. Anònide, Bulimàcola. Br. *Malàeghe, Zamarei, Bonàgra*.

Letto e margini dei torrenti; luoghi sassosi, frequentissima. Giugno-Settembre.

β . *repens* L. Colla specie, frequente.

O. Columnæ All. (O. Cherlèri L Bertol.). It. Bulimàcola montana. Br. *Zamarèi*.

Gargnano presso i molini; colli fra Desenzano e Venzago; colli ad Urago-Mella. Maggio-Agosto.

O. nutrix Lam. It. Erba bacaja. Br. *Malàeghe zalde*.

Margini dei fiumi, ruderali, luoghi arenosi, frequentissima. Giugno-Agosto.

β. pinguis L. floribus rubro-striatis. Al Vella presso Roncadelle.

O. minutissima L. It. Bulimàcola barbata.

Colli presso Brescia e Salò. Giugno-Settembre.

Anthyllis L. Sist. Sex. ut supra.

A. vulneraria L. It. Vulneraria.

Colli e monti, frequentissima. Aprile-Giugno.

β. hirsutissima. Luoghi secchi.

γ. rubriflora. Luoghi aprici e pietrosi

A. montana L. It. Vulneraria montana.

Monti e prealpi, rarissima (Maniva). Giugno-Luglio

Medicago L. Sist. Sex. ut supra.

M. sativa L. It. Erba medica, Erba Spagna, Cedràngola.

Br. *Erba medica*, *Erba Spagna*.

Plinio la vuole originaria della Media. Coltivasi a foraggio, e cresce da sé sui colli, ed ai margini de' campi. Maggio-Settembre.

β. versicolor Koch. Qua e là colla specie. (Ferrovia a S. Eufem.).

M. falcata L. It. Erba medica di fior giallo. Br. *Erba Spagna salvadega*.

Colli e prati all' aprico, frequentissima (Castello, Maddalena, Riviera). Maggio-Settembre.

β. versicolor Koch. Colla specie, rara (Castello).

γ. glandulosa Koch. (M. glomerata Bertol.). Ai Camaldoli.

δ. procumbens Bess. In terreni morbidi, rara.

M. lupulina L. It. Trifogliano selvatico.

Campi, prati, strade, frequentissima. Maggio-Luglio.

M. orbicularis All. It. Fondello, Trifogliuolo storto.

Luoghi erbosi dei colli, frequente (Badia, Ronchi) Mag.-Lug.

M. Gerardi WK. It. *Medica pelosetta*.

Margini dei campi, muri, frequente (Castello, Ronchi). Mag.
gio-Luglio.

M. minima Lamk. It. *Trifoglio lappoloso*.

Come la precedente, frequentissima. Maggio-Giugno.

β . *longiseta* DC. — Quarone, Camaldoli.

γ . *mollissima* Spreng. — Rara; rottami al Castello.

M. denticulata Wild. It. *Medica uncinata*.

Tra le messi dei colli, rara (ai Campiani). Maggio-Luglio.

M. carstiensis Wulf. It. *Medica crinita*.

Colline, frequente (Bornada, Nompiano, Capriano). Apr.-Giug.

Melilotus L. Sist. Sex. ut supra.

M. alba Desrousseaux (*M. vulgaris* Wild. Bert.). It. *Tribolo bianco*.

Margini dei campi e delle vie del piano e dei monti, frequentissimo. Giugno-Agosto.

M. macrorhiza Pers. (*M. officinalis* Vild. Bert.). It. *Meliloto gigantesco*.

Sponde meridionali del Benaco nei prati umidi, frequentissimo. Luglio-Settembre.

M. officinalis Desrous. (*M. arvensis* Wallr. Bert.). It. *Loto domestico*, *Meliloto odoroso*, *Zolfaccio*, *Trifoglio cavallino*.

Margini dei campi e delle vie dei colli e del piano, frequentissimo. Giugno-Agosto.

M. parviflora Desf. It. *Tribolo granelloso*.

Colline nei dintorni di Venzago, rara. Maggio-Agosto.

Trigonella L. Sist. Sex. ut supra.

T. monspeliaca L. It. *Sertola stellata*.

Colli aprici, rara (Gussago, Cajonvico). Marzo-Giugno.

Trifolium L. Sist. Sex. ut supra.

T. pratense L. It. *Trifoglio di prato*, *Capo rosso*. Br. *Trefoi ross*, *Prat ross*.

Prati e luoghi erbosi dal piano alle prealpi, frequentissimo. Maggio-Ottobre.

- β. albiflorum*. Prati tra Pozzolengo e il Benaco, frequente.
γ. expansum Reich. *β* Alpi di Vaja; raro (1).
T. medium L. It. Trifoglio serpentino.
 Colli erbosi, frequente (Bovezzo). Maggio-Luglio.
T. alpestre L. It. Trifoglio alpestre.
 Coll. e monti sassosi, frequente (Dal Buren al vertice del Maddalena). Maggio-Settembre.
T. rubens L. It. Trifoglio rosso. Br. *Trefoi caali salvadeg*.
 Colli e monti sterili, frequente (Badia, Maddalena). Maggio-Settembre.
T. ochroleucum L. It. Trifoglio giallognolo.
 Coll. suburbani, di Virle, di Salò, di Gargnano, frequente. Maggio-Giugno.
T. incarnatum L. It. Trifoglio pesarone. Br. *Trefoi ross*.
 Pascoli di collina e di monte, frequente (Badia, Vestione lungo il Chiese). Aprile-Maggio.
β. Molinerii. Bal. Promiscuo colla specie.
T. angustifolium L. It. Coda di volpe, Trifogliolo.
 Colli tra Montechiaro e Carpenedolo; Campagna di Montechiaro, frequente. Maggio-Giugno.
T. subterraneum L. It. Trifoglio sotterraneo.
 Luoghi ghiaiosi, raro (lungo il Chiese presso Goglione). Mag.
T. fragiferum L. It. Trifoglio fragolino.
 Prati umidi, vie dei colli e del piano, frequentiss. Giug.-Sett.
T. scabrum L. It. Trifoglio dei muri.
 Muri, vie, pascoli secchi, poco frequente (mura di Brescia ad oriente; alla Badia, S. Eufemia, Cajonvico). Apr.-Giug.
T. resupinatum L. It. Trifoglio trifogliolo.
 Luoghi incolti presso le ortaglie al sud di Brescia. Giug.-Lug.
T. arvense L. It. Erba lepre, Moscini. Br. *Trefoi gätol*.
 Campi, prati secchi, vie, frequentissimo Maggio-Settembre.

(1) In *T. pratensis*: *Lucus 1.^{us}* Follolis quaternis, quinis, senis Hoc frequens in cultu *Lucus 2.^{us}* Corollia viridi-herbaceis, bracteis dentibusque calycinis corollam explicatam æquantibus. In pratis cultis haud raro.

- T. alpinum** L. It. Trifoglio dolce.
Pascoli prealpini, frequentissimo (Desduna, Colombino, Vaja, Dessoalto). Giugno-Agosto.
- T. montanum** L. It. Trifoglio montano.
Pascoli dei colli e dei monti, frequente (Badia, Maddalena). Aprile-Luglio.
- T. nigrescens** Viv. It. Trifoglio dei pascoli.
Pascoli secchi e vie del piano, frequente (Verolanuova). Aprile-Giugno.
- T. cespitosum** Reyn. It. Trifoglio rupino.
Rupi e frane delle prealpi, raro (Alpi di Vaja ad un torrentello). Luglio-Agosto.
- T. repens** L. It. Trifoglio di prato, Trifoglio bianco. Br. *Trefoi ladi*.
Prati, campi, vie fino alle prealpi, frequentissimo, Mag.-Giug.
- T. elegans** Sav. It. Trifoglio grazioso.
Prati e pascoli umidetti, frequente (Dello, Harbariga). Maggio-Luglio.
- T. minus** Reth. (T. filiforme Hook.). It. Trifogliolo minuto.
Cespugli dei colli della bassa Riviera, raro. Maggio-Agosto.
- T. patens** Schreb. It. Trifoglio dorato.
Prati e luoghi erbosi, specialmente del piano, frequente (Cimitero). Maggio-Agosto.
- T. procumbens** L. It. Luppolino, Pratolino. Br. *Trefoi*.
Colli e luoghi secchi del piano (campagna di Montechiaro frequentissimo). Maggio-Agosto.
- T. agrarium** L. It. Trifoglio luppolino. Br. *Trefoi zald*.
Luoghi erbosi montani, frequente (colli a Provaglio, Provezze, Pezzaze). Giugno-Luglio.
- T. badium** Schreb. It. Trifoglio capolone.
Pascoli prealpini, frequente (vette del Dossoalto). Lug.-Ag.
- Dorycnium** Tourn. Sist. Sex. ut supra.
- D. herbaceum** Vill. It. Trifogliino.
Tutti i colli all'aprico, frequentissimo. Giugno-Luglio.
- β . *villosum*. A S. Eufemia.

Lotus L. Sist. Sex. ut supra.

L. corniculatus L. It. Ginestrina, Trifoglio giallo. Br. *Scarpine de la Madona*.

Luoghi erbosi dal piano alle prealpi, frequentiss. Aprile-Ag.
 β . villosus Thuil. Colli aprici a Costalunga.

L. tenuis WK. (*L. tenuifolius* Rehb Koch.) It. Loto sottile. Br. *Scarpine de la Madona*.

Luoghi palustri e prati umidi (al sud d' Iseo). Maggio-Ag.

L. uliginosus Schk. (*L. major* Scop. Bertol.). It. Loto fistoloso. Br. *Scarpine de la Madona*.

Luoghi palustri od umidi, raro (Sebino all' imboccatura dell' Oglio). Giugno-Agosto.

Tetragonolobus Scop. Sist. Sex. ut supra.

T. siliquosus Roth. (*Lotus tetragonolobus* L. Bert.) It. Veccia pisella.

Luoghi erbosi umidi dal piano ai monti (Bagnolo frequentissimo). Aprile-Agosto.

Phaca L. Sist. Sex. ut supra.

Ph. astragalina DC. It. Vescicaria alpina.

Frane e dirupi delle prealpi, rara (Rondenino al nord).
 Giugno-Agosto.

Ph. alpina L. It. Vescicaria gialla.

Luoghi arenosi umidi prealpini, frequente (Val di *Panè* presso al monte Blemnone). Luglio-Agosto.

Ph. australis L. It. Vescicaria vecciarina.

Pascoli del monte Broffone, rara Luglio-Agosto.

Galèga L. Sist. Sex. ut supra.

G. officinalis L. It. Capraggine, Ruta capraria. Br. *Galèga, Galbèna, Sena be sena mal, Chægjà-pirù*.

Margini dei fossi e campi umidi, frequentissima. Magg.-Giug.
 β . albiflora. Fossi a Torbole.

Colutèa L. Sist. Pex. ut supra.

C. arborescens L. It. Erba vescicaria, Sena falsa. Br. *S-cioparài*.

Sponde superiori del Benaco, ne' boschetti. Maggio-Agosto.

Oxypetals DC. Sist. Sex. ut supra.

O. montana DC. It. Astragalina montana.

Rupi erbose delle prealpi (presso Crux Domini . Lug.-Ag.

O. campestris DC. It. Astragalina villosa.

Sopra una rupe ertissima dell'alpe di Vaja, rariss. Luglio.

O. pilosa DC. It. Astragalina pelosa.

Rupi a S. Bartolomeo presso Serle, rara. Luglio-Agosto.

Astragalus L. Sist. Sex. ut supra.

A. Onobrychis L. It. Cece astragalino.

Pascoli magri dei colli, frequente (Montechiaro, Carpenedolo). Giugno-Agosto

A. Cicer L. It. Cece selvatico.

Sponde del Chiese fra Visano e Remedello, raro. Giug.-Lug.

A. hamosus L. It. Meliloto falso.

Colli tra Vallio e Vobarno, rarissimo. Marzo-Maggio.

A. glycyphyllus L. It. Liquirizia bastarda, Vecciarini.

Luoghi erbosi dei colli e del piano, frequente. Magg.-Agosto.

A. monspessulanus L. It. Vecciarino rosato.

Colli a Salò ed a Gardone benacense, frequentissimo, monti Missuolo e Gera bassa. Aprile-Maggio.

Dall'A. creticus Pers. stilla la gomma dragante Br. *Dragant*.

Coronilla L. Sist. Sex. ut supra.

C. Emerus L. It. Emero, Erba cornetta. Br. *Majalégor*.

Tutti i colli, frequentissima. Marzo-Giugno.

C. vaginalis Lam. It. Scorpioide alata.

Vette dei monti soprastanti a Lumezzano, frequentissima. Maggio-Giugno.

C. minima L. It. Scorpioide minuta.

Colli di Salò e di tutta la Riviera alta, frequentissima. Maggio-Settembre.

C. montana Scop. It. Scorpioide montana.

Monti sopra Limone, rara. Maggio-Giugno.

C. scorpioides Koch (*Artrolobium scorpioides* Desv. Bertol.) It. Erba d'amore, Piè corvino.

Campi magri del piano fra le messi, frequente (Campagna

di Montechiaro; campi fra Desenzano e Venzago). Maggio-Giugno.

C. varia. L. It. Erba ginestrina, Vecciarini. Br. *Vessuna, Essuna.*

Dumeti, margini dei campi ovunque, frequentissima. Maggio-Luglio.

Hippocrepis L. Sist. Sex. ut supra.

H. comosa L. It. Sferza cavallo

Colli aprii, frequente Nave, Urigo, Riviera). Apr.-Maggio.

Ornithopus Desv. Sist. Sex. ut supra.

O. perpusillus L. It. Uccellina minuta.

Monti Missuolo, Gera bassa; praterie del Catino (Zant.). Maggio-Luglio.

Hedysarum L. Sist. Sex. ut supra.

H. obscurum L. It. Lupinella d'alpe.

Vette del monte Dossalto, frequente. Luglio-Agosto

Onobrychis Tournef. Sist. Sex. ut supra.

O. sativa Lamk. It. Lupinella, Sanofiemo. Br. *Erba Spagnola salvadega.*

Pascoli secchi de' monti e del piano Desenzano, Lonato, Venzago, Campagna di Calcinatello, frequentissima). Giugno-Luglio.

β . montana DC. Valle di Marone.

Cicer L. Sist. Sex. ut supra.

C. arietinum L. It. Cece. Br. *Sézer.*

Qua e là fra le messi. Coltivasi per semi mangiabili. Giug.-Luglio.

Vicia L. Sist. Sex. ut supra.

V. sylvatica L. It. Veccia silvana.

Monte Broffione a mezza salita, rarissima. Luglio-Agosto.

V. dumetorum L. It. Veccia boschiva.

Siepi a Coccaglio e Rovato, e presso Mompiano, rara. Giugno-Agosto.

V. Cracca L. It. Cracca.

Siepi e dumeti montani, frequente (Pezzaze, Vestone, Anfo). Luglio-Agosto.

β. tenuifolia Roth. Val di Pezzaze.

V. Gerardi DC. It. Veccia montanina.

Dorso del Guglielmo fin presso la vetta, frequente. Giug. Lug.

V. dasycarpa Ten. (V. villosa *β.* Koch.) It. Zizania Br.

Essa salvàdega.

Margini dei campi, siepi, messi de' colli e del piano, frequentissima. Maggio-Luglio.

V. Faba L. It. Fava. Br. *Fàa.*

Vuolsi originaria delle spiagge del mar Caspio. Coltivasi da tempi remotissimi pe' semi eduli. Aprile-Maggio.

β. minor. It. Fava cavallina. Br. *Faèta.* Nella provincia coltivasi assai di raro.

V. narbonensis L. It. Veccia selvatica. Br. *Essa salvàdega.*

Fra le messi del piano, frequente. Aprile-Maggio.

V. sepium L. It. Veccia silvana. Br. *Essa.*

Boschetti e siepi dal piano alle prealpi, frequente (monte Conche, Serle, Pezzaze, Badia ecc.). Aprile-Luglio.

V. lutea L. It. Cicerchia pelosa.

Fra le messi, poco frequente (Verolanuova, Camignone). Maggio.

V. sativa L. It. Veccia, Veccia dolce. Br. *Essa, Vessa.*

Fra le messi e in luoghi erbosi, frequentissima. Maggio-Giugno (4).

V. angustifolia Roth. It. Veccia sottile. Br. *Essina.*

Fra le messi, frequente (Camignone, Rezzato). Maggio.

β. Bobartii Forst — Campi arenosi.

V. Bithynica L. It. Veccia scabra.

Fra le messi a Calcinatello, Ghedi. Maggio-Giugno.

V. peregrina L. It. Veccia smussata. Br. *Essa.*

Campi secchi arenosi, frequente (Montechiaro, Lonato, Venzago). Giugno.

(4) Nonnulla specimina possideo, quae inter segetes collegi, in quibus haec mihi adnotanda videntur:

V. stipulis ovato-acumatis, integerrimis, inferioribus semi-sagittatis; vexillo alveo, alis alveis rosaceis, vena purpurea, carina albida. In ceteris V. sativae similissima. Totus flos exsiccatione lutescit.

V. lathyroides L. It. Veccia serena. Br. *Essa piccola*.

Luoghi erbosi dei colli fra Calino ed Adro, frequente. Marzo-Aprile.

Ervum L. Sist. Sex. ut supra.

E. hirsutum L. It. Veccia, Tentennino.

Luoghi erbosi de' colli e de' monti, frequentissimo. Aprile-Giugno.

β. Tenorii Ten. Rupi presso la chiesa di Serle.

E. tetraspermum L. It. Tentennino.

Campagna di Montechiaro fra le messi, poco frequente. Aprile-Giugno.

β. gracile DC. Colla specie.

E. Lens L. It. Lente, Lenticchia. Br. *Lentècia*.

Luoghi erbosi e fra le messi (Vestone). Coltivasi pei semi eduli. Maggio-Giugno.

E. Ervilia L. (Vicia Ervilia Wild. Bert.) It. Ervo, Zirlo, Veggiolo.

Fra le messi, raro. Coltivasi pur di raro per foraggio e pei semi. Giugno-Luglio.

Pisum L. Sist. Sex. ut supra.

P. arvense L. It. Pisello rubiglio. Br. *Roajòt salvadeg*.

Fra le messi, raro. Coltivasi, ma è d'assai inferiore al seguente. Marzo-Giugno.

P. sativum L. It. Pisello. Br. *Roajòt*.

Coltivansene parecchie varietà poco distinte e senza nome nel dialetto; quella a baccello tenero mangiabile insieme col semi dicesi *Roajòt grass e tener*. Trovasi qua e là spontaneo tra le messi. Marzo-Maggio.

Lathyrus L. Sist. ut supra.

L. Aphaca L. It. Veccia bastarda, Majorella. Br. *Roaioti*.

Fra le messi, e nei luoghi erbosi, frequentissimo. Mag.-Giug.

L. Nissolia L. It. Cicerbita semplice.

Campi a Lumezzane, raro. Maggio-Giugno

L. Cicera L. Bert. Koch. It. Mechi.

Luoghi erbosi dei colli (S. Eufemia, Urigo, Serle, Lonato). Aprile-Maggio.

- L. sativus* L. It. Cicerchia, Cece nero. Br. *Sezercia*.
Coltivasi di raro, e trovasi spontaneo sui colli benacesi.
Maggio-Giugno.
- L. hirsutus* L. It. Cicerchia pelosa.
Messi, margini dei campi, frequente (sud del Benaco, risaje a Bagnolo, campi a Flero). Maggio-Giugno.
- L. angulatus* L. Bertol. (*L. sphæricus* Koch.). It. Cicerchia scarlatta.
Messi e luoghi erbosi, frequente (Flero, Monte d'Isola).
Maggio-Giugno.
- L. hexaedrus* Chanb. (*L. angulatus* Koch.) It. Cicerchia granellosa.
Fra le messi, raro (Pavone, Seniga). Maggio-Luglio.
- L. annuus* L. It. Cicerchia pallida.
Rarissimo. In un campo presso il Melia a Ponte S. Giacomo.
Maggio.
- L. pratensis* L. (*L. pratensis et sepium* Koch.) It. Pisello de' prati.
Siepi, letto de' torrenti sui colli e sui monti, frequente.
Maggio-Luglio.
- L. tuberosus* L. It. Ghianda di terra.
Ericeti e boschetti de' colli, rarissimo (scarpa della ferrovia a S. Eufemia). Giugno.
- L. setifolius* L. It. Cicerchia capillare.
Spalti alla Pusterla, colli a S. Eufemia e Cajonvico, raro.
Aprile-Giugno.
- L. sylvestris* L. It. Ceserone, Cicerchione. Br. *Sezercia salvàdega*.
Selvette di collina, e lungo i fiumi, frequente (sponde del Mella). Maggio-Agosto.
- L. latifolius* L. (*L. sylvestris* x. Bertol.) It. Cicerchione.
Br. *Sezercia salvàdega*.
Siepi e dumeti all' asciutto, frequente (Campagnola di Calcinatello, e colline a Venzago). Giugno-Luglio.
- L. heterophyllus* L. It. Cicerchione svariato.
Rarissimo. Trovasi qua e là lungo il Mella. Maggio-Giugno.

Orobis L. Sist. Sex. ut supra.**O. vernus** L. It. Orobo primaticcio.

Boschetti de' colli e de' monti, frequente (Costalunga, Col-
lebeato). Marzo-Aprile.

β. *gracilis* Comol. Boschetti a tramontana (Costalunga, Urago).

O. tuberósus L. It. Tartufo di prato.

Boschetti de' colli, frequente (Badia, Cellatica, Poncarale).
Marzo-Giugno.

β. *tenuifolius* Roth. Ove la specie, in terreni magri e asciutti.

O. niger L. It. Orobo silvano.

Tutti i boschetti de' colli, frequentissimo (Urago, Camplani).
Aprile-Giugno.

O. luteus L. It. Galega montana.

Monte Guglielmo, declivio orientale fin presso la cima, fre-
quentissimo. Giugno-Luglio.

Di questa famiglia coltivansi:

Pbascolus L. Sist. Sex. ut supra.

Pb. multiflorus Lam. It. Fagiolo rosso. Br. *Fazai ross.*

β. *albiflorus*. La specie e la varietà sono indigene dell' India Or.

Pb. vulgaris L. It. Fagiolo rampicante. Br. *Fazai rampighi.*

Pb. nanus L. It. Fagiolo nano. Br. *Fazai nano.*

Delle ultime due specie originarie dell' Indie orientali si col-
tivano fra di noi moltissime varietà, poco definibili, dipen-
denti dalla forma, dal colore e dalla grossezza del seme, e
delle valve bacillari. L'ingegnere L. Abeni nell' esposizione
bresciana del 1857 ne presentò 29 varietà, di cui comunis-
sime sono le seguenti:

a) Rampicanti: 1. *Fazai nostrà*; baccelli appianati, semi reni-
formi rigati a vari colori.

2. *Fazai cremonès*, semi reniformi allungati.

3. *Fazai de la regina*. Baccelli grossi; semi ovali, o irregolar-
mente sferici, picchiettati di rosso e di bianco.

4. *Fazai marmorì*. Semi sferoidali, marmorati più comunemente
di violaceo.

5. *Fazai gras*. Baccello toruloso, carnoso fin quasi alla matu-
razione, semi per lo più bianchi.

b) Nani: 1. *Fazai temporice*: primaticci, baccello appianato, semi per lo più bruni macchiati di bianco.

2. *Fazoline bianche*. Seme mediocre, bianco, appiattito.

3. *Fazai negher*, primaticci; seme mezzano, nerissimo.

4. *Fazoli negher*, seme piccolo, nero.

5. *Fazoli bianc*, seme piccolo, bianco.

6. *Fazoli zalce*, seme piccolo, bislungo, giallastro.

Ph. Mungo L. It. Fagiolo velluto. Br. *Café*, così detto perchè alcuni lo torrefanno, e lo usano come il caffè. Orig. dell'Indie Orientali.

Dolicos L. Sist. Sex. ut supra.

D. Catjang L. It. Fagiolino dell'occhio. Br. *Fazoli del aci*; a baccello sottile, lungo, cilindrico.

I baccelli immaturi di tutte le menzionate specie e varietà di fagioli diconsi comunemente *Cornazèi*.

Robinia L. Sist. Sex. ut supra.

R. Pseudo acacia L. It. Robinia. Br. *Rübina*, *Rübi*.

Originaria dell'America settentrionale, coltivasi principalmente in tre varietà:

1. *Vulgaris*.

2. *Inermis*. Br. *Rübina senza spi*.

3. *Umbraculifera*. Br. *Rübina ombrele*.

Gleditscha L. Sist. Sex. ut supra.

G. triacanthos L. It. Spinaeristi. Br. *Spì del Signur*.

Originario del Canada e della Luigiana; coltivasi comunemente a siepe.

Amorpha L. Sist. Sex. ut supra.

A. fruticosa L. It. Amorfa, Falso indaco. Br. *Smorfa*.

Originario della Carolina, coltivasi per le siepi e per ornamento.

Appartengono a questa famiglia:

Tamarindus indica L. It. e Br. *Tamarindo*, albero indigeno delle Indie orientali.

Cassia fistula L. It. e Br. *Cassia*, albero delle Indie.

Cassia Sena L. It. e Br. *Sena*, cresce nella Siria, nell'Arabia e nel mezzodi dell'Europa.

Indigofera tinctoria L. It. Indaco. Br. *Èndec*, dell'Indie.

Glycyrrhiza glabra L. It. Liquirizia. Br. *Regolessia*, *Legn dols*; è dell'Europa meridionale, ma non cresce nel bresciano.

Hematoxylum campechianum L. It. Campeggio. Br. *Legn táoro*, del Messico e delle Antille.

Il *Pterocarpus Santal* L. It. Sândalo, Br. *Sandol*, è un albero di questa famiglia, il cui legno, come quello del *Santalum rubrum*, tinge in rosso.

La *Copaifera officinalis* L. d'onde stilla il Balsamo di Copau, Br. *Balsem de Copai*, è un albero del Brasile e della Gujana.

ORNO XXXIII. CÆSALPINIÆÆ.

Cercis L. Sist. Sex. Decandria Monogynia.

C. Siliquastrum L. It. Siliquastro, Albero di Giuda. Br. *Guainèr*, *Guainòt*.

Ronchi e tutti i colli aprici, frequentissimo. Aprile-Maggio.

La *Ceratonia siliqua* L. It. Carrùbe, Br. *Guainè*, è indigena e coltivata nella bassa e media Italia per i legumi carnosì dolciastrì. La *Cæsalpinia echinata* del Brasile, e la *C. Sappan* L. dell'India, It. Verzino, Fernambucco, Br. *Verzè*, danno pure un bel rosso.

ORDO XXXIV. MIMOSÆÆ.

Si coltivano:

Acacia Willd. Sist. Sex. Polygamia Monœcia.

A. farnesiana Willd. It. Gaggia. Br. *Gazia*.

Tratta dall'isola di S. Domingo, coltivasi per la soavità dei fiori.

A. Julibrissim Willd. It. Acacia arborea. Br. *Acacia*.

Del Levante. Coltivasi come albero d'ornamento.

Mimosa L. Sist. Sex. Polygamia Monœcia.

M. pudica L. del Brasile, coltivasi e fruttifica da noi in piena terra.

M. sensitiva L. del Brasile; esige la serra calda.

Dalla *M. Senegal* L. dell'Arabia e dell'Egitto stilla la gomma arabica, Br. *Gama*.

ORDO XXXV. AMIGDALEÆ.

Prunus L. Sist. Sex. Icosandria Monogynia.

P. spinosa L. It. Prugnòlo, Susino delle macchie. Br. *Spibrognaei*.

Selvette e siepi, frequentissimo. Aprile.

P. insititia L. It. Prugnòlo da siepe. Br. *Brogna salvàdeg*.

Arbusto raro nella provincia (Colli di Prada, Monticelli).

Da questo forse derivò colia coltura la qualità di prugne a frutto rotondo e carne aderente al nocciuolo, le quali si dicono in Br. *Brogne sarèze*.

P. domestica L. It. Susinetto, Susino selvatico. Br. *Brogna salvàdeg*.

È indigeno dell'Italia, e trovasi qua e là selvatico nelle selvette della provincia.

Dalla coltura se ne trassero tutte le innumerevoli varietà di prugne bislunghe, di cui le più comuni sono:

1. *Brogne del meschi*. It. Prugne damaschine: picciolette, bislunghe, longitudinalmente solcate, pelle appannata violaceo-scura: sapor grato.
2. *Brogne porchère*. It. Susina porcina; grosse, ovali, senza solco, pelle giallognola, poco saporite.
3. *Brogne c*. It. Susina catalana; grosse come le porcine, pelle come le damaschine, sapore gradevole.
4. *Brogne zalde*: piccole, ellittiche, pelle gialla.
5. *Brogne verde*: piccole, ellittiche, pelle verde.
6. *Brogne negra*: piccole, ellittiche, pelle nero-violacea appannata, senza solco.

P. Maleb L. It. Ciriegio canino. Br. *Sariz bastarcc*.

Boschetti di tutti i colli della provincia, frequente. Aprile.

P. Cerasus L. It. Ciriegio selvatico. Br. *Sariz salvadeg ross*.

Frutto a succo bianco acquoso.

P. avium L. It. Ciriegio selvatico. Br. *Sariz salvadeg negher*.

Frutto a succo rosso sanguigno.

Nelle selve dei colli e dei monti, frequente (lungo il Benaco). Aprile-Maggio.

Indefinite forme di ciriegie naquero per la cultura da queste due varietà: le più comuni nella provincia sono:

1. *Sarèze temporide*. It. Ciriegie primaticcie; piccole, pelle rossa, carne scarsa insipida, succo bianco.
2. *Sarèze rosse*. It. Ciriegie rosse; mezzane, cuoriformi, pelle rosso-carica, carne duretta, succo bianco dolce.
3. *Sarèze negre*. It. Ciriegie nere; mezzane, rotondette, pelle rosso-nera, carne molliccia, succo sanguigno dolce.
4. *Càlem, Sarèze bianche*. It. Ciriegie marchiane; grosse, sferico-allungate, pelle bianca e rosea, carne duretta, succo bianco dolce.
5. *Vissole, Issole*. It. Visciole: peduncolo corto: grosse, sferiche, pelle rosso-carica, carne duretta, succo agro-dolce.
6. *Marene*. It. Amarine, Amarasche; mezzane, peduncolo corto, sferiche, pelle rossa, carne molle, succo acidetto.
7. *Marenù*. Simili alle antecedenti, ma assai più grosse.

Coltivansi:

Prunus armeniaca L. It. Albicocco, Meliaco. Br. *Embrogna*, *Albicòc*.

Dell'oriente, forse dell'Armenia. Coltivansene alcune varietà, fra le quali quelle a frutto spiccatolo, e a frutto aderente al nocciolo: a seme dolce e a seme amaro.

P. Lauro-Cerasus L. It. Lauro Ceraso. Br. *Laorocèraso*, *Laoro bastard*.

Dicesi proveniente da Trebisonda, e coltivali comunemente per l'aspetto sempre verde, per i frutti mangiabili, e per le foglie medicinali.

Amygdalus L. Sist. Sex. Icosandria Monogynia.

A. *communis* It. Mandorlo. Br. *Mandola*.

Indigena dell'Italia, benchè alcuni la dicano dell'Asia.

Coltivasi largamente sui *Ronchi* e altrove nelle poche sue varietà, di cui tre sono le più comuni:

1. *Mandole secarèle*. It. Mandorle tenere, Saccareille. Guscio molle, soveroso, fragile, seme dolce.
2. *Mandole dūre*. It. Mandorle dure dolci. Guscio legnoso, duro, seme dolce.

3. *Mandole amare*. It. Mandorle amare. Guscio duro più o meno inciso, seme amaro.

Persica Mill. Sist. Sex. Icosandria Monogynia.

- P. vulgaris Mill. (*Amigdalus Persica* L.) It. Pesco. Br. *Persec*.
Originario della Persia. Pianta assai polimorfa; onde per la cultura ne emerse un numero indefinito di varietà, di cui le principali che si coltivano nel Bresciano sono:

1. *Persec de la Madalena*: primaticcie, spiccatricie, carne poco succosa.
2. *Persec che sa lassa de pasta bianca*. It. Pesche spiccatricie bianche; carne bianca, asciutta.
3. *Persec che sa lassa de pasta verda*. It. Pesche spiccatricie succose: carne verdognola, molliccia, succosissima.
4. *Persec sanguani*. It. Pesche spiccatricie a carne bianca e sanguigna alquanto asciutta.
5. *Persec moscatei bianc*. It. Pesche moscadelle bianche; carne spiccatricia, asciutta, sapore dolce moscato.
6. *Persec che sa té bianc*. It. Pesche duracine bianche; carne tenace, succosa, bianca, aderente al nocciolo.
7. *Persec codogn che sa té*. It. Pesche cotogne duracine. Scorza e pasta gialla, succosa, tenace al nocciolo.
8. *Persec codogn che sa lassa*. It. Pesche cotogne spiccatricie. Scorza e pasta gialla, più o meno dolce e succosa.
9. *Persec mûzu*. Spiccatricie, grosse, bislunghe, pelle rossiccia.
10. *Persec nuss*. It. Pesca noce: spiccatricie, scorza lucida giallo-rosso-scura.

ORDO XXXVI. ROSACEÆ.

Spiræa L. Sist. Sex. Icosandria Oligogynia.

- S. Aruncus L. It. Barba di capra. Br. *Spires de mont*,
Cue de volp.

Tutte le selvette dei colli e del monti, frequentissima. Maggio-Giugno.

- S. Ulmaria L. It. Olmaria, Barba caprina.

Salicell, boschi umidi, rara (alla foce dell'Oglio nel Sebino).
Giugno-Luglio.

β. glauca Schultz. Lama della *Bissa*, rara.

S. Filipendula L. It. Filipendola, Trina di Fiandra.

Pascoli dei colli e dei monti, frequente (Costalunga). Maggio-Giugno.

Dryas L. Sist. Sex. Icosandria Polygynia.

D. octopetala L. It. Camedrio cervino.

Prati e rupi prealpine, frequente (Vette dei monti Guglielmo, Vezegno, Dossalto, Cornablaacca). Giugno-Luglio.

Geum L. Sist. Sex. Icosandria Polygynia.

G. urbanum L. It. Cariofillata, Erba benedetta. Br. *Garofolada*, *Erba benedeta*.

Selvette ombrose del piano e dei monti, frequente (Sarezzo). Maggio-Giugno.

G. rivale L. It. Cariofillata acquatica. Br. *Garofolada de foss.*

Ruscelli montani e prealpini, frequente (monte Egheni a Bovegno; Ario, Dossalto, Maniva). Giugno-Luglio.

G. montanum L. It. Cariofillata montana. Br. *Garofolada de mont.*

Pascoli prealpini, frequente (vette delle Colombine e del Mufetto). Giugno-Luglio.

G. reptans L. It. Cariofillata flagellosa.

Rupi e frane prealpine, frequente (Cigoletto). Luglio-Agosto.

Rubus L. Sist. Sex. Icosandria Polygynia.

R. idæus L. It. Lampone, Rovo idèo. Br. *Ampome*, *Fàmbros*.

Boschetti montani, frequente (Conche, Dragone). Mag.-Giug.

R. fruticosus L. It. Rovo, More. Br. *Spi de ruèda*, *More*.

Comunissimo dappertutto. Giugno-Settembre.

β. corylifolius Smit. Bertol. Dalla Margherita alla Maddalena.

γ. tomentosus Willd. Bertol. Sentiero da Lonato al Lavajone.

R. glandulosus Willd. It. Rovo silvano. Br. *Roèda*, *More*.

Boschetti da S. Colombano al Gogo, frequente. Giug.-Lug.

R. cæsius L. It. Rovo di fior bianco. Br. *More de ria*.

Luoghi sassosi umidi, rive dei fossi, frequente. Giug.-Lug.

R. saxatilis L. It. Rovo erbajolo. Br. *More rosse*.

Selvette de' monti, poco frequente (Dragone pendio occidentale). Maggio-Luglio.

Fragaria L. Sist. Sex. Icosandria Polygynia.

F. vesca L. It. Fragola selvatica. Br. *Maële de mont.*

Lughi erbosi dei colli e dei monti, frequentissima. Apr.-Mag.

Coltivasi la specie, con alcune varietà, come:

F. vesca bifera. Br. *Maolocc*: frutto grosso, rotondo, rosso carico.

F. vesca hortensis. Br. *Maële de ortaja*: frutto piccolo, allungato, smorto.

F. collina Ehrh. It. Fragola di poggio. Br. *Maële salvadeghe*.

Dai colli alla pianura, frequente. Aprile-Maggio.

Frutto rosso, meno succoso e saporito di quello della specie precedente.

F. elatior. Ehrh. It. Fragola maggiore.

Lughi erbosi di collina, rarissima (al nord-ovest di Caino).

Coltivasi anche qui da alcuni la *F. chilensis* e la *F. grandiflora*, a frutti rossi o gialli, grossi, detti impropriamente *Ananas*.

Potentilla L. Sist. Sex. Icosandria Polygynia.

P. Fragariastrum Ehrh. It. Fragola secca.

Rupi e selve, frequente (colli a Mompiano). Aprile-Maggio.

β. micrantha Ramond. Rupl a Lavenone.

P. nitida L. It. *Potentilla persicina*.

Somme vette delle prealpi denudate dalla neve (Blennone).

Luglio-Agosto.

P. alba L. It. Pentafillo bianco.

Pascoli dei colli e dei monti, frequente (colli a Mompiano, Urago, Maddalena). Marzo-Maggio.

P. caulescens L. It. *Potentilla penzola*.

Rupi de' monti e delle prealpi, frequente (Guglielmo, Dragone. Scende fino alle sponde del Sebino fra Marone e Pisogne). Luglio-Agosto.

P. rupestris L. It. *Fragolaccia rupina*.

Rupi e pascoli montani (monte Pessedà alle Cascine). Giugno-Luglio.

P. frigida Vill. It. *Fragolina barbata*.

Sommità dell'alpe di Vaja, rara. Luglio-Agosto.

- P. minima* Hall. It. Fragolina piccina.
Vette del Broffione, rara. Luglio-Agosto.
- P. grandiflora* L. It. Fragolaccia trifogliata.
M. Muffetto fra le rupi, rarissima. Luglio-Agosto.
- P. reptans* L. It. Cinque foglie, Erba pecorina. Br. *Pe de pol*, Sic *foe*.
Prati, vie, rive de' ruscelli del piano e de' monti, frequentissima, Giugno-Luglio.
- P. intermedia* L. It. Potentilla sette foglie.
Frane e letto de' torrenti subalpini, rarissima (alpi di Vaja).
Luglio-Agosto.
- P. verna* L. It. Fragolaccio primaticcio.
Colline e monti all'asciutto, frequentissima. Marzo-Settem.
 β . hirsutissima Bertol. Colli all'aprico, frequente.
 γ . pusilla Hest. Colli a Mompiano e alla Badia
- P. aurea* L. It. Fragolaccia fior d'oro.
Dorso meridionale del Guglielmo, rupi di Prada, monte Cigoletto. Giugno-Agosto
- P. alpestris* Hall. It. Fragolaccia alpestre.
Sommità dell'alpe di Vaja sopra il laghetto, rariss. Luglio.
- P. tormentilla* Nestl. (*Tormentilla erecta* L. Bertol.). It. Tormentilla.
Luoghi erbosi del piano, delle lame, del monti, frequentissima. Maggio-Settembre.
- P. hirta* L. It. Fragolaccia irsuta.
Lama di Bagnolo sui rialzi asciutti, rara. Maggio-Luglio.
- P. inclinata* Vill. (*P. canescens* Nestl. Bertol.). It. Fragolina cenerognola.
Sponde dell'Oglio dopo Orzinuovi, rarissima. Maggio-Lugl.
- P. argentea* L. It. Cinquefoglie bianco. Br. Sic *foe bianc*.
Colli aprici, campi secchi, frequente (Castello, Ospitaletto).
Aprile-Maggio.
- β . collina Vib. Rupi sopra Virle.
- P. recta* L. It. Cinque foglie, Fragolaccia. Br. *Pe de pol*; Sic *foe*.
Luoghi erbosi dappertutto. Maggio-Giugno.

P. obscura Wild. It. Fragolaccia irsuta.

Colle della Badia, frequente. Giugno-Luglio.

P. supina L. It. Piè d'oca verde.

Sponde del Benaco sopra Limone, rara. Aprile-Agosto.

P. anserina L. It. Argentina, Piè d'oca.

Luoghi paludosi del piano (lame Scovola, Bissa). Apr.-Giug.

Agrimonia L. Sist. Sex. Dodecandria Digynia.

A. Eupatorium L. It. Agrimonia, Eupatoria Br. *Agramonia*.

Margini dei campi, strade, boschi del piano e dei monti, frequente. Giugno-Ottobre.

Aremonia L. Sist. Sex. Dodecandria Digynia.

A. agrimonioides DC. It. Agrimonoide.

Monti sopra Limone al confine Tirolese, rara. Magg.-Lugl.

Rosa L. Sist. Sex. Icosandria Polygynia.

R. alpina L. It. Rosa alpina. Br. *Rosina*; frutto *Marëndol*.

Tutte le prealpi, frequente (Dragone, Guglielmo). Magg.-Lug.

β. pyrenaica Gouan. M. Guglielmo, più frequente che la specie.

R. pimpinellifolia DC. (*R. spinosissima* L. Bertol.) It.

Rosa da macchia. Br. *Ræsa salvàdega*.

Da Limone su pel monte Gazzo qualche cespite. Giug.-Lug.

R. pomifera Hermann. It. Rosa pomifera.

Colli e monti, rarissima (Valletta Bertone). Giugno-Luglio.

R. tomentosa Smith. It. Rosa vellutata.

Boschetti poco sopra Lavenone. Giugno-Luglio.

R. collina Jacq. (*R. canina* γ 2. collina Koch.) It. Rosa cenerina. Br. *Ræsa salvàdega*.

Colli, siepi del piano, frequente Maggio-Giugno.

R. rubiginosa L. It. Rosa di siepe, Rosa balsamina. Br. *Ræsa de mont*.

Colli e bassi monti, poco frequente (Collebeato). Magg.-Giug.

Le foglie hanno grato odore di trementina.

R. canina L. (*R. canina* L. Koch.) It. Rosa di macchia. Br. *Ræsa de sèss*. Frutto: *Stopacùl*, *Brüzacùl*.

Più frequente d'ogni altra specie dal piano ai monti, Maggio-Giugno.

R. pumila L. fil. (*R. gallica* L. Koch.) It. Rosa serpeggiante. Br. *Ræsa salvàdega rossa*.

Colli ai Campiani, Urago, Collebeato, frequente. Magg.-Giug.

R. arvensis L. It. Rosa corallina. Br. *Ræsa de sèss rossa*.

Al piano e sui colli nelle siepi e nelle macchie, frequentissima. Maggio-Giugno.

In mezzo al labirinto e alle contraddizioni dei vari autori sulle rose coltivate, parmi di poter indicare le comunissime seguenti, senza asserire se sieno vere specie o varietà.

1. *Rosa gallica* L. It. Rosa comune. Br. *Ræsa ordinaria*.
2. *R. centifolia* L. It. Rosa doppia d'Olanda. Br. *Ræsa sento-for*.
3. *R. muscosa* Ait. It. Rosa borracina. Br. *Ræsa de la tepa*.
4. *R. æglanteria* L. It. Rosa gialla. Br. *Ræsa zalda*.
5. *R. bengalensis* Persoon. It. Rosa del Bengala. Br. *Ræsa d'ogne temp*.
6. *R. damascena* Ait. It. Rosa di Damasco. Br. *Ræsa del meschi*.
7. *R. cinnamomea* Desv. It. Rosa cannella. Br. *Rosine*.
8. *R. multiflora*. It. Rosa rampicante. Br. *Rosine de Spagna*.
9. *R. Indica* L. con indefinito numero di varietà.

ORDO XXXVII. SANGUISORBEÆ.

Alchemilla L. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.

A. vulgaris L. It. Alchemilla, Piè di leone. Br. *Erba stela*.

Prati montani, frequente (Guglielmo, Maniva). Magg.-Sett.

β. montana Wild. Monte Guglielmo al Niide.

γ. fissa Schummel. Vette del Maniva.

A. alpina L. It. Erba ventagliina.

Pascoli e rupi montane e prealpine, frequente (Guglielmo).
Giugno-Agosto.

A. pentaphyllea L. It. Ventagliina sbrandellata.

Vette del monte Gazzo, rara. Luglio.

A. arvensis Scop. It. Ventaglini.

Fra le messi, frequente (Flero, Coller, Mompiano). Maggio-Luglio.

Sanguisorba L. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.

S. officinalis L. It. Sanguisorba, Salvastrella maggiore.

Br. *Erba persighina*.

Lama *Stanchèr* presso Ghedi; lame di Bagnolo, Torbole, Castelnuovo, frequente. Maggio-Giugno

S. minor Scop. (Poterium Sanguisorba L. Koch) It. Salvastrella minore. Br. *Pimpinèla*.

Colli e monti, frequentissima. Maggio-Giugno.

β. glaucescus Rehb. Colla specie, frequente in luoghi asciutti.

ORDO XXXVIII. POMACEÆ.

Crategus L. Sist. Sex. Icosandria Oligogynia.

C. oxiantha L. (C. monogyna Jacq. Koch.) It. Bianco spino. Br. *Spì bianchèr*, *Pignatine*, *Scorlândoi*, *Pirài*.

Dumeti e siepi del piano e dei monti, frequentissimo sul finir dell'Aprile e in Maggio.

C. oxianthoides Thuill (C. oxiantha Jacq. Koch.) It. e Br. come sopra.

Col precedente, ma fiorisce almeno una settimana prima.

C. pyracantha Lindl. (Mespilus pyracantha L. Bertol.) It. Agazzino.

Qua e là sui colli, rarissimo (Riviera). Maggio.

Cultivasi

C. Azarolus L. It. Lazzeruolo. Fr. *Azaræla*, *Nazaræla*, *Pom lazari*. Originario del Levante coltivasi nei frutti mangiabili, e per la grazia del portamento.

Sorbus L. Sist. Sex. Icosandria Oligogynia.

S. torminalis Crantz (Crategus torminalis L. Bertol.) It. Sorbo selvatico, Ciavardello. Br. *Corbèi salvadeg*.

Vallette *Pendolina* fra Urago e i Campiani; Cornablaeca alle cascate di *Pessèda*. Maggio.

S. Aria Crantz (Crategus Aria L. Bertol. It. Farinaccio, Sorbo montano. Br. *Biancèi*, *Paesà*.

Colli e monti, frequente. Aprile-Maggio.

S. *Chamaemespilus* Koch. (*Mespilus chamaemespilus* L. Bert.) It. Salciagnòlo. Br. *Spi de Salesèt*.

Prealpi nelle frane, frequente (Guglielmo, Broffione). Giugno-Luglio.

S. *aucuparia* L. It. Sorbo selvatico. Br. *Maræzen*, *Mali*.
Selve subalpine; frequente (monte Conche). Maggio-Giugno.

S. *domestica* L. It. Sorbo. Br. *Corbél*.

Spontaneo sul monte Conche, e nelle selve lungo il Sebina.
Coltivasi molto da noi pel frutti saporiti.

Cotoneaster Lindl. Sist. Sex. Icosandria Oligogynia.

C. *vulgaris* Lindl. (*Mespilus Cotoneaster* L.) It. Cotognastro. Br. *Nespoline*.

Colli e monti, frequente (Conche, Guglielmo, Broffione).
Aprile-Maggio.

β. *tomentosa* Lindl. Ove la specie, ma più frequente.

Mespilus L. Sist. Sex. Icosandria Oligogynia.

M. *germanica* L. It. Nespolo. Br. *Nèspol*.

Colli e monti, frequente (Maddalena, Gardone, Salò, M. Cornabla). Aprile-Maggio.

Coltivasi ne' giardini M. *japonica*. Br. *Nespol del Gipòne*.

Cydonia Tournef. Sist. Sex. Icosandria Oligogynia.

C. *vulgaris* Pers. (*Pirus Cydonia* L. Bert.) It. Cotogno.
Br. *Pom codògn*.

Qua e là talvolta nelle siepi: ma è coltivata la varietà a
frutti grossi.

Pyrus L. Sist. Sex. Icosandria Oligogynia.

P. *communis* L. It. Pero selvatico. Br. *Per salvadeg*.

Monte Vezegno, falde del monte Ario, poco frequente. Giugno-Luglio.

Da questa specie selvatica derivarono per la cultura
tutte le varietà di peri che sono innumerabili, e diverse
da luogo a luogo. Le più comuni nella provincia sono:

1. *Per botér*. It. Pere burre. Frutti grossi, scorza verde, carne
dolce, mollissima.

2. *Per bræcc e bu*. It. Pere brutte buone. Piccole e mezzane,
scorza verde ruvidetta, carne durezza dolcissima.

3. *Per d'autunno*. Oblunghe, grosse, verdi, succose.
4. *Per del doca*. It. Pere Cosime. Piccole, scorza liscia giallo-rossa, carno d' un dolce suo proprio.
5. *Per de spina*. It. Pere spine. Grosse: scorza liscia, giallastra, carne succosa dolcissima.
6. *Per gnoc*. It. Gnocchi. Mezzane, collo lungo, pelle verde rossa, carne dolce.
7. *Per limonsi*. It. Pere aranciane. Mezzane, scorza gialla, carne duretta acidula.
8. *Per moscatei*. It. Moscadelle. Mezzane, scorza verde-gialla, carne dolce traente al moscato. Varietà primaticcia e tardiva.
9. *Per ræzgn*. It. Pere roggie. Mezzane e grosse, scorza ferruginosa, dolci.
10. *Pero di de S. Piero*. It. Pere primaticcie. Piccole, verdi e giallo rosse, carne poco saporita.
11. *Per S. Zermà*. It. Pere S. Germano. Grosse, allungate, gialle, scorza liscia.
12. *Per pirlè*. It. Pere dure. Piccole, senza collo, verdi, carne dura.
13. *Per tærc*. It. Pere turches. Grosse, irregolari, verdi-gialle, succose, dolcissime.
14. *Per verdi-longhi*. It. Pere verdi-lunghe. Grosse, oblunghie, collo grosso, scorza verde, succose, dolci.

P. Malus L. It. Pomo selvatico. Br. *Pom salvadeg*.

Indigeno dell' Italia; ma nella provincia non l' ho ancora trovato allo stato selvatico.

Le principali varietà coltivate sono:

1. *Pom apiù*. It. Appie, Appiuole. Grosse o mezzane, alquanto oblunghie, scorza liscia gialla e rossa, carne dolcissima.
2. *Pom calamàr*. It. Mele calamaje. Grosse o mezzane, scorza ruvidetta, giallo-verdastra, carne dolcissima.
3. *Pom corai*. It. Mele coralline. Grosse, ovali, pelle rossa lucidissima, carne farinacciola dolcissima.
4. *Pom ræzgn*. It. Mele roggie. Piccole o mezzane; scorza ruvidetta ferruginosa, carne tenace dolcissima.
5. *Pomele*. It. Mele lazzeruole. Sferico-compresse, scorza verde e giallo-rossa lucida, carne tenace, fatua.

6. *Pomelo sacherine*. It. Mele lazzeruole dolci. Simili allo antecedenti, ma di sapore dolcissimo.
7. *Pomasse rosse*. It. Mele grosse. Sferico-compresse, grosse, scorza verde rossa, saporite.
8. *Pomasse verde*. It. Mele verdi. Come le antecedenti, ma a scorza verde.

Coltivasi per la precocità e splendore dei fiori:

P. japonica Thumb. Br. *Per del Gipone*, indigeno del Giappone.

Aronia Pers. Sist. Sex. Icosandria Pentagynia.

A. rotundifolia Pers. (*Mespilus Amelanchier* L. Bertol.)

It. Pero corvino. Br. *Perli*, *Perlèt*, *Migliæl*, *Bagolèr*.

Colli e monti, frequentissimo (Maddalena, Val di Nave, Val Sabbia, ecc.) Aprile.

ORDO XXXIX. GRANATEÆ.

Punica L. Sist. Sex. Icosandria Monogynia.

P. Granatum L. It. Melagrano. Br. *Pom granat*.

Si crede indigeno dell'Italia. Trovasi spontaneo nelle siepi de' colli suburbani, e della Riviera. Coltivasi pel frutto. Giugno.

ORDO XL. ONAGRARIÆ.

Epilobium L. Sist. Sex. Octandria Monogynia.

E. angustifolium L. It. Erba S. Antonio, Behen rosso.

Monti e prealpi, raro (Val di Pezzaze sopra Pezzoro): Luglio-Agosto.

E. Fleischéri Koch. It. Ramerino alpino.

Vette del monte Gazzo, raro. Luglio-Agosto.

E. Dodonei Vill. (*E. angustissimum* Wild; Bertol.) It. Ramerino di fiume.

Frane de' colli, letto dei torrenti, frequente (Mella, Ronchi di Costalunga, Gavardo, Bovegno). Agosto-Settembre.

E. hirsutum L. It. Garofano d'acqua, Viola di palude.

Margine de' ruscelli e dei fiumi, frequente (Inzino). Luglio-Agosto.

E. tetragonum L. It. Sfènice selvatica, Epilobio quadrelletto.

Lame e risaje, frequente (Scovola, Pranduna). Giugno-Ag.

E. parviflorum Scrb. It. Garofanini d'acqua.

Margini dei fossi in tutta la provincia, frequentissimo. Luglio-Agosto.

E. montanum L. It. Garofanini di montagna.

Selve e boschi asciutti, frequente (Val d'Inzino, Guglielmo, Collio, Broffone). Luglio-Settembre.

E. palustre L. It. Epilobio turgoncello.

Lama *il Chiodo* presso le acque morte, rarissimo. Agosto.

E. alpinum L. It. Violine d'alpe.

Rupi, e stillicidii sul monte Gazzo, rarissimo. Luglio-Agosto.

E. origanifolium Lam. (*E. alsinesifolium* Vill. Bertol.).

It. Violine basilichine.

Sorgenti e rigagnoli delle prealpi, raro (M. Vaja). Lug.-Ag.

Oenothera L. Sist. Sex. Octandria Monogynia.

OE. biennis L. It. Blattaria virginiana, Enagra.

L'ho trovata una sola volta allo sbocco del Mella nell'Oglio presso Règona. Luglio.

Isnardia L. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.

I. palustris L. It. Porracchia di fosso.

Paludi al sud del Benaco, rara. Luglio.

Circæa L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.

C. lutetiana L. It. Circèa, Erba maga. Br. *Erba maga*.

Luoghi ombrosi e margini dei fossi dai monti al piano, frequentissima. Giugno-Agosto.

C. alpina L. It. Circèa montana.

Luoghi muscosi delle prealpi, rara (Muffetto). Luglio-Ag.

Trapa L. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.

T. natans L. It. Castagnola d'acqua. Br. *Castagnœle*.

Paludi al sud del Benaco, rara. Giugno.

ORDO XLI. HALORAGÆÆ.

Myriophyllum L. Sist. Sex. Monœcia Polyandria.

M. spicatum L. It. Millefoglio d'acqua, Ròscolo, Fertro.
Fossi paludosi, frequentissimo (Iseo, Provaglio, Sirmione).
Maggio-Agosto.

M. verticillatum L. It. Millefoglio ascellare.

Ne' luoghi stessi del precedente. Giugno-Settembre.

ORDO XLII. HIPPURIDÆÆ.

Hippuris L. Sist. Sex. Monandria Monogynia.

H. vulgaris L. It. Coda di cavallo acquatica.

Acque paludose principalmente ai laghi, frequente. Giugno-Agosto.

ORDO XLIII. CALLITRICHINÆÆ.

Callitriche L. Sist. Sex. Monandria Digynia.

C. stagnalis Scop. (*C. verna* L. Bertol?). It. Erba gamberaja. Br. *Erba ranina*.

Acque basse stagnanti, frequente (alla Fantasina). Maggio-Settembre.

C. vernalis Kutzing (*C. autumnalis* « Bert.) It. Erba gamberaja. Br. *Erba ranina*.

Acque basse stagnanti (Fossi a Torbole). Maggio-Settembre.

β. platycarpa Kutz }
γ. hamulata Kutz } ove la specie

C. autumnalis L. (*C. autumnalis β.* Bertol.) It. Erba gamberaja.

Laghi ed acque limpide di lento corso. Settembre-Ottobre.

ORDO XLIV. CERATOPHYLLÆÆ.

Ceratophyllum L. Sist. Sex. Monœcia Polyandria.

C. demersum L. It. Coda di volpe, Fertro. Br. *Cue de foss*.

Acque stagnanti delle fosse ed ai laghi, frequente. Giugno-Set.

C. submersum L. It. Fertro capillare. Br. *Cue de foss.*
Ne' siti stessi. Giugno-Agosto.

ORDO XLV. LYTHRARIÆ.

Lythrum L. Sist. Sex. Dodecandria Monogynia.

L. Salicaria L. It. Salcerella, Salce rosso de' fossi. Br.
Cue de rase.

Rive dei fossi dal piano alle prealpi, frequentissimo (1)
β. gracile (2). Prati turfosi a Torbole.

Peplys L. Sist. Sex. Hexandria Monogynia.

P. Pòrtula L. It. Erba Pòrtula.

Lame di Bagnolo e della Scòvola. Giugno-Settembre.

Suffrenia Bellard. Sist. Sex. Diandria Monogynia.

S. filiformis Bellard. It. Suffrenia risajuola.

In tutte le risaje, ma poco abbondante. Agosto-Settembre

ORDO XLVI. TAMARISCINÆ.

Myricaria Desvaux. Sist. Sex. Pentandria Trigynia.

M. germanica Desvaux (species decandra) (*Tamarix germanica* L. Bert.) It. Tamèrice.

Alveo e margini dei fiumi e dei torrenti, raro (Val di Caver
presso il Biennone. Aprile-Maggio.

ORDO XLVII. PHILADELPHÆ.

Philadelphus L. Sist. Sex. Icosandria Monogynia.

Ph. coronarius L. It. Siringa, Fior angelo. Br. *Fiur de paradis.*

Qua e là nella Riviera. Coltivasi per l'odore soavissimo dei
fiori Maggio-Giugno.

(1) Possideo specimen lecta in torbor fodina prope Torbiate, in quibus caulis
pars inferior longo tractu squammosa, squammis minimis oppositis; pars media
foliis verticillato-quaternis; pars vero ramosa foliis oppositis ut in specie.

(2) *L. Salicario* β. *gracile*, caule simplicissimo virgato, foliis omnibus quam in
specie multoties minoribus, bractæformibus cauli adpressis; racemo la-
tusculo, stylo calycem bis superante.

ORDO XLVIII. CUCURBITACEÆ.

Bryonia L. Sist. Sex. Monœcia Monadelphia.

B. dioica Jacq. It. Barbone, Brionia, Zucca selvatica.
Br. *Sæca salvàdegà*.

Siepi dei colli e della pianura, frequente. Maggio-Giugno.

Si coltivano:

Cucurbita L. Sist. Sex. Monœcia Monadelphia.

C. Pepo L. It. Zucca. Br. *Sæca*.

Luogo originario incerto. Pianta assai polimorfa, che si svia facilmente colla coltivazione in varietà con gradazioni infinite. Hanno nome volgare le seguenti:

1. *Sæche de cioss*. It. Zucca frataja. Oblunga, acquosa.
2. *Sæche marine*. It. Zucca indiaua. Sferico-compresa, solcata, corteccia verde-cinerea, carne giallognola farinacea.
3. *Sæche sante*. Quasi sferiche, corteccia rossa, carne aranciata.
4. *Sæche baræche*. It. Zucche di Chioggia. Lunghe, strangolate, carne gialla, dolcissima.

C. Lagenaria L. It. Zucca vuota, Zucca da vino. Br. *Sæca bûza*, *Sæca del vi*.

Vuolsi proveniente dall' America. Coltivasi ovunque, e le principali varietà sono le seguenti:

1. *Sæca del vi*, a collo strangolato.
2. *Sæchiline*, piccole, della forma quasi d' una pera.
3. *Sæche trombe*, molto lunghe, sottili e ricurve.

Coltivansi anche per la singolarità del frutto le seguenti specie colle loro varietà:

- C. *verrucosa* L. It. Zucca a cedrato. Br. *Sæchine de carni*, piccole, rotonde, bernoccolute.
- C. *Melopepo* L. It. Zucca a turbante. Br. *Sæchine tûrche*, piccole, compresse, umbonate, gialle o rosse.
- C. *Citrillus* L. It. Cocomero, Anguria. Er. *Engûria*.

Chi la vuole indigena della bassa Italia, chi originaria delle Indie Orientali. Se ne coltivano le varietà a semi neri, bianchi, giallastri e rossi (Br. *Engûria moscadela*).

Cucumis L. Sist. Sex. Monœcia Monadelphia.

C. sativus L. It. Cedriolo, Citrullo. Br. *Cæcæmer*.

Originario dell'Asia, coltivasi ovunque pei frutti mangiabili.

C. melo L. It. Popòne, Melone. Br. *Milù*.

Originario dell'Asia. Coltivasi nella bassa provincia pel frutto e pei semi. Varietà: a manico sottile o assai grosso, a corteccia liscia o reticolata, eguale o solcata, verde o gialla. La pasta sempre gialla.

Dal *Cucumis Colocynthis* L. dell'Arcipelago si estrae la medicinale Coloquintide; Br. *Coloquinzia*.

La *Momordica Elaterium* L. It. Elaterio, Br. *Cæcæmer d'azen*, è spontanea nel Veneto.

Segue la famiglia delle Passifloræ, di cui la Passiflora cœrulea, Br. flur de passiu, indigena del Brasile, coltivasi nei giardini per la singolarità dei fiori

ORDO XLIX. PARONYCHIEÆ.

Herniaria L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

H. glabra L. It. Erniola, Erba lenticchia, Poligono minore.

Iuoghi secchi, ghiaje, strade, dal piano alle prealpi, frequente. Maggio-Luglio.

H. hirsuta L. It. Renajola pelosa.

Ove la specie precedente, ma assai più rara. Giugno-Luglio.

Polycarpon L. Sist. Sex. Triandria Trigynia.

P. tetraphyllum L. It. Erba migliarina.

Ruderati, vie, frequente (vie remote della città). Magg.-Ag.

ORDO L. PORTULACÆÆ.

Portulaca L. Sist. Sex. Dodecandria Monogynia.

P. oleracea L. It. Porcellana, Erba de' porci. Br. *Porse-laga, Porselana*.

Orti, campi, strade appiè dei muri, frequentissima. Lug.-Ag.

Montia L. Sist. Sex. Triandria Trigynia.

M. fontana L. (*M. rivularis* Gmel. Koch. Ed. II. p. 445) It. Pendolino.

Rigagnoli limpidi montani e prealpini (*M. Muffetto* alle *Pa-ghere*). Maggio-Agosto.

ORDO LI. SCLERANTHEÆ.

Scleranthus L. Sist. Sex. Decandria Digynia.

S. annuus L. It. Centigrani, Renajola.

Prati sterili, vie, frequente (Castrezzato, Bovegno da Graticelle alle Zerte). Aprile-Settembre.

S. perennis L. It. Renajola montana.

Castello, rive dell'Oglio, raro. Maggio-Settembre.

ORDO LII. CRASSULACEÆ.

Rhodiola L. Sist. Sex. Decandria Pentagynia.

R. rosea L. (*Sedum Rhodiola* Willd. Bertol.) It. Radice idèa. Br. *Legn rodio* (Planta dioica).

Prealpi, frequentissima (Colombine, Desdana, Ario, Muffetto, Cigoletto). Giugno-Luglio.

Crassula L. Sist. Sex. Decandria Pentagynia.

C. rubens L. It. Vermicolare stellata.

Declivio settentrionale dei colli della Riviera; al Mella presso Seniga. Aprile-Giugno.

Sedum L. Sist. Sex. Decandria Pentagynia.

S. latifolium Bert. (*S. maximum* Koch.) It. Favaria, Tèlèio. Br. *Faa grassa*, *Erba de cai*, *Oreciù*.

Rupi fino alle prealpi, frequente (Maddalena, Guglielmo, Collio lungo la via). Agosto-Settembre.

S. Anacampseros L. It. Anacampsero.

M. Malghetta presso il Blennone a mezza salita in una valletta umida; raro. Luglio.

S. gallioides All. (*S. Cæpèa* Koch.) It. Cèpèa, Erba della Madonna.

Margini declivi dei campi fra Rovato ed Erbusco, rarissimo. Luglio-Agosto.

S. hispanicum L. It. Vermicolare verde-mare. Br. *Ris del diaol*.

Rupi del Guglielmo a Costaricca, e alle falde dell'Ario, raro. Giugno-Luglio.

S. atratum L. It. Vermicolare sanguigno. Br. *Riss ross.*
Vette del Guglielmo e del Dossalto, raro. Giugno-Agosto.

S. saxatile All. (*S. annum* L. Koch.) It. Vermicolare alpina.

Vette del Guglielmo verso *Costaricca*, Colombine, Dossalto, frequente. Giugno-Luglio.

S. album L. It. Erba pignòla. Br. *Riss del diaol.*

Muri, rupi, tetti, dal piano alle prealpi, frequentissimo. Giugno-Settembre.

S. dasyphyllum L. It. Erba della Madonna. Br. *Riss grass.*

Muri, rupi, dal piano al monte, frequentissimo (Badia, Salò, Gardone). Maggio-Giugno.

S. acre L. It. Semprevivo acre. Br. *Riss del diaol.*

Oratorio della Maddalena, rupi a Lavenone, frequente. Giugno-Luglio.

S. sexangular L. (*S. bononiense* Koch. Syn. ediz. II. p. 4024) It. Erba pignòla. Br. *Riss del diaol.*

Muri, rupi, prati ghiaiosi, frequentissimo. Giugno-Luglio.

S. saxatile Willd. (*S. repens* Schlaicher, Koch) It. Vermicolare alpina.

Rupi delle prealpi, raro (Colombine presso *Ravèno*la *vaga*. Luglio-Agosto.

S. anopetalum Ten. It. Orcella verdemare.

Vette del Guglielmo volte a mezzodi, raro. Giugno-Agosto.

S. reflexum L. It. Sopravivolo de' muri. Br. *Riss del diaol.*

Muri, campi arenosi, rupi, frequentissimo. Giugno-Luglio.

Sempervivum L. Sist. Sex. Dodecandria Dodecagynia.

S. tectorum L. It. Semprevivo maggiore. Br. *Oricine*,
Erba semper via.

Sui tetti, principalmente della bassa provincia, frequente. Giugno-Agosto.

S. montanum L. It. Guardacasa? Br. *Oricine*, *Erba semper via.*

Dorso meridionale del Guglielmo; monti Dragone e Maddalena; frequente. Luglio-Agosto.

S. arachnoideum L. It. Semprevivolo ragnatello.

Rupi da Graicelle al monte Muffetto, frequente. Luglio-Ag.

S. Wulfenii Bert. Koch. (*S. rheticum*. Rota fl. Bergom.; *S. globiferum* Comolli).

Somme vette delle Colombine, in una rupe a picco. Luglio.

Segue la famiglia delle Cactæ (Sist. Sex. Polyandria Monogynia) tutte dell'America, le cui specie più comunemente coltivate nei vasi sono le seguenti:

Opuntia vulgaris Miller. It. Opunzia. Br. *Fic d'India*: fatto spontaneo anche in Valtellina a Sondrio ed a Berbenno fra le rupi. *Phyllocactus phillanthoides* Link.

Epiphyllum truncatum Pflr.

Alcuni *Melocactus*, *Mamillaria* ecc.

L' *Opuntia coccinillifera* Miller porta in America una sterminata quantità di insetti chiamati Cocciniglia, dai quali si trae il rosso Carminio, Br. *Carmi*.

ORDO LIII. GROSSULARIÆ.

Ribes L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

R. Grossularia L. It. Uva spina. Br. *Zenevri*, *Grosæle*.

Coltivasi in qualche luogo della provincia, ma trovasi talvolta sporadico fra le siepi. Aprile-Maggio.

R. petraeum Willd. It. Ribes corallino. Br. *Ua marina*.

Vette delle Colombine nel luogo detto *Cloduna*. Mag.-Giug. Coltivasi:

R. rubrum L. It. Ribes rosso. Br. *Ribes*.

Spontaneo in varie parti d'Italia, qui coltivasi pei frutti. Apr.

ORDO LIV. SAXIFRAGÆ.

Saxifraga L. Sist. Sex. Decandria Digynia.

S. Cotyledon L. It. Sassifragia piramidale.

M. Muffetto; M. Ario presso la via che va a Pesseda; Dos-salto; rive del Benaco al villaggio la Pieve. Giugno-Lugl.

S. aizoon Murr. It. Sassifragia, Sedo alpino.

M. Dossalto dal lato del Maniva. Luglio-Agosto.

- β . minor. Vette dell' alpi di Vaja e delle Colombine.
 γ . elatior MK. Vette delle Colombine.
 δ . petalis impunctatis. Colle altre varietà.
- S. Vandelli Sternb. It. *Sassifragia pungente*.
 Rupi sett. del monte Gazzo, rarissima. Agosto.
- S. crustata West. It. *Sassifragia semprevivolo*.
 Vette del Guglielmo, dell'Ario e del Cornablaeca. Giug.-Lug.
- S. mutata L. It. *Sassifragia linguettata*.
 Rupi del monte Fronden e del Cornablaeca, frequente. Luglio-Agosto.
- S. squarrosa Sib. It. *Sassifragia embriciata*.
 Rupi estreme del monte Gazzo al confine Tirolese. Luglio.
- S. cæsia L. It. *Sassifragia verdemare*.
 Rupi nude delle Colombine, Fronden, Dossalto al così detto *Stäbol*. Luglio-Agosto.
- S. bryoides L. *Sassifragia zolfina*.
 Rupi del Blennone e del Malusetta. Luglio-Agosto.
- S. appositifolia L. It. *Sassifragia rosea*.
 Estreme vette del Blennone. Maggio-Luglio.
- β . Rudolphiana Hornsch. Blennone vetta meridionale.
- S. aspera L. It. *Sassifragia spinulosa*.
 M. Broffione alle cime le *Cornette*. Luglio-Agosto.
- S. aizoides L. *Sassifragia autunnale*.
 Vette dei monti Muffetto, Vaja, Dossalto, frequentissima. Luglio-Settembre.
- S. stellaris L. It. *Sassifragia stellata*.
 Alle fonti (Muffetto, Colombine). Giugno-Luglio.
- β . Clusii Koch. petalis duobus minoribus impunctatis. Colla specie, ma assai più frequente.
- S. cuneifolia L. It. *Sassifragia mestoletta*.
 M. Muffetto, a Graticelle, e sulle vette. Giugno-Luglio.
- S. moschiata Murr. (S. muscoides Wulf. Koch. E.) It. *Sassifragia moscatellina*.
 Rupi delle prealpi, rara. Giugno-Luglio.
- β . glabriuscula Bert. (S. muscoides cum variet. Koch). Alpi di Vaja.

γ. *acaulis* Gand. Ove la specie.

δ. *atropurpurea* Stunn. M. Gazzo quasi alle vette.

S. sedoides L. It. *Sassifragia* setolosa.

Vette dei monti Vaja e Gazzo, rara. Luglio-Agosto.

S. planifolia Spreng. It. *Sassifragia* verdolina.

In una depressione nevosa del monte Gazzo, rarissima. Lugl.

S. androsacea L. It. *Sassifragia* tridentata.

Vette del Blennone, rara. Giugno-Luglio.

S. tridactylites L. It. *Sassifragia* dei tetti.

Tetti, muri, ruderi del piano e dei monti, frequentissima.

Aprile-Luglio.

β. *controversa* Sternb. Val di Marone e monte Guglielmo.

S. petraea L. It. *Sassifragia* bianca.

Monti fra Iseo e Provaglio, rara. Aprile-Giugno.

S. bulbifera L. It. *Sassifragia* bulbifera.

Prati del piano, rara: dei colli e dei monti, frequente (Costalunga). Maggio.

S. rotundifolia L. It. *Sassifragia* cimbalaria.

Monti e subalpi in luoghi umidi, frequente (Val d'Inzino, Colombine). Giugno-Agosto.

S. arachnoidea Spr. It. *Sassifragia* lanuta.

Monti presso Bovegno; Valle S. Colombano a *Cas-ciculi*; rupi del Dossalto; rara. Luglio-Agosto (1).

***Chrysosplenium* L. Sist. Sex. Decandria Digynia.**

C. alternifolium L. It. *Sassifragia* dorata.

Luoghi erbosi ed ombrosi de' monti, frequente (Dragone).
Marzo-Aprile.

Coltivasi ad ornamento:

Hydrangæa Hortensia DC. It. e Br. *Orteasia*, della China e del Giappone.

(1) Tum in montibus prope Bovegno, tum in monte Dossalto, loco a Bertalio designato, petala vidi semper luteo-citrina, nunquam alba.

ORDO LV. UMBELLATÆ.

Sanicula L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

S. Europæa L. It. Sanicola, Diapensia.

Selve e prati dei monti e delle prealpi, frequente (s. Onofrio, Val di Marone, selve di Zigole a Bovegno). Maggio-Luglio.

Astrantia L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

A. minor L. It. Astranzia minore.

Pascoli prealpini, frequente (Castellino e Poſſe Ratte presso Collò). Luglio-Agosto.

A. major L. It. Astranzia:

Prati del piano alle prealpi, frequente (Mella, campagna di Calcinato, Guglielmo). Giugno-Luglio.

Eryngium L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

E. campestre L. It. Calcatreppola, Carciofini. Br. *Ensalata d'azen*.

Ruderali, terreni magri, strade, frequentissimo. Luglio-Ag.

E. amethystinum L. It. Calcatreppolo ametistino. Br. *Ensalata d'asen viola*.

Dal castello di Serle a S. Gallo, da Salò a Gargnano, abbondante. Luglio-Agosto.

Bupleurum L. Sist. Sex. Pentandria Digynia

B. tenuissimum L. It. Bupleuro grappoloso.

Sponde benacesi della bassa Riviera, raro. Agosto-Settemb.

B. junceum L. It. Lino selvatico.

Colli alla Raffa e a Polpenazze, raro. Luglio-Agosto.

B. aristatum DC. It. Odontite minore.

Colli e campi secchi, frequentissimo (Camaldoli, Virle, campagna di Calcinatello e di Montecclaro). Giugno-Luglio.

B. Odontites L.? Collina a Sirmione, raro. Giug.-Lug.

B. rotundifolium L. It. Perfogliata, Cinquefoglio giallo.

Messi del piano e dei colli, frequentissimo. Maggio-Luglio.

B. stellatum L. It. Bupleuro stellato.

Vette dei monti Colombine, Muffetto e Cigoletto, frequente. Luglio-Agosto.

B. falcatum L. It. Orecchia di lepre.

Colli a Virle, rarissimo. Luglio-Agosto.

B. ranunculoides L. It. Bupleuro scialino.

Caino, Conche, Cruxdomini, Cigoletto, frequente. Lug.-Sett.

β. *Burserianum* Schleich } colla specie, frequente
γ. *caricinum* DC. }

Slum L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

S. latifolium L. It. Erba cannella, Sedanina d'acqua.

Fosse, acque morte, frequente (lame *Scovola*, *Chiodo*). Luglio-Agosto.

S. angustifolium L. (*Bérula angustifolia* Koch.) It. Sedanino d'acqua.

Fosse, acque morte, frequentissimo (S. Eustachio, Bornada, Desenzano). Luglio-Agosto.

Pimpinella L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

P. alpina Host. (*P. saxifraga* ð. *P. alpestris* Koch.) It. Tragoselino d'alpe.

Rupi o pascoli del Guglielmo e del *Fronden*, frequente. Luglio-Agosto.

P. saxifraga L. It. Tragoselino becchino.

Pascoli aridi dal piano ai monti, frequentissima. Sett.-Ott.

β. *nigra* Willd. Colla specie sui colli.

P. magna L. It. Tragoselino maggiore. Br. *Scalète*.

Prati del piano e dei monti, frequentissima. Luglio-Ottobre.

β. *rubra* Hoppe. Monti da Bovegno a Collio, al Castellino, frequente.

Carum L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

C. Carvi L. It. Carvi, Comino tedesco. Br. *Finogg salvadeg*; *Kimel*.

Prati montani, frequentissimo (Val di Marone, Irma, monte Dragone). Maggio-Luglio.

β. *auriculatum* (1). Val di Marone, pascoli a Lumezzane.

(1) *Lasium singularem* collegi in eadem valle di Marone, ubi frequens, in quo folia caulium sunt basi auriculata, auricula laciniato linearibus; et umbella interdum involucro monophyllo folia caulium superioribus simili

Egopodium L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

E. Podagraria L. It. Castalda, Podagraria.

Luoghi erbosi, siepi del piano e dei monti, frequentissima.

Maggio-Luglio.

Helosciadum Koch. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

H. nodiflorum Koch (*Sium nodiflorum* L. Bert.) It.

Crescione, Sedanina d'acqua.

- Fossi morti nella lama di Bagnolo. Giugno-Luglio.

Sison L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

S. amomum L. It. Amòmo germanico.

Colli sopra Bogliaco, rarissimo. Luglio-Agosto.

Ptychotis Koch. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

P. heterophylla Koch. It. Ammi bastardo.

Declivio occidentale del colle Badia; Sirmione nelle siepi, frequente. Giugno-Agosto.

Trinia Hoffm. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

T. vulgaris DC. (monoica et dioica) It. Sassifragia panocchiata.

Colli secchi e piano sottoposto, frequente (Badia, Provaglio d'Iseo, Gardone Riviera). Maggio-Giugno.

Petroselinum Hoffm. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

P. sativum Hoffm. (*Apium Petroselinum* L. Bert.) It.

Prezzemolo, Petrosémolo. Br. *Pedersém*.

Spontaneo sulle mura del castello di Sirmione. Coltivasi per condimento. Giugno-Agosto.

Apium L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

A. graveolens L. It. Sedano, Apio palustre. Br. *Séleno*.

Originario dei litorali d'Italia, coltivasi per uso domestico, e trovasi qua e là erratico ai fossi d'acque grasse.

Cicuta L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

C. virosa L. It. Cicuta. Br. *Sicūta*.

Nelle risaje, frequente. Giugno-Luglio.

Meum DC. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

M. athamanticum DC. It. Meo barbuto. Br. *Fenocèla*.

Praterie lungo i sentieri da Vello al Guglielmo, raro. Giug-

M. Mutellina Gaertn. It. Erba Motellina.

Dalle Colombine al monte Vallo, rarissimo. Luglio-Agosto.

Silene Bess. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

S. pratensis Bess. It. Silao.

Prati da Vello al Guglielmo, frequente. Giugno-Agosto.

Ligusticum L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

L. Seguiieri DC. It. Meo adulterino.

Pascoli a Lodrino, poco frequente. Luglio-Agosto.

Athamanta L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

A. cretensis L. (*Libanotis cretensis* Allion. Bert.) It. Danco Cretico.

Dragone, vetta verso Serle; Ario alle falde; Fronden sulle vette. Giugno-Luglio.

Libanotis Crantz. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

L. montana Allion. (*Athamanta Libanotis* L. Bert.) It. Libanotide.

Colli lungo il Benaco non rara. Giugno-Agosto.

β. Daucifolia DC. Valle di Toscolano.

Gaya Gaud. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

G. simplex Gaud. It. Finocchio d'alpe.

sulla fede di Zaniedeschi, che sotto il nome di *Laserpitium simplex* L. dice averla trovata sulle rupi di Prada e ai piani di Cigoletto.

Cnidium Cusson. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

C. apioides DC. It. Piretro vero.

Pascoli sassosi da Graticelle alle Zerle, raro. Luglio-Agosto.

Seseli L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

S. Montanum L. It. Finocchiella abrotanina.

Pascoli subalpini, raro (S. Pietro presso Limone). Luglio-Ag.

S. glaucum L. It. Finocchiella bianca.

Colli tra Montechiaro, Lonato e Castiglione, raro. Giug-Ag.

S. coloratum Ehrh. (*S. annuum* L. Bert.) It. Finocchio ferulino.

Colli alla Badia e a Desenzano, frequente. Agosto-Ottobre.

S. elatum L. (S. Gouani Koch.) It. Finocchiella panocchiaia.

Colli Benacesi, frequente. Luglio-Agosto.

Feniculum Hoffmann. Sist. Sex. Pent. Dig.

F. officinale All. It. Finocchio selvatico. Br. *Finòcc salvadeg*.

Muri e luoghi petrosi de' Ronchi e de' colli Benacesi, frequente. Luglio-Agosto.

Cultivansi poi comunemente:

F. sativum Bertol. It. *Finòcc*, pei fruttil aromatici.

F. dulce DC. Br. *Scartossi*, *Erba lùna*, pei getti radicali grossi, mangiabili.

Anetum graveolens L. Br. *Anèt*, pei frutti aromatici.

Ætusa L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

Æ. Cynapium L. It. Cicuta aglina. Br. *Pedersòm velenùs*, *Sicùta*.

Orti, margini delle strade, frequente. Luglio-Settembre.

Oenanthe L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

OE. pimpinelloides L. It. Filipendola acquatica, Prezzo-molo d'acqua.

Pascoli umidi da Capriano alla collina, frequentissima. Giugno-Luglio.

OE. fistulosa L. It. Finocchio selvatico.

Acque morte delle risaje, frequente. Maggio-Luglio.

OE. Phellandrium Lam. (Phellandrium aquaticum L. Bertol.) It. Cicutaria.

Padule Lavajone presso Venzago copiosissimo. Giugno-Lug.

OE. peucedanifolia Spreng. It. Finocchio napolino.

Rarissima: ad un fosso presso Corticelle. Giugno.

Archangelica Hoff. Sist. Sex. Pent. Dig.

A. officinalis Hoffm (Angelica Arcangelica L. Bert.) It. Arcangelica. Br. *Bragosse salvàdeghe*.

Rupi occidentali del monte Ario, rara. Luglio.

Angelica L. Sist. Sex. Pent. Dig.

A. sylvestris L. It. Angelica selvatica. Br. *Canòcc*, *Bragosse*.

Margini dei fossi del piano, frequente. Luglio-Settembre.
 β. montana Schleich. Camaldoli, monte Ario.

Selinum L. Sist. Sex. Pent. Dig.

S. carvifolia L. (*Mylinum carvifolia* Gaud. Bertol.) It. Carvifoglio.

Selve umide prealpine, raro (Alpi di Zardo). Giugno-Luglio.

Ferula L. Sist. Sex. Pent. Dig.

F. Ferulago L. (*Ferulago galbanifera* Koch.) It. Finocchiaccio. Br. *Canaròcc*.

Colli all'aprico, frequente (Mompiano, Riviera). Magg. Lug.
 Dalla *F. Assa-fetida* Lamk della Persia, stilla la gomma purgativa, It. *Assafetida*; Br. *Assafetida*, *Merda del diavol*.

Peucedanum L. Sist. Sex. Pent. Dig.

P. venetum Koch. (*Selinum venetum* Spreng. Bertol.) It. Selino delle selve.

Colline e piano sottoposto, frequente (Badia, Goletto) Agosto-Ottobre.

P. Chabræi Koch. (*Palimbia Chabræi* DC. Bertol.) It. Carvifoglio.

Prati e selvette montane, frequente (monti sopra Bogliaco). Agosto-Settembre.

P. rablense Koch. (*Selinum rablense* Spr. Bert.) It. Falso Séseli.

Vette del Dragone, abbondante. Luglio-Agosto.

P. Cervaria Lap. (*Selinum Cervaria* L. Bert.) It. Cervaria, Selino nero.

Colli aprici, frequentissimo (Mompiano, Maddalena). Lug.-Ag.

P. austriacum Koch?

Zantedeschi sotto il nome di *Selinum austriacum* lo dice crescere sull'alpe di Zarda e sul Dossoalto, colto in fiore nell'agosto.

P. Oreoselinum Mœnch. (*Selinum oreoselinum*. Scop. Bertol.) It. Apio montano.

Colli aprici, campi asciutti, frequentissimo (Ronchi, Mompiano). Luglio-Settembre.

Pastinàca L. Sist. Sex. Pent. Dig.

P. sativa L. It. Pastinàca, Pastriccioni. Br. *Pastenaghe*, *Pastenàdeghe*.

Rive, campi, prati dei colli e del piano adjacente, frequente.
Agosto-Ottobre.

Heraclèum L. Sist. Sex. Pent. Dig.

H. Pollinianum Bertol. It. Panàce puzzolente.

Praterie orientali del monte Catino, raro. Luglio-Agosto.

H. flavescens Villd. It. Panàce sbrandellato.

Pascoli prealpini, frequente (monti Gazzo e Cornablacca).
Luglio-Agosto.

H. Sphondylium L. It. Branca orsina.

Margini dei fossi al piano e prati al monte, frequente. Luglio-Agosto.

Imperatoria L. Sist. Sex. Pent. Dig.

I. Obstruthium L. It. Erba rossa, Imperatoria. Br. *Emperatoria*.

Pascoli prealpini, frequente (monti Colombine, Cigoletto, Maniva). Luglio-Agosto.

Thyssellum Hoffmann. Sist. Sex. Pent. Dig.

T. palustre Hoffm. (*Selinum palustre* L. Bert.) It. Selino lattajòlo.

Colli surtumosi a Capriano, raro. Luglio-Agosto.

Tordyllum L. Sist. Sex. Pent. Dig.

T. maximum L. It. Ombrellini delle steccie.

Siepi e margini dei fossi, frequente. (Ponte S. Marco, Calcinato). Giugno-Luglio.

Laserpitium L. Sist. Sex. Pent. Dig.

L. prutenicum L. It. Làsero pimpinellino.

Colline e piano sottoposto, frequente (Mompiano, Capriano, Poncarale). Agosto-Settembre.

L. nitidum Zanted. It. Làsero, lucido.

Monti Fronden, Pesseda, Dossalto, Dragone, Dragoncello.
Luglio-Agosto.

L. hirsutum Lamk. It. Làsero peloso.

Dirupi delle prealpi (monti Fronden, Pesseda, Gazzo). Luglio-Agosto.

L. peucedanoides L. It. Làsero peucedanino (†).

Vette del Dragone e del Guglielmo; monti Vezegno e Fronden, frequente. Giugno-Luglio.

L. Siler L. It. Sesèlio, Sermontano. Br. *Arsiss*.

Rupi montane e prealpine, frequente (tra Marone e Vello). Maggio-Giugno.

L. Gaudinii DC. It. Làsero Cervaria.

Luoghi sassosi montani e paealpini, raro (m. Ario). Luglio-Agosto.

L. latifolium L. It. Erba nocitola.

Rupi e frane montane e prealpine, raro (monti sopra Limone). Luglio-Agosto.

Daucus L. Sist. Sex. Pent. Dig.

D. Carota L. It. Capo bianco, Carota selvatica. Br. *Maigola*.

Prati, luoghi erbosi dal piano al monte, frequentissimo. Maggio-Ottobre.

β. *prolifera* (2). Prati a S. Francesco di Paola al sud della ferrovia.

È dubbio se la *Carota* coltivata comunemente derivi da questa specie, o piuttosto dal *Daucus maximus* indigeno della Sardegna.

Orlaya Hoffm. Sist. Sex. Pent. Dig.

O. platicarpus Koch. (Caucalis platicarpus L. Bert.) It. Làppola boaria.

Ronchi all'aprico, frequente (S. Gottardo). Giugno-Luglio.

O. grandiflora Hoffm. (Caucalis grandiflora L. Bert.) It. Làppola, Zecca.

(1) Involueri et involucelli foliola non sunt prorsus lineari-setacea; sed lineari-lanceolata, arefactione vero subito involuta, et setacea facta.

(2) Collezio et possideo specimina mire prolifera: radli enim umbellularum plerique florigeri; centrales vero rursus umbellati, et istae quoque umbellulae more priorum florigeræ et umbellatae, ita ut umbella universalis decem possit quadriflorae; flores omnes fertiles.

Margini secchi delle strade di collina e del piano, frequentissima. Giugno-Luglio.

β. prolifera (1). Presso Rezzato.

Torilis Adans. Sist. Sex. Pent. Dig.

T. nodosa Gärtn. It. Lappolina.

Margini delle vie e dei campi (Rezzato al laghetto, Castenedolo, Ronchi). Aprile-Giugno.

T. infesta Smith. (*T. helvetica* et neglecta Koch.) It. Lappolina.

Siepi, strade, margini dei campi, frequentissima. Magg.-Lug.

T. Anthriscus DC. It. Lappola Petrosello.

Siepi, cespugli, strade, frequentissimo. Giugno-Luglio.

Caucalis L. Sist. Sex. Pent. Dig.

C. daucoides L. It. Lappola Carota.

Campi magri, frequente (Campagna di Montechiaro) Maggio-Luglio.

Turgentia Hoffm. Sist. Sex. Pent. Dig.

T. latifolia Hoffm. (*Caucalis latifolia* L. Bert.) It. Lappola maggiore.

Messi fra il Benaco e Pozzolengo; campagna di Montechiaro, frequente. Giugno-Luglio.

Scandix L. Sist. Sex. Pent. Dig.

S. Pecten-Veneris L. It. Spillettoni.

Messi, margini erbosi del piano e dei colli, freq. Marzo-Giug.

Anthriscus Hoffm. Sist. Sex. Pent. Dig.

A. sylvestris Hoffm. (*Chærophyllum sylvestre* L. Bert.) It. Cerfoglio selvatico.

Prati e selvette del piano e dei colli, frequente. Maggio-Lug.

A. Cerefolium Hoffm. (*Chærophyllum sativum* Lamk. Bert.) It. Cerfoglio. Br. *Serfòi*.

Non indigeno del Bresciano: coltivasi da alcuni per l'aroma delle foglie, e trovasi talvolta sporadico fra le siepi. Maggio-Giugno.

(1) *Involueris involucrellisque superne pinnatifidis; umbellularum radiis internis iterum umbellulatis.*

A. vulgaris Pers. It. Lappola.

Siepi e campi del piano, frequentissimo (Verolanuova).
Aprile-Maggio.

Chærophyllum L. Sist. Sex. Pent. Dig.

C. temulum L. (Myrrhis temulenta Smith. Bert.) It. Cicutaria. Br. *Sigüta*.

Strade, ruderali, luoghi incolti, frequentissimo. Giugno-Lug.

C. hirsutum L. (Myrrhis hirsuta Spreng. Bert.) It. Scandiona pelosa. Br. *Sæza*.

Margine dei ruscelli e luoghi umidi dei colli e dei monti, frequentissimo (monti ad Agnosine, Val d'Inzino, Guglielmo). Aprile-Maggio.

C. aureum L. (Myrrhis aurea Spreng.) It. Finocchiella bastarda.

Vette del Dragone, monte Guglielmo sopra Zone. Lugl.-Ag.

Myrrhis Scop. Sist. Sex. Pent. Dig.

M. odorata Scop. It. Finocchiella.

Pascoli prealpini, frequente (Cornablaça, Maniva, Dossalto).
Giugno-Luglio.

Melospermum Kock. Sist. Sex. Pent. Dig.

M. cicutarium DC. It. Cicutaria fetida. Br. *Erba per la rognà*.

Pascoli sassosi delle prealpi, frequentissimo (monti Ario, Cornablaça, Cigoletto). Giugno-Agosto.

Pleurospermum Hoffm. Sist. Sex. Pent. Dig.

P. austriacum DC. It. Cicutaria, Cicutina.

Pascoli sotto alle vette del Broffione, raro. Luglio-Agosto.

Conium L. Sist. Sex. Pent. Dig.

C. maculatum L. It. Cicuta, Erba grande. Br. *Sicüta*.

Strade, ruderi del piano, pascoli montani presso le stalle, frequente. Giugno-Luglio.

Bifora Hoffm. Sist. Sex. Pent. Dig.

B. flosculosa M. ab B. (B. testiculata DC. Bert.) It. Coriandolo selvatico. Br. *Erba che spæssa*

Fra le messi, piuttosto rara. Aprile-Maggio.

B. radians M. ab B. It. Coriandolo falso. Br. *Erba che spæssa*.

Fra le messi frequentissima. Maggio-Giugno.

Il *Coriandrum sativum* L. It. Coriandro, Coriandolo. Br. *Coriàndol*, coltivasi fuori di provincia pel seme aromatico.

Il *Cuminum Cyminum* L. It. Comino, Br. *Comi*, è dell'Egitto, e coltivasi pei semi simili al Finocchio.

ORDO LVI. ARALIACEÆ.

Hédéra L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

H. helix L. It. Edera, Ellera. Br. *Ligabösch*.

Muri, rupi, alberi, frequentissimo. Agosto-Ottobre

ORDO LVII. CORNÆÆ.

Cornus L. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.

C. sanguinea L. It. Sanguinello, Br. *Sànguen*, *Sanguani*.

Siepi e boschi dal piano alle prealpi, frequentiss. Mag.-Giug.

C. mas L. It. Corniolo. Br. *Cornàl*.

Selvette dei monti e dei colli fino alle siepi del piano. frequente. febbrajo-Aprile.

ORDO LVIII. LORANTHACEÆ.

Viscum L. Sist. Sex. Diœcia. Tetrandria.

V. album L. It. Sevaggine, Veschiajo. Br. *Vesgg*.

Parassitica sui tronchi di molti alberi, non mai della quercia. Alta Riviera; monti sopra Gargano sul *Sorbus Aria*. Aprile-Maggio.

Non delle bacche di questa pianta si forma il vischio, ma di quelle d'un'altra della stessa famiglia, il *Loranthus Europæus* abbondante nell'Aponnino.

ORDO LIX. CAPRIFOLIACEÆ.

Adôxa L. Sist. Sex. Octandria Tetragynia.

A. moschatellina L. It. Dentaria moscadellina.

Verolanuova lungo lo *Strone*. Selvette montane. Aprile-Mag.

Sambucus L. Sist. Sex. Pentandria Trigynia.

S. *Ébulo* L. It. Ebulo, Sambuco erbaceo. Br. *Oles, Ules*.
Margini delle vie, dei fossi e dei campi, frequentiss. Giug.-Lug.

S. *nigra* L. It. Sambuco. Br. *Sambûc*.

Cespugli dei colli e dei monti, siepi del piano, frequentissimo. Giugno-Luglio.

S. *racemosa* L. It. Sambuco montano. Br. *Sambûc ross*.
Rupi subalpine, frequente (Castellino presso Collio, Broffione). Aprile-Maggio.

Viburnum L. Sist. Sex. Pentandria Trigynia.

V. *Opulus* L. It. Sambuco acquatico, Oppio. Br. *Sambûghina, Lentà mascc*.

Selve, siepi del piano e dei monti, frequente (Maddalena).
Aprile-Maggio.

β. *floribus omnibus radiantibus conglobatis sterilibus*. Br. *Bâh de nev*.

Coltivato nei giardini per ornamento.

V. *Lantana* L. It. Lentana. Br. *Lentàna, Antàna, Antà, Antanèl, Merda de gat*.

Colli e monti nei cespugli, siepi del piano, frequentissima.
Aprile-Giugno.

Coltivasi per essere sempre verde e per i fiori il V. *Tinuu*,
It. Lauro Tino, dell'Italia meridionale.

Lonicera L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

L. *Caprifolium* L. It. Caprifoglio, Madreselva. Br. *Panodi de la Madonna*.

Cespugli e siepi dei colli, frequentissima. Aprile-Maggio.

L. *alpigena* L. It. Cameceraso, Ciriegia d'alpe. Br. *Sarizi bastard*.

Selve ombrose dei monti e delle prealpi, frequente (M. Dragone, Vezegno). Maggio-Giugno.

L. *cærulea* L. It. Ciriegia alpina cerulea. Br. *Sarizi bastard*.

Selvette prealpine, frequente. (monte Broffione alle Selve di Brumino, Coste di Ravenola vaga presso i laghetti). Lugl.

- L. nigra** L. It. Ciriègia selvatica. Br. *Sarizi bastard.*
 Selvette prealpine colle precedenti, frequente. Aprile-Magg.
L. Xilosteuum L. It. Madreselva pelosa. Br. *Legn bianc.*
 Dai colli al piano nelle siepi e nei cespugli, frequente
 (S. Gottardo). Aprile-Maggio.

Linnæa Gronov. Sist. Sex. Didynamia Angiospermia.

- L. borealis** Gr. It. Linnèa.
 Monte Gazzo nei terreni muscosi, rara. Luglio-Agosto.
 Il *Symphoricarpos vulgaris* Mich. It. Simforicarpo, Br. *Sinforogna*, coltivato ovunque nei giardini, è indigeno dell'America settentrionale.

ORDO LX. RUBIACEÆ.

Sherardia L. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.

- S. arvensis** L. It. Toccamano.
 Margini dei campi, dei fossi e delle vie ovunque, frequentissima. Aprile-Luglio.

Asperula L. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.

- A. arvensis.** L. It. Palloncino, Stellina ruvida.
 Campi a frumento, rara. Maggio-Giugno.
A. taurina L. It. Stellina cruciata.
 Selvette dei colli, margini de' ruscelli montani, frequente.
 (Da Nave a Caino lungo i fossi; Agnosine). Aprile-Mag.
A. odorata L. It. Stellina odorosa.
 Colli a Gardone riviera, monti Dragone e Dragoncello, frequente. Maggio-Giugno. Odore di vaniglia gratissimo.
A. cynanchica L. (A. cynanchica et A. longiflora Koch.)
 It. Squinanzia.
 Colli e campagne secche, frequentissima. (Ronchi, S. Eufemia, Lago d' Idro). Giugno-Luglio.
A. galioides MB. It. Stellina glauca.
 Colli a Pozzolengo, rarissima. Giugno.
Galium L. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.
G. Aparine L. It. Asprella, Appleccamano. Br. *Taca ma.*
 Muri, siepi, orti, frequentissimo. Maggio-Settembre.

- G. tricornes* Röm. et Schutt. It. Caglio coriandolino. Br. *Taca ma*.
Fra le messi, principalmente dei campi suburbani, frequente. Maggio-Giugno.
- G. retrorsum* Guff. (*G. pedemontanum* Bertol.) It. Crociata scabra.
Colli secchi sotto Rivoliella, raro. Maggio-Giugno.
- G. parisiense* L. It. Asprella sottile.
Parti asciutte della *Lama Chiodo*, frequente. Giugno-Agosto.
β. angelicum Huds. Colla specie.
- G. vernum* Scop. It. Crociata minore.
Siepi, margini erbosi dei colli, frequente. Aprile-Giugno.
- G. cruciata* Scop. It. Crociata, Erba croce.
Siepi e cespugli dei colli e del piano, frequentiss. Apr.-Mag.
- G. palustre* L. It. Stellina ruvida.
Margini delle acque morte, lame, paludi, frequente. Mag.-Giug.
β. elongatum Presl. Colla specie.
- G. boreale* L. It. Erba croce lanciata.
Lame di Bagnolo e della *Scovola*, abbondantissimo. Mag.-Giug.
- G. sylvestre* Pollik (*G. pusillum* Bertol.) It. Caglio esile.
Rupi e frane prealpine, frequente (M. Guglielmo). Giug.-Ag.
β. alpestre Koch. M. Guglielmo alle stalle, frequentissimo.
- G. rubrum* L. It. Caglio capillare.
Cespugli e siepi dei colli e dei monti all'aprico (S. Goltardo, Montechiaro). Luglio-Agosto.
- G. purpureum* L. It. Caglio porporino.
Colli aprici e sassosi (Mompiano). Maggio-Giugno.
- G. sylvaticum* Koch.
Selve ombrose dei colli, frequente (M. Conche). Giug.-Lugl.
- G. aristatum* Koch. It. Caglio delle selve.
Selvette dei colli e dei monti, più frequente dell'antecedente. Giugno-Luglio.
- G. mollugo* L. It. Caglio bianco, Ingrassa bue.
Prati, siepi, margini dei campi, frequentissimo. Maggio-Ag.

G. lucidum Koch. (*G. erectum* β . Bertol.) It. Caglio punteggiato.

Colli secchi, rupi all'aprico, muri, frequentissimo. Magg.-Lug.

G. verum L. It. Caglio zolfino. Br. *Erba quacc.*

Pascoli secchi, margini dei campi di collina, frequentissimo. Giugno-Luglio.

Rubia L. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia

R. peregrina L. It. Robbia selvatica, Br. *Ræbia salvadega*, *Liga*.

Siepi dell'alta Riviera, frequente (Gardone, Seniga). Maggio.

R. tinctorum L. It. Robbia; Br. *Ræbia*, *Garansa*.

Qua e là erratica sui muricciuoli vecchi campestri. Maggio-Giugno. Ritenuta originaria dell'Asia, coltivasi altrove per farne tintura rossa.

La *Coffea arabica* L. It. e Br. *Caffè*, è indigena dell'Arabia, ed ora estesamente coltivata nell'America tropicale e nelle vicine isole.

La *Cinchona officinalis* L. ed altre specie americane dello stesso genere hanno la corteccia febrifuga detta *China*.

Dalla radice della *Cephalis Ipecacuanha* Mutis, e della *Psychotria emetica* Mutis, arboscelli dell'America meridionale, traesi la medicinale Ipecaquana, Br. *Pecaquana*.

ORDO LXI. VALERIANEÆ.

Valeriana L. Sist. Sex. Triandria Monogynia.

V. officinalis L. It. Valeriana, Nardo selvatico. Br. *Valeriana*.

Al fossi nel piano, selve umide nei monti, frequentissima. Maggio-Luglio.

β . *minor* Koch. — Subalpi (monte Guglielmo presso *Niida*).

V. dioica L. It. Valeriana palustre.

Fossi e paludi dal piano ai monti, frequentiss. Aprile-Mag.

V. tripteris L. It. Nardo montano trifogliato.

Monti e prealpi, frequentissima (Dragone, S. Eusebio). Apr. Luglio.

β . *intermedia* Vahl. Al sud di Agnosine.

V. montana L. It. Nardo montano fatuo.

Dumeti montani e prealpini (dosso settentr. del Guglielmo; rupi del monte Ario). Luglio-Agosto.

V. saxatilis L. It. Nardo rupino.

Creste del Guglielmo, e tutto il monte Ario, frequente. Luglio-Agosto.

V. celtica L. It. Nardo celtico.

Sulla fede dello Zantedeschi che dice averla trovata sul declivio occidentale dell'Ario. Io non vi trovai che forme più esili della *V. saxatilis*.

Centranthus DC. Sist. Sex. Triandria Monogynia.

C. ruber DC. (Valeriana rubra L. Bert.) It. Valeriana rossa, Savonina.

Mura della città e del castello, Ronchi sponde del Benaco e del Sebino, frequentissima. Maggio-Agosto.

β flore albo. Ruderati dei Ronchi sotto il Patrocinio.

Valerianella Pollich. Sist. Sex. Triandria Monogynia.

V. olitoria Pollich. It. Dolcetta, Locusta. Br. Grassèi.

Campi, prati, siepi, frequentissima. Aprile-Maggio.

V. dentata Pollich. It. Locusta liscia. Br. Grassèi.

Messi, poco frequente. Aprile-Maggio.

β. *Morisonii* DC. Colla specie.

V. coronata DC. It. Locusta canuta.

Messi fra Desenzano e Lonato, frequente. Aprile-Maggio.

V. auricola DC. It. Locusta liscia. Br. Grassèi.

Fra le messi poco frequente (Ferrovia suburbana). Apr.-Maggio.

V. echinata DC. It. Erba riccia.

Messi sulle collinette presso Venzago, rara. Aprile-Maggio.

ORDO LXII. DIPSACEÆ.

Dipsacus L. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.

D. sylvestris L. It. Scardiccone selvatico. Br. Sgars salvadeg.

Margini dei campi e dei fossi ovunque, frequentissimo. Luglio-Agosto.

β. *pinnatifidus*. Qua e là colla specie.

D. laciniatus L. It. Sgarzo, Pettine. Br. *Sgars salvadeg.*

Valletta di Toscolano, rarissimo. Luglio-Agosto.

Coltivasi in alcuni luoghi, sul Bolognese principalmente, il

D. fullonum, i cui capi cilindrici uncinosi servono a pettinare i panni.

Cephalaria Schrad. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.

C. tansylvanica Schrad. It. Vedovina maggiore. Br. *Vedoine salvadeghe.*

Castello, Campagna di Montechiaro, abbondante. Luglio-Sett.

β. *foliis caulinis omnibus indivisis*. Castello, colla specie.

C. alpina Schrad. It. Bottonaria gialla.

Sotto il nome di *Scabiosa alpina* L. Zantedeschi dice d'averla trovata sul Fronden, e nei pascoli di Cornablacca.

Knautia L. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.

K. sylvatica Duhy. It. Vedovina ruvida.

Pascoli e selve montane e prealpine, frequente. Giug.-Ag.

K. arvensis DC. It. Vedovina selvetica. Br. *Vedoine salvadeghe.*

Campi, siepi, declivi ombrosi, frequentissima. Maggio-Luglio.

β. *longifolia* VK. Vette erbose del Guglielmo.

K. integrifolia Bert. It. Vedovina granajola.

Fra le messi ad Agnosine. Giugno-Luglio.

Succisa Mert. et Koch. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.

S. pratensis Mœnch. It. Morso del diavolo. Br. *Vedoine salvadeghe.*

Prati e pascoli dal piano ai monti (Prati a Torbole, colli a Salò, Maddalena). Agosto-Settembre

β. *flore albo*. Prati a Graticelle.

S. australis Rchb. It. Vedovina serpeggiante.

Lama la Bissa, e parecchie risaje, frequente. Luglio-Sett.

Scabiosa L. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.

S. Columbaria L. It. Vedovina selvetica. Br. *Vedoine salvadeghe*, *Scobiusa*.

Colli e monti fra le rupi, frequente (Mompiano, Quarone). Maggio-Luglio.

S. Gramuntia L. It. Vedovina selvatica. Br. *Vedoine salvadeghe, Scabiosa*.

Colli aprieti, margini e campi secchi (Mella, Strone a Verolanuova, colli a Desenzano). Maggio-Settembre.

S. graminifolia L. It. Vedovina argentina. Br. *Vedoine de mont.*

Colline e bassi monti all'aprico, frequentissima (Conche, Collebeato, Guglielmo). Giugno-Agosto.

S. suaveolens WK. (†) It. Vedovina selvatica.

Monte Dragone, rara. Luglio.

Coltivasi per ornamento:

S. atropurpurea L. It. Vedovine scure Br. *Vedoine*, delle Indie orientali.

ORDO LXIII. COMPOSITÆ.

Subordo I. Corymbifera.

Eupatorium L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Æqualis.

E. cannabinum L. It. Eupatorio, Canape acquatica. Br. *Canef salvadeg.*

Ai fossi ed in luoghi umidi dal piano ai monti, frequentissimo. Agosto-Ottobre.

β. foliis omnibus indivisis. Lungo l'Oglio sopra Palazzolo, rara.

Adenostyles Cassin. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Æqualis.

A. albifrons Rchb. It. Cacalia Petasite.

Somme vette del Mufetto a settentrione, abbondante. Luglio-Agosto.

A. alpina Bl. et Fing. It. Cacalia maggiore.

Luoghi umidi prealpini frequente (Guglielmo, Dragone, Ario). Luglio-Settembre.

β. floribus albis. Sul monte Cornablacca.

(†) Scabiosa foliis coriaceis, utrinque mollissimè velutinis, inferioribus spatulato-obovatis integerrimis, caulinis mediis basi planatis, superioribus planatis, lacinulis linearibus integerrimis.

Homogyne Cassin. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Superflua.

H. alpina Cass. It. Tussilaggine liscia.

Boschi umidi delle prealpi, frequente (M. Colombine alle *Poffe Ratte*). Giugno-Luglio.

Tussilago L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Superflua.

T. Fàrfara L. It. Tussilaggine, Farfaraccio. Br. *Fàrfara*, *Droghe*.

Luoghi argillosi umidi, frane delle cave, frequentissima. Marzo-Aprile.

Petasites Gaertn. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Superflua.

P. officinalis Mœnch. (P. vulgaris Bertol.) It. Tussilaggine maggiore, Petasite. Br. *Capelòcc*, *Rèdoi*, *Ròdoi*.

Ai fossi del piano e delle valli, frequentissimo. Marzo-Apr.

P. albus Gaertn. It. Farferugio bianco. Br. *Ridoi bianc*.

Luoghi umidi dei monti e delle prealpi, frequente (Dragone, Ario). Aprile-Maggio.

P. niveus Cass. It. Farferugio velutino.

Fuscelli in Val Bertone sopra Caino, frequentissimo. Aprile.

Linosyris DC. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Æqualis.

L. vulgaris DC. (Chrysocoma Linosyris L. Bertol.) It.

Spilli d'oro.

Colli sassosi suburb., frequente (Costalunga sopra la chiesa).

Agosto-Ottobre.

Aster L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Superflua.

A. alpinus L. It. Astero alpino.

Pascoli prealpini, frequente (Guglielmo). Agosto-Ottobre.

A. Amellus L. It. Amello.

Luoghi erbosi de' colli e de' monti, frequente (Badia, Urago).

Agosto-Ottobre.

β. *pseudo-Amellus* DC. (4). Colla specie.

(4) Est varietas parvi momenti involucri foliis interioribus membranacea apice purpureis.

A. brumalis Nees. It. *Astero americano*.

Originario dell'America settentrionale, trovasi qua e là erratico lungo i fossi (Ponte alto, S. Eustacchio) Sett.-Nov.

Bellidiastrum Cassin. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Superflua.

B. Michellii Cassin. (*Margarita Bellidiastrum* Gaud. Bertol.) It. *Margherita d'alpe*.

Pascoli montani e prealpini, frequentissimo (Dragone, Guglielmo). Maggio-Luglio.

Bellis L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Superflua.

B. perennis L. It. *Bellide*, *Margherita*, *Pratolina*. Br. *Margaritine*.

Prati, vie, margini, frequentissima. Coltivato a fiore pieno, Br. *Sospir*.

Stenactis Cassin. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Superflua.

S. annua Nees. (*S. bellidiflora* Koch.) It. *Astraceli margaritino*.

Margini erbosi, selvette del piano e dei colli, frequentissima. Luglio-Settembre.

Erigeron L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Superflua.

E. graveolens L. (*Copularia graveolens* Bert.) It. *Cicutaja*, *Cèspita*.

Colle di Capriano, rara. Agosto-Ottobre. Odore della Ruga.

E. canadense L. It. *Impia*, *Saèppola*.

Campi, rive dal piano alle prealpi, frequentissimo. Lug. Ag.

E. acre L. It. *Asteràno*, *Cèspita selvatica*.

Colli aprici e sassosi, frequente (Costalunga, Botticino, Salò). Luglio-Settembre.

E. alpinum L. It. *Cèppica alpina*.

Vette del Guglielmo e del Dossalto, frequente. Giugno-Ag. β . *uniflorum* L. (1). Vette dell'Alpe di Vaja.

E. Villarsii Willd. (*E. Villarii* Bertol.) It. *Cèppita scabra*. Monte Gazzo versante al Benaco, rarissimo. Giugno-Agosto.

(4) involu. ro lanato hirsutissimo

Soldago L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Superflua.

S. Virgaurea L. Erba giudaica, Verga aurea.

Luoghi erbosi e ombrosi dei colli e dei monti, frequentiss.

Agosto-Ottobre.

S. minuta L. It. Verga d'oro semplice.

Cespugli e pascoli di Prada (Zantedeschl.).

Wiborgia Roth. Sist. Sex. Syng. Polyg. Superflua.

W. Acmella Roth (Gallinsaga parviflora DC. Koch.) It.

.....
Oriunda del Messico, è ora fatta indigena dell'Europa, e
trovasi qua e là nei campi e per le vie del piano e dei
monti; rarissima.

Bidens L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Æqualis.

B. cernua L. It. Forbicina intera. Br. *Forbizine*.

Ai fossi e luoghi paludosi dal piano ai monti, frequentis-
sima. Agosto-Settembre.

β. monocephala. Paludi a Torbole, e lungo lo Strone a Ve-
rola nuova.

B. tripartita L. It. Canapa acquatica, Forbicine. Br. *For-
bizine*.

Fossi e luoghi paludosi del piano e dei monti, frequentis-
sima. Agosto-Settembre.

B. bipinnata L. It. Forbicina americana. Br. *Forbizine
de ria*.

Originaria dell'America, ora fatta comune nei campi aridi
e ghiaiosi. (Dietro al castello, S. Eufemia lungo il Na-
viglio, Monte d'Isola). Agosto-Settembre.

Helianthus L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Fru-
stranea.

H. annuus L. It. Girasole, Clizia. Br. *Girasol*.

Del Messico e del Perù; coltivasi comunemente nei semi
oleosi, e trovasi qua e là erratico nei campi e per le vigne.

Da alcuni coltivasi per la radice grossa commestibile l'*H.
tuberosus* del Brasile, Br. *Trifole bastardo*, *Per de tera*.

Buphthalmum L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia
Superflua.

B. salicifolium L. It. Asteroidè salicina. Br. *Æcc de bò*.
Margini dei campi di collina, e nella lama di Bagnolo, frequentissimo. Maggio-Luglio.

B. speciosissimum L. (*Telechia speciosissima* DC. Bertol.) It. Buttalmo rigido. Br. *Erba regina*.

M. Guglielmo a *Spondalunga e Niidi*, monti a Lumezzane, frequentissimo. Giugno-Luglio.

Pallenis Cassin. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Superflua.

P. spinosa Cassin. (*Astericus spinosus* Bertol.) It. Astro spinoso.

Colli Benacesi, poco frequente. Giugno-Agosto.

Inula L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Superflua.

I. graveolens Koch. (*Copularia graveolens* Bertol.) It. Cicutaia, Cèspita. — Odore della *Ruta graveolens*. Br. *Erba per le sæmeghe*.

Colle di Capriano, rara. Agosto-Ottobre.

I. Helenium L. It. Enula campana, Antiveleno.

Lungo il fosso maggiore tra Pozzolengo e il Benaco, abbondante. Luglio-Agosto.

I. britannica L. It. Erba da gambe, Laurenziana.

Prati paludosi fra Rivoltella e Sirmione, tra Palazzolo e Pontoglio, frequente. Agosto.

I. squarrosa L. It. Ènula uncinata.

Colli e monti all'aprico (alla Bornada; tra Nave e Caino). Luglio-Settembre.

I. hirta L. It. Ènula scabra.

Colli e monti all'aprico, frequentissima (Maddalena e adiacenze). Giugno-Agosto.

I. salicina L. It. Spragginella.

Selvette, prati, rive de' fossi, frequente (Pontevecò allo Stro-ne). Giugno-Agosto.

Pulicaria Gaertn. Sist. Sex. Syng. Polygamia Superflua.

P. vulgaris Gaertn. (*Inula Pulicaria* L. Bertol.) It. Enula pulciaia.

Terreni siltuosi, margini dei fossi, frequente (Torbole).
Luglio-Ottobre.

P. dissenterica DC. (*Inula dissenterica* L. Bertol.) It.
Menta selvatica.

Ove l'antecedente, frequentissima. Luglio-Settembre.

Conyza L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Superflua.

C. squarrosa L. (*Inula Conyza* DC. Koch.) It. Coniza,
Baccherina.

Margini delle vie, muri, ruderali dal piano al monti, frequente (Mompiano). Maggio-Settembre.

Carpesium L. Sist. Sex. Syng. Polyg. Superflua.

C. cernuum L. It. Astraceli capo chino.

Margini dei campi, dei fossi e delle strade, frequente (Mompiano) Agosto-Ottobre.

Micropus L. Sist. Sex. Singenesia Polygam. Necessaria.

M. erectus L. It. Bambagia lanosa.

Qua e là fra le messi nella Campagna di Calcinatello. Giugno-Luglio.

Filago L. Sist. Sex. Syngenesia Polyg. Superflua.

F. germanica L. It. Brentini, Canapicchia, Erba Velia.

Luoghi sterili, ruderali, vie, frequentissima. Maggio-Settembre.
β. *pyramidalis* DC. Frequente colla specie.

F. arvensis L. It. Canapicchia piramidale.

Colline a Manerba. rarissima. Giugno-Agosto.

F. minima Fries. It. Canapicchia sottile.

Colle Montorfano, rara. Luglio-Agosto.

F. gallica L. It. Bambagia selvatica, Filonia.

Campagna di Montechiaro, frequente. Maggio-Settembre.

Gnaphalium L. Sist. Sex. Syng. Polyg. Superflua.

G. silvaticum DC. (*G. rectum* Willd. Bertol.) It. Leontopodio falso.

Selve montane e prealpine, frequente (Guglielmo, Colombine). Luglio-Agosto.

β. *norvegicum*. Colombine sopra le *Poffe Ratto*.

G. supinum L. It. Canapicchia sottile.

Somme vette del Guglielmo e del Cigoletto. Luglio-Agosto.

β . fuscum Pers.	} promiscuamente colla specie.
γ . pusillum Pers.	

G. uliginosum L. It. Canapicchia palustre.

Lungo i rivi da Graticelle al M. Mufetto, frequente. Lug.-Ag.

G. luteo-album L. It. Canapicchia pagliata. Br. *Sempiterni salvadeg.*

Luoghi depressi a Torbole; lama la Bissa; colli a Calino; campi tra Desenzano e Venzago: frequente. Giugno-Sett.

G. Leontopodium Scop. It. Leontopodio vero. Br. *Fiur de lana.*

Pascoli rupestri delle prealpi, frequente (Guglielmo a Costarica, alpi di Vaja, monti Rondenino e Dossoalto). Luglio-Agosto.

G. dioicum L. It. Bambagia selvatica. Br. *Sempiterni de mont.*

Colli al sud d' Iseo; Maddalena, declivio settentrionale, frequentissimo. Maggio-Luglio.

G. carpathicum. Wahlemb. It. Canapicchia livida.

Vetto del Cigoletto alle Crocette. Luglio-Agosto.

Coltivansi per la leggiadria e durata dei fiori:

G. eximium L. Br. *Sempiterni d'or.* Del Capo di Buona Speranza.

G. margitaceum L. Br. *Sempiterni sölfer.* Della Germania.

Artemisia L. Sist. Sex. Syng. Polyg. Superflua.

A. Absinthium L. It. Assenzio. Br. *Mèdec gross, Assensio.*

Campi e luoghi secchi e petrosi dei colli e dei monti, frequentissimo (Montorfano, Riviera del Benaco e del Sebino, ecc.). Luglio-Settembre.

A. Mutellina Vill. It. Genipi bianco.

Somme vette del monte Gazzo, rara. Luglio-Agosto.

A. glacialis L. It. Genipi nero.

somme rupi dell' alpe di Vaja, rarissimo. Luglio-Agosto.

A. vulgaris L. It. Amarella, Assenzio selvatico. Br. *Erba legn.*

Margini dei fossi, siepi, dal piano al monte, frequentissima. Agosto-Settembre.

A. *spicata* L. It. Genipi a spiga.

Vette del monte Broffione, rarissima. Agosto.

A. *campestris* L. It. Abròtano di campo. Br. *Ambrogn bastard*.

Luoghi secchi ed aprichi, frequentissimo (Bassa Riviera, Verolanuova, Mella a Chiesanuova). Agosto-Settembre.

A. *camphorata* Vill. It. Abròtano maschio. Br. *Ambrogn mascc*.

Rupi di tutti i colli all'aprico, frequentissima. Lugl.-Sett.

Coltivansi:

A. *Abrotanum* L. Br. *Ambrogn*, dell'Asia } Per volgare uso

A. *pontica* L. Br. *Medec zentil* della Germania } medicinale.

A. *Dracunculus* L. Br. *Stragonsèl*, *Dragù*, dell'Asia settentrionale. Per condimento.

L'A. *judaica*, i cui fiori ridotti in polvere sono il così detto *Seme santo*, Br. *Seme sante*, e da cui estraesi la *Santonina*, è indigena della Palestina e dell'Arabia.

Tanacetum L. Sist. Sex. Syng. Polyg. Superflua.

T. *vulgare* L. It. Danèto, Tanaceto, Solfinà. Br. *Danèt*, *Erba santa*.

Margini dei fessi e dei campi del piano, frequentissimo.

Luglio-Settembre.

T. *Balsamita* L. It. Erba amara, Erba buona. Br. *Erba cazonsèla*.

Della Sicilia: coltivasi ovunque per condimento, e qua e là trovasi erratica. Giugno-Agosto.

Hellerysum Gaert. Sist. Sex. Syng. Polyg. Superflua.

H. *angustifolium* DC. (*Gnaphalium Stœcas* Bert?) It. *Stècade citrina*.

Campagna di Ghedi e di Montechiaro, rarissima. Lugl.-Sett.

Achillèa L. Sist. Sex. Syng. Polyg. Superflua.

A. *Ptarmica* L. It. Erba starnuto.

Colli di Capriano, rarissima. Agosto-Ottobre.

A. *Clavennæ* L. It. Assenzio bianco.

Rupi e vette del Guglielmo, Rondenino, Vaja, frequente. Luglio-Agosto.

A. *macrophylla* L. It. Achillèa matricallina.
Monte Zerle sopra Collio, monti Malgetta, Maniva e Dossalto.
Luglio-Agosto.

A. *moschata* L. It. Erba Livia.
Vette del monte Desdana scendendo al laghetto Lug.-Ag.

A. *atrata* L. It. Achillèa Finocchiella.
Pascoli sotto le vette del monte Catino. Luglio-Agosto.

A. *nana* L. It. Achillea villosa.
Vette dell'alpi di Vaja, rarissima. Luglio-Agosto.

A. *tomentosa* L. It. Millefoglie giallo. Br. *Tajadura zalda*.
Da Lonato al padule Lavajone, abbondante. Giugno-Luglio.

A. *tanacetifolia* All. It. Achillea tanacetina Br. *Erba tajaduzza*.
Vette del Maddalena, colli di Costalunga, Madonna di Conche. Giugno-Agosto.

α. *magna* All. — Costalunga.

β. *stricta* Schleich. — Maddalena, colla specie.

A. *Millefolium* L. It. Achillea, Millefoglio. Br. *Erba tajaduzza*, *Erba trementina*.
Strade, campi, prati dal piano ai monti, frequentissima. Maggio-Ottobre.

β. *setacea* WK. Luoghi secchi sassosi.

γ. *lanata* Koch. Maddalena, Guglielmo, frequentissima.

δ. *alpestris* Wimm. et Grab. Prati e rupi prealpini.

Nei prati stabili prevale la varietà a flor rosso; negli altri luoghi abbonda quella a flor bianco.

A. *nobilis* L. It. Achillea Siderite:

Monte Ardo sopra Toscolano, pochi esemplari. Luglio.

Anthemis L. Sist. Sex. Syng. Polyg. Superflua.

A. *tinctoria* L. It. Assenzio selvatico, Erba da tinger giallo.
Luoghi secchi dei colli, frequentissima. (Castello). Giug.-Set.

A. *Cota* L. It. Cota, Tribolo, Brucia occhi.
Campi a Desenzano, Sirmione, Pozzolenigo, Campagnola di Calcinatello, frequente. Maggio-Giugno.

A. *arvensis* L. It. Camomilla bastarda. Br. *Camamela salvadega*.

Campi e messi, frequente (Calcinatello, Iseo). Giugno-Sett.

β . *ruthenica* MB. Campi e messi, rara.

A. *Còtula* L. It. *Còtula fetida*.

Vie, margini erbosi, campi, frequente. Maggio-Settembre.

A. *nobilis* L. It. *Camomilla nobile*.

Messi presso Iseo, frequente. Maggio-Giugno

A. *alpina* L. It. *Bambagella alpina*.

Monte Gazzo presso le vette, rarissima. Agosto.

Matricaria L. Sist. Sex. Syng. Polyg. Superflua.

M. *Chamomilla* L. It. *Camomilla*, Antemide. Br. *Camamela*.

Margini dei campi e delle strade, cortili, orti, frequentissima.

Maggio-Settembre.

Chrysanthemum L. Sist. Sex. Syng. Patyg. Superflua.

C. *Leucanthemum* L. It. *Bellide maggiore*, Occhio di Bue.

Br. *Margaritine*.

Prati e luoghi erbosi, frequentissimo. Aprile-Ottobre.

C. *montanum* L. (C. *Leucanthemum* β . Bertol.). It. *Bellide maggiore*.

Luoghi erbosi montani e prealpini, frequentissimo (Dragone, Guglielmo, Colombine). Maggio-Agosto.

β . *atratum* L. Bertol. Vette del Cigoletto e del Broffione.

C. *alpinum* L. (Pyrethrum *alpinum* Wild. Bertol.) It.

Matricale alpino.

Somme vette del Cigoletto e delle Colombine, frequente.

Luglio-Agosto.

C. *Parthenium* Pers. (Pyrethrum *Parthenium* Wild. Bertol.)

It. *Matricale*, Amareggiola. Br. *Crèspola*, *Matrical*, *Erba amara*.

Orti, vigne, ruderali, muri, poco abbondante. Coltivasi a volgare uso medicinale la varietà a foglie crespe, e fiore pieno.

C. *corymbosum* L. (Pyrethrum *corymbosum* DC. Bertol.)

It. *Cota grande*.

Selvette dei colli e dei monti, frequentissimo. (Costalunga, Collebeato ecc.). Giugno-Luglio

C. *inodorum* L. (Pyrethrum *inodorum* Willd. Bert.) It.

Matricale selvatico.

Campi a frumento qua e là, raro. Luglio-Settembre.

Coltivasi per ornamento in moltissime varietà il *C. sinense* Sabin. Br. *Grisantemo*, *Timo d'inverno*, della China.

Il *C. cinerariofolium* Visiani è indigeno della Dalmazia; e i suoi fiori polverizzati sono in commercio sotto il nome di *Polvere insetticida*. Per frode però vi si mescola quella dell'*Anthemis Cotula* e *Arvensis*.

Doronicum L. Sist. Sex. Syng. Polyg. Superflua.

D. Pardalianches L. It. Doronico.

M. Cigoletto presso la valle *Cloduna*. Giugno-Luglio.

Aronicum Necker. Sist. Sex. Syng. Polyg. Superflua.

A. Clusii Koch. (*Arnica Doronicum* Jacq.) It. Arnica Doronico.

Monte Blennone nei torrentelli; monte Brofflone alle Cornette. Luglio-Agosto.

A glaciale Reich. (*Arnica glacialis* Wulf. Bert.) It. Arnica rigida.

Monte Brofflone alle Cornette (*Zantedeschi*). Luglio-Agosto.

A. scorpioides Koch. (*Arnica scorpioides* L. Bertol.) It. Arnica scorpioide.

Vette del Blennone, e delle alpi di Vaja, rara. Luglio-Ag.

Arnica L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Superflua.

A. montana L. It. Arnica, Betonica di monte. Br. *Arnica*.

Pascoli montani e prealpini, frequentissima (*Maddalena*, *Gu-glielmo*, *Colombine*). Maggio-Luglio.

Cineraria L. Sist. Sex. Syngenesia Polyg. Superflua.

C. longifolia Jacq. It. Cineraria alpina.

Pascoli e selvette montane e prealpine, frequente (*Dragone*, *Vaipiana*). Maggio-Luglio.

β. *spatulæfolia* Koch. *Colia* specie.

Senecio L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Superflua.

S. vulgaris L. It. Erba calderaja, Senecione.

Campi, vie, ruderali, frequentissima. Tutto l'anno

S. viscosus L. It. Senecione viscido.

Ghiaie, frane, vie montane (*Da Bovegno a Collio sulla via*).
Luglio-Ottobre.

- S. rupestris* WK. (*S. laciniatus* Bertol. *S. Nebrodensis* Koch.) It. Senecione montanino.
Pascoli montani e subalpini, frequente (Dragone, Mufetto, Calino). Luglio-Agosto.
- S. abrotanifolius* L. It. Senecione Abrotanino.
Alpi di Vaja, Rondenino, Broffione al confine tirolese. Luglio-Agosto.
- S. erucæfolius* DC. (*S. tenuifolius* Jacq. Bertol.) It. Senecio serpeggiante.
Colli aprici (Castello a nord; Riviera benacese). Sett.-Ott.
- S. iacobæa* L. It. Senecio maggiore. Br. *Erba de S. Giacom.*
Colli aprici della Riviera Benacese, frequente (Gargnano). Giugno-Agosto.
- S. aquaticus* Huds. It. Senecione dei fossi.
Ai fossi tra la Badia e il Laghetto, raro. Maggio-Agosto.
- S. erraticus* L. It. Àstero dei fossi, Àstero giallo.
Ai fossi del piano e dei colli, frequentissimo. Agosto-Ottob.
- S. cordatus* Koch. It. Senecio cordato. Br. *Safrà salvadeg.*
Prealpi presso le stalle, frequentissimo (Guglielmo sopra Zone, Cigoletto). Luglio-Agosto.
- S. Doronicum* L. It. Senecione mezzano.
Sentieri del monte Catino verso la *Val di Paoer*, raro. Maggio-Agosto.
- S. incanus* L. It. Senecione ombrellato.
Somme vette delle Colombine e del Blennone, frequente. Luglio-Agosto.
- β . *carniolicus* Willd. Vette dei monti Vaja, frequentissimo.
- γ . *uniflorus* All. (1). Alpi di Vaja colla specie.
- S. nemorensis* L. It. Senecione silvano.
Selvette umide, margine dei torrentelli montani e subalpini, frequente (Dragone). Luglio-Settembre.
- β . *saracenicus* Auct. non l., Colla specie.
- γ . *ovatus* Willd. M. Conche.

(1) Ad sententiam Alluani libenter accedo, qui suum *S. uniflorum* varietatem monocephalum *S. incani* habuit; namque in montibus di *Vaja* tum varietas *glabrescens*, tum *uniflora* foliis superioribus linearibus integerrimis, caule 1-3 cephalo, 1-4 pollicari mihi frequentissime et promiscue occurrerunt.

S. Doria L. It. Erba Doria.

Lama di Bagnolo, poco frequente. Giugno-Luglio.

S. paludosus L. It. Senecio seghettato.

Paludi presso Sirmione, al Sebino presso la Fenice, lago d'Idro presso Anfo, lama di Bagnolo, frequentissimo. Giugno-Luglio.

Cultivansi per ornamento:

Dahlia purpurea Tuff. Br *Dalia* del Messico. Dall' ibridismo di questa e d'altre poche specie, pure del Messico, nacquero varietà notevolissime in numero indefinito.

Zinnia elegans Jacq. }
Z. verticillata L. } Br. *Zinia*, ambidue del Messico.

Compositae. Subordo II. Cynarocephalae.

Calendula L. Sist. Sex. Syng. Polyg. Necessaria.**C. arvensis L. It. Caltà selvatica, Fiorrancio selvatico.**

Campi e colli Benacesi, frequente (da Toscolano a Bogliasco lungo la via). Agosto-Settembre.

Cultivasi ad ornamento;

C. officinalis L. a fiori doppi. Dell'Italia meridionale.

Cirsium Tournef. Sist. Sex. Syngen. Polyg. Æqualis.**C. pannonicum Scop. (Cnicus pannonicus Host. Bertol.) It. Cardo serretta.**

Colli Margherita e Maddalena, frequente. Maggio-Luglio.

C. heterophyllum All. (Cnicus heterophyllum Willd. Bertol.) It. Cardo enulino.

Rivi dei pascoli prealpini, raro (Alpi di Vaja scendendo ai laghetti). Luglio-Agosto.

C. acaule All. (Cnicus acaulis Willd. Bertol.) It. Cameleone rosso.

Monte Guglielmo da Niida alla vetta, frequentiss. Agosto-Sett.

C. tuberosum All. (Cnicus tuberosus Willd.) It. Cardo tuberoso.

Pascoli dei monti sopra Limone, raro. Giugno-Luglio.

- C. rivulare* Koch. (*Cnicus montanus* Willd. Bertol. ?) It. Cardo branca orsina.
Rigagnoli occidentali del monte Ario, frequente. Luglio-Ag.
- C. eriophorum* Scop. (*Cnicus eriophorus* Willd. Bertol.) It. Cardo scardaccio.
Selvette dei colli e dei monti, frequente (Maddalena, Dragone). Luglio-Agosto.
- C. lanceolatum* Scop. (*Cnicus lanceolatus* Willd. Bert.) It. Cardo asinino. Br. *Cardo*, *Articiochi*
Strade e campi dal piano ai monti, frequentissimo. Giug-Ott.
- C. arvense* Scop. (*Cnicus arvensis* Smith. Bertol.) It. Artone, Scardiccione, Stoppine. Br. *Garzècc de cioss*, *Garzù*, *Srobiù*.
α. horridum Wimm. Da S. Colombano a Cornablaça.
β. mite Koch. | Campi del piano e dei colli
γ. integrifolium Koch. | frequentissimo.
- C. palustre* Scop. (*Cnicus palustris* Willd. Bert.) It. Cardo di palude.
Ai rivi montani e prealpini, frequente (Urago, Graticelle).
Luglio-Agosto.
β. floribus albis. Lungo la via da Desenzano a Venzago.
- C. Erisithales* Scop. (*C. Erisithale* L. Bert.) It. Cardo montano. Br. *Spinàss*.
Selvette montane e prealpine, frequente. Giugno-Luglio.
β. floribus purpureis. Vella del Dragone ad occidente.
- C. oleraceum* Scop. (*Cnicus oleraceus* L. Bert.) It. Cardo dei prati.
Prati turfosi montani, lame, risaje, raro. Giugno-Ottobre.
- spinosissimum* Scop. (*Cirsium spinosissimum* L. Bertol.) It. Cardo capitato.
Pascoli prealpini (vette dei monti Colombine, Desdàna, Maniva, Ario). Luglio-Agosto.
- β. spinosissimo* - *Erisitheles* Nagel. — Sul Dossoalto, ove abbonda il *C. Erisithales*, scarseggia il *C. spinosissimum*.

Si coltivano:

Cynara Scolymus L. It. Cardofo. Br. Articiòc.

C. Cardunculus L. It. Cardo. Br. Cardo, probabilmente indigeni dei litorali italiani.

Sylbium Gaertn. Sist. Sex. Syng. Polyg. Æqualis.

S. marianum Gaertn. (*Carduus marianus* L. Bert.) It. Cardo mariano, Cardo lattario.

Colle Maddalena presso le stalle, frequentissimo. Maggio-Giug.

Carduus L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Æqualis.

C. picrocephalus L. It. Cardo dei campi.

Ruderati, vie, frequentissimo. Maggio-Settembre.

C. defloratus L. It. Cardo dentellato.

α. *Summanus* Pollin. da Inzino al Guglielmo, raro. Giug.-Ag.

β. *transalpinus* Sut. } Colli a Magno, alle falde
γ. *alpestris* DC. } del Guglielmo, frequenti.

C. Personata Jacq. It. Personata.

Valletta Bertone sopra Caino, rarissimo. Giugno.

C. nutans L. It. Cardo rosso. Br. *Fiur de luff*, nome comune a tutti i *Cirsii* e *Cardi spinosi*.

Strade, colline, monti all' asciutto, frequentissimo. Ging.-Ag.

β. *montosus* Pollin. Presso Irma, e sul Dragone, frequente.

γ. *flore albo*. Colli a Cajonvico.

Onopordon L. Sist. Sex. Syng. Polyg. Æqualis.

O. Acanthium L. Acanzio, Spina bianca.

Ruderati della bassa provincia presso Acqualunga, Villachiera. Luglio.

Lappa Tournef. Sist. Sex. Syng. Polyg. Æqualis.

L. major Gaertn. (*Arctium Lappa* L. Bertol.) It. Bardana, Lappolone. Br. *Bonaghe*, *Bardàna*, *Prazüre*.

Ruderati, vie, campi anche montani, frequente. Luglio-Ag.

L. minor DC. (*Arctium Lappa* L. Bertol.) It. Lappolone. Br. *Bonaghe*, *Bardàna*, *Prazüre*.

Ruderati, vie, campi, specialmente nella bassa, frequentissima. Luglio-Agosto.

L. tomentosa Lam. (*Arctium Bardana* Willd. Bertol.) It. Lappola lanuta.

Monti tra Nozza e Comèro, rara. Luglio-Agosto.

Carlina L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Æqualis.

C. acaulis L. It. Carlina, Carlopinto. Br. *Carlina*, *Articiòc salvadeg.*

Colli, monti e prealpi, frequentissima. Luglio-Agosto.

C. vulgaris L. It. Carlina comune.

Luoghi sassosi, ed ericeti dei colli e dei monti, frequentissima. Luglio-Agosto.

β. longifolia Reich. Colli fra Virle e Botticino, rara.

Saussurea DC. Sist. Sex. Syng. Polyg. Æqualis.

S. discolor DC.

Depressioni fra le vette del monte Gazzo. Luglio-Agosto.

Serratula L. Sist. Sex. Syngenesia Polygamia Æqualis.

S. tinctoria L. It. Serretta, Serratula. Br. *Gialdina*, *Erba gialdina*.

Colli e monti all' aprico (Riviera, S. Gottardo, Camaldoli).
Luglio-Settembre.

S. Rhaponticum DC. (Centaurea Rhaponticum L. Bertol.)
(In Sist. Sex. Syng. Polyg. Frustranea) It. Centaurea
Rapontica.

Prealpi fin verso le vette (Vette del Guglielmo e del Fronden, falde del Cornablacca). Giugno-Luglio.

S. macrocephala Bertol. It. Serratula capocchiuta.

Un solo individuo sulla sponda destra del Mella, poco prima
del ponte di Roncadelle.

Meotrophillum Neck. Sist. Sex. Syng. Polyg. Æqualis.

K. lanatum DC. It. Attrattile, Cece prete.

Luoghi sterili dei colli e del piano sottoposto, frequente.
(Castello, via per Mompiano). Luglio-Agosto.

Il *Carthamus tinctorius* L., Br. *Asfor*, *Safranis*, è spontaneo
a Nizza ed in altre parti d' Italia.

Centaurea L. Sist. Sex. Syng. Polyg. Frustranea.

C. Iacèa + commutata Koch.

Risaje e lame presso Torbole, frequente. Luglio-Agosto.

C. alba L. (C. splendens Koch.) It. Centaurea cicalina.

Rupi da Cajonvico al Maddalena, rara. Giugno-Agosto.

- C. amara* L. It. Steccioni, Stoppioni.
Rupi e frane dei colli e dei monti, frequentissima (Costa-lunga). Luglio-Settembre.
- β. *foliis denso-arachnoideo-lanatis*. Colli aridi, insieme colla specie.
- γ. *caule abbreviato unifloro*. Vertici del Maddalena.
- C. nigrescens* L. It. Fioraliso grande, Fiore bordino. Br. *Faa goza*.
Prati, margini dei campi, luoghi erbosi, frequentissima. Giugno-Ottobre.
- β. *transalpina* Schleich. Lungo lo Strone prima di Pontevico.
- γ. *Candollei* Koch. Prati, colla specie.
- C. phrygia* L. It. Centaurea frangiata.
Pascoli rupestri prealpini frequentissima. Luglio-Agosto.
- C. nervosa* Willd. It. Centaurea zizzerina.
Pascoli prealpini, frequentissima (Fronden, Guglielmo, Brofione). Luglio-Settembre.
- C. austriaca* Willd. (*C. phrygia* β. Bertol.)
Vette e pascoli sottoposti al M. Dragone, Val di Marone. Luglio-Settembre.
- C. Cyanus* L. It. Fiordaliso, Battisècola. Br. *Balsarèza, Paradèi, Garofoli selèsc*.
Messi e campi, frequentissima. Maggio-Giugno.
- β. *floribus albis*. Qua e là colla specie, rarissima.
- C. montana* L. It. Centaurea montagnuola.
Selve e pascoli del Dragone, Guglielmo, Mufetto. Magg.-Lug.
- C. axillaris* Willd. (*C. montana* Bertol.)
Maddalena, e monti sopra Lumezzane, frequentiss. Giug.-Ag.
- B. *carniolica* Host. Monti sopra Caino, rara.
- C. paniculata* L. It. Centaurea pannocchiuta.
Colli e luoghi secchi del piano, frequentissima. Giugno-Ag.
- β. *floribus albis*. Colli fra Montechiaro e Carpenedolo, rara.
- C. maculosa* Koch. (*C. paniculata* β. Bertol.)
Margini del Mella a S. Giacomo e Roncadelle, rarissima.
- C. scabiosa* L. It. Centaurea vedovina.
α. *foliis capitulisque glabris*. Colle Badia, frequente. Giug.-Lug.

β. foliis capitulisque lanatis. Seriola tra Ponte S. Marco e Calcinato.

γ. floribus candidis. Colli fra Montechiaro e Carpenedolo, rara.

C. solstitialis L. It. Calcatreppola, Cardo stellato. Br. *Ensalata d' azen.*

Ruderati, vie, frane dei colli, frequentissima. Luglio-Agosto.

C. Calcitrapa L. It. Calcatreppola, Cardo riccio. Br. *Spi d' azen.*

Luoghi sabbiosi, vie, ruderati, frequentissima. Luglio-Agosto.

Crupina Person. Sist. Sex. Syng. Polyg. Frustranea.

C. vulgaris Pers. (Centaurea Crupina L.) It. Crupina.

Qua e là fra le messi a Pozzolengo, rara. Giugno-Luglio.

Xeranthemum L. Sist. Sex. Syng. Polyg. Superflua.

X. cylindraceum Sibth. et Smith. It. Perpetuini piccoli.

Colli aridi, poco frequente (Riviera Benacese). Luglio-Ag.

Compositae. Subordo III. Cichoreaceae.

Lapsana L. Sist. Sex. Syng. Polyg. Aequalis.

L. communis L. It. Cavolo selvatico, Erba sarda.

Margini dei campi e dei ruscelli, orti, vigne, frequentissima.

Maggio-Ottobre.

Rhagadiolus Tourn. Sist. Sex. ut supra.

R. stellatus Willd. It. Erba cornetta, Piè d' uccello.

Fra le messi a Poncarale, raro Aprile-Maggio.

Cichorium L. Sist. Sex. ut supra.

C. Intybus L. It. Cicoria, Radicchio. Br. *Redècc salvadeg.*

Campi, vie, ruderati, frequentissimo. Coltivasi comunemente.

Luglio-Ottobre.

Coltivasi per alimento:

C. Endivia L. It. Endivia. Br. *Endivia*. Vuolsi originaria dell' Indie orientali. Luglio-Agosto.

Hyòseris L. Sist. Sex. ut supra.

H. foetida L. (Apòseris foetida Koch.) It. Lucertolina fetente.

Selvette e terreni asciutti dal piano al monte, frequente.

Aprile-Maggio.

Thrincla Roth. Sist. Sex. ut supra.

T. hirta Roth. It. Trinciatella pratajuola.

Margini dei fossi a Sirmione, lame, prati montani, frequente.
Giugno-Settembre.

Leontodon L. Sist. Sex. ut supra.

L. Taraxaci Lois (Apargia Taraxaci Willd. Bert.) It. Radicchiella pisciacane.

Vette dei Monti Guglielmo e Vaja, frequente. Luglio-Agosto.

L. autumnalis L. (Apargia autumnalis Willd. Bertol.) It. Radicchiella tardiva.

Prati principalmente dei colli e dei monti (Mompiano, Quaronone). Settembre.

L. pyrenaxicus Gouan. (Apargia alpina Willd. Bertol.) It. Pisciacane squamelloso.

Vette delle Colombine, del Desdana e del Rondenino, frequente. Luglio-Agosto.

β. aurantiacus Koch (Apargia aurantiaca Willd. Bertol.)

Vette delle Colombine, raro.

L. hastilis L. (Apargia hispida Willd. Bert.) It. Radicchiella. Br. *Redecine*.

α. vulgaris Koch (Apargia hispida L. Bertol.). Prati asciutti.

β. glabralus Koch (A. hispida *β.* Bertol.). Prati stabili del piano e dei colli, frequentissima. Agosto-Ottobre.

γ. opimus Koch. Val di Marone in luoghi secchi, raro.

L. incanus Schrank. (A. incana Scop. Bertol.) It. Radicchiella cotonosa.

Rupi del Guglielmo scendendo a Pezzaze, frequente. Lug.-Ag.

L. crispus Viliars. (A. hastilis Willd. Bertol.) It. Radicchiella crespata.

Monte Orfano a Rovato, ferrovia sotto Brescia. Maggio-Ag.

Pteris L. Sist. Sex. ut supra.

P. hieracioides L. It. Lattajuola pungente.

Strade, ruderali, alveo dei fiumi, siepi, frequentissima. Maggio-Settembre.

β. Umbellata M. ab E. Nel Cimitero civico.

Tragopogon L. Sist. Sex. Syng. Polyg. *Aequalis*.

T. pratense L. It. Barba di becco, Sassefrica. Br. *Barba de bec*.

Prati e luoghi erbosi del piano e dei colli, frequentissimo.
Aprile-Maggio.

T. floccosum Vald. e Kit. It. Sassefrica cotonosa.

Margini dei campi presso S. Eufemia, rarissimo. Maggio-Giug.

T. majus Lamk. It. Sassefrica a tromba. Br. *Barba de bec*.

Adiacenze della ferrovia da Brescia a S. Eufemia. Aprile-Maggio (1).

Scorzonera L. Sist. Sex. ut supra.

S. austriaca Willd. It. Scorzonera barbata.

Colli a Saib, frequente. Aprile-Maggio.

β. *angustifolia* Rehb. Rupi a Nave, Caino, S. Eusebio.

S. humilis L. It. Castracane, Scorzonera.

Pascoli umidi al lago d'Idro, rara. Giugno-Luglio.

S. villosa Scop. It. Scorzonera spinolosa.

Pascoli dei colli presso Pozzoliengo, rara. Maggio-Giugno.

S. purpurea L. It. Scorzonera porporina.

Pascoli prealpini, frequente (Val di Marone, Monte Ciglio). Giugno-Luglio.

β. *caule simplicis*. Negli stessi luoghi della specie.

La *S. austriaca*, e la *S. hispanica*, Br. *Scorzonera*, si coillano qua e là per la radice mangiabile.

Hypochaeris L. Sist. Sex. ut supra.

H. maculata L. It. Porcellina macchiata.

Colli di S. Gottardo e d'Urago Mella, frequente. Giugno-Ag.

H. uniflora Vill. It. Porcellina ispida.

Monte Guglielmo rara; vette delle Colombine frequente, Giugno-Agosto.

H. radicata L. It. Porcellina giuncolina.

(1) *Tragopogonis majoris* col'egi specimen monstruosum, in quo pappi radii facti sunt crassiores et fere herbacei; semidosculi albo scariosi, ac tamen fertiles.

Pascoli sterili dei colli e dei monti, frequente (Colli di Capriano). Giugno-Settembre.

H. glabra L. It. Porcellina liscia.

Pascoli ombrosi sopra Graticelle.

Taraxacum Luss. Sist. Sex. ut supra.

T. officinale Wigg. (Leontodon Taraxacum L. Bert.) It.

Piscialetto, Dente di cane, Pisciacane, Soffione. Br.

Sicoria, Car de fe, Uciù.

Campi, orti, strade, muri ovunque, frequentissimo. Apr.-Nov.
β. glaucescens M. Bieb. Terreni arenosi.

γ. alpinum Hoppe. Monti Colombine e Desduna, frequente.
Luglio-Agosto.

T. palustre DC. It. Pisciacane di palude.

Acque stagnanti da Sirmione a Pozzolengo, torbiera a Torbiato, frequente. Febbraio-Maggio.

Chondrilla L. Sist. Sex. ut supra.

C. juncea L. It. Lattugaccio, Pincheri da latte.

Margini delle strade e dei fiumi, luoghi arenosi, frequentissima. Giugno-Settembre.

Prenanthes L. Sist. Sex. ut supra.

P. muralis L. (Lactuca muralis DC. Bert. Koch.) It. Crespigna dolce.

Siepi, terreni e muri umidi, frequente (alla Garzetta presso la ferrovia). Giugno-Settembre.

P. purpurea L. It. Lattuca montana.

Colli a S. Vigilio; monti Maddalena, Dragone, Mufetto, frequente. Luglio-Agosto.

P. tenuifolia L. It. Lattuca sottile

Boschetti a Conche, rara. Luglio-Agosto.

Lactuca L. Sist. Sex. ut supra.

L. virosa L. It. Cavolaccio, Lattuca velenosa.

Colli sopra Mazzano e Virle, rarissima. Luglio-Settembre.

L. Scariola L. It. Scariola, Lattuca selvatica.

Rupi, margini dei campi, luoghi secchi, frequente. Lug.-Ott.

L. saligna L. It. Lattuca salcigna.

Margini secchi dei campi e delle vie, ruderali, ghiaie, frequente. Luglio-Settembre.

β. foliis levibus. Ferrovia da Brescia al Mella.

L. perennis L. It. Latnga montana.

Luoghi rupestri dei colli e dei monti, frequente. (S. Eusebio, S. Eufemia). Maggio-Luglio.

Coltivasi:

L. sativa L. di patria ignota. Principali varietà sono:

L. S. capitata. Br. *Latüga 'ngabüzada*.

" *crispa* Br. *Latüga 'nressolada*.

" *romana* Br. *Latüga romana*.

" *vinacea* Br. *Latüga 'mbreagada*.

Sonchus L. Sist. Sex. ut supra.

S. alpinus L. (*Mulgedium alpinum* Koch.) It. Cicerbita azzurra.

Selve del monte Maniva, e alla *Malghetta* presso il Blennone. Luglio-Agosto.

S. palustris L. It. Crespigno di palude. Br. *Grispignæla*.

Lame nella bassa provincia, raro (Scòvola, Bissa). Giugno.

S. oleraceus L. It. Cicerbita liscia. Br. *Garzècc de rie*.

Vie, muri, orti, campi, frequentissimo. Aprile-Settembre.

β. *rupeinatus* Koch. Colla specie.

γ. *lacerus* Wallr. Colla specie.

S. asper Vill. It. Cicerbita spinosa. Br. *Latüga salvadega*, *Soncù*, *Grispignæla*.

Nelle stesse località del precedente. Maggio-Settembre.

S. arvensis L. It. Crespigno de' campi.

Campi umidi, raro (presso Flero, o lungo lo Strone a Verolanuova). Luglio-Settembre.

Barkhausia Moench. Sist. Sex. ut supra.

B. foetida DC. (*Crepis foetida* L. Koch.) It. Radicchiella mandorlina.

Margini secchi dei campi e delle vie, frequentissima. Giugno-Luglio.

B. setosa DC. (*Crepis setosa* Haller, Koch.) It. Radicchiella setolosa.

Margini dei campi, e luoghi sterili, frequente. Giugno-Sett.

- B. taraxacifolia** DC. (*B. hyemalis* x. Bertol. *Crepis taraxacifolia* Th. Koch.) It. Radicchiella primaticcia.

Prati ad Orzinuovi, rara. Aprile-Maggio.

- B. alpina** DC. (*Crepis alpina* L. Koch.) It. Radicchiella d'alpe.

Versante occidentale del Dosso alto, lungo un sentiero di traverso. Giugno-Luglio.

- B. vesicaria** Ten. (*B. scariosa* DC. Bertol. *Crepis vesicaria* Koch.) It. Radicchiella scotellata.

Colli presso Venzago, rarissima. Aprile-Maggio.

Crepis L. Sist. Sex. ut supra.

- C. pulchra** L. It. Erba dolce.

Margini, ruderali, luoghi incolti (Capriano, Val di Marone). Maggio-Giugno.

β. foliis glanduloso-viscosis. Ferrovia presso Brescia, campi al sud del Benaco.

- C. tectorum** L. (*C. tectorum* et *C. virens* Koch) It. Radicchiella pratajola.

Margini dei campi e dei fossi; prati montani, frequentissima. Giugno-Agosto.

β. glandulifera. Prati a Pezzoro.

- C. biennis** Koch. It. Radicchiella silvestre.

Prati e pascoli umidi dal piano ai monti, frequente. Maggio-Giugno.

- C. alpestris** Tausch. (*Hieracium alpestre* Jacq. Bertol.) It. Geracio semplice.

Vette delle Colombine, frequente. Luglio-Agosto.

- C. grandiflora** DC. (*Hieracium grandiflorum* DC. Bertol.) It. Geracio astato.

Pascoli presso *Cruz Domini*, rarissima. Luglio-Agosto.

- C. paludosa** Mœnch. (*Hieracium paludosum* L. Bertol.) It. Geracio liscio.

Lama del Chiodo, rara. Luglio-Agosto.

- C. Jaquinii** Koch (*Hieracium chondrilloides* L. Bert.) It. Geracio lacinioso.

Dorso orientale del M. Gazzo scendente al lago, rara. Luglio-Agosto.

C. blattarioides Vill. (*Hieracium blattarioides* L. Bert.)
It. Geracio a saetta.

Monte Guglielmo sopra Zone, raro. Luglio-Agosto.

C. præmorsa Tausch. (*Hieracium præmorsum* L. Bert.)
It. Pelosella caugiante.

Monte Dragone, Val di Marone e di Lumezzane, frequentissima. Maggio-Giugno.

β. *incarnata* Koch. Vette dell'alpe di Vaja.

C. succisæfolia β. Koch. (*Hieracium succisæfolium* All. Bertol.). It. Geracio vedovella.

Monte Cigoletto verso le *Crocette*, frequente. Luglio-Agosto.

C. aurea Tausch. (*Hieracium aureum* Scop. Bert.) It. Radicchiella ranciata.

Rupi delle Colombine presso *Ravénola vaga*, rara. Luglio-Ag.

C. vesicaria L. It. Radicchiella gonfiata.

Colli della Riviera Benacese, rara (Raffa, Manerba). Maggio-Giugno.

Hieracium L. Sist. Sex. ut supra.

H. pilosella L. It. Orecchio di topo, Pelosella. Br. *Pelozella*.
Declivi secchi del piano; colli, monti, frequentissima. Marzo-Giugno.

β. *farinaceum* Koch. Dorso meridionale delle Colombine.

γ. *pilosissimum* Koch. Declivi aprici del Guglielmo.

δ. *grandiflorum* Koch. Vette delle Colombine e dell'alpe di Vaja.

H. pilosellæforme Sturm. (*H. macranthum* β. Bertol.)
It. Pelosella maggiore.

Rupi a destra del sentiero da S. Colombano al Giogo, raro. Luglio-Agosto.

H. brachiatum Bert. (*H. bifurcum* Koch?) It. Pelosella gambuta.

Luoghi asciutti al sud del colle di Capriano; monti Arlo e Cornabla, raro. Maggio-Luglio.

H. angustifolium Hopp. (*H. auricola* Bert.) It. Pelosella orecchietta.

- Vette dei monti Colombine e Desdana. Luglio-Agosto.
 β . foliis subius tomentoso-albicantibus. Frequente colla specie.
H. dubium L. (*H. auricola* Koch) It. Pelosella lattughina.
 Vette del Guglielmo; pendio occidentale della Badia, frequentissimo. Maggio-Agosto.
 β . stolonibus pluribus adscendentibus gracilibus, apice unifloris.
 Margine della ferrovia a Palazzolo.
H. florentinum Willd (*H. piloselloides*, et *H. præaltum* Koch.) It. Pelosella pratajuola.
 Colli, letto dei torrenti, muri, frequentissimo. Maggio-Luglio.
 β . stolonibus adscendentibus florigeris (*H. fallax* Gand.). Al-
 l'ovesi della Badia.
H. aurantiacum L. It. Jeracio Sussi, Pelosella ramosa.
 M. Cigoletto alle *Pofe di Stabile solato*; monte Dragone. Giugno-Luglio.
H. sabinum Sebast. It. Pelosella irsuta.
 Pascoli prealpini, frequente. (Dosso alto, Cornablaeca). Giugno-Luglio.
H. staticifolium All. It. Geracio livido.
 Rupi delle prealpi, raro. (Alpi di Vaja). Luglio-Agosto.
H. porrifolium L. It. Geracio porrine.
 Luoghi rupestri del Guglielmo da *Magno a Caregn*. Lug.-Sett.
H. glaucum All. It. Geracio verdemare.
 Muri, argini ed alvei dei fiumi del piano, rupi dei monti.
 Giugno-Settembre.
H. villosum L. It. Geracio barbuto.
 Cresse del Guglielmo, frequente. Monte Catino, monte Brof-
 fione alle *Cornette*. Luglio-Agosto.
H. alpinum L. (*H. alpinum* et *Schruderi* Koch) It. Radicchiella irsuta.
 Vette delle Colombine fino alle rupi di Desdana, M. Cigoletto,
 Mufetto, Fronden. Luglio-Agosto.
 β . glanduliferum Sturm. Koch. Frequente colla specie.
 γ . Hälleri Vill. (*H. alpinum* γ Koch.). Colombine colla specie, frequente.
H. murorum L. It. Geracio silvano.

Monti, colli e piani sottoposti, nelle rupi e sui muri, frequentissimo. Maggio-Agosto.

β. lasiophyllum Koch. Colla specie fra le rupi al secco.

H. vulgatum Koch. It. Geracio volgare.

Colline di Poncarale, frequente. Giugno-Luglio.

H. sylvaticum Willd. Bert. It. Geracio tardivo.

Colli a Lumezzane e a Nozza. Agosto-Ottobre.

H. Tacquinii Vill. It. Geracio sassajuolo.

Monte Campo scendendo a Lavenone, raro. Giugno-Agosto.

H. amplexicaule L. It. Geracio viscoso.

Da Zone alle vette del Guglielmo, frequentissimo. Lugl.-Ag.

β. pulmonarioides Will. (foliis ramealibus lanceolatis). Colla specie.

H. albidum Koch. (*H. intybaceum* Willd. Bertol.) It. Geracio viscido.

Da Collio alla vetta delle Colombine, frequentissimo. Declivio settentrionale del Mufetto; rupi di Frönden e del Cigoletto. Luglio-Agosto.

H. prenanthoides Vill. It. Geracio lattugaccio.

Declivio occidentale del monte Gazzo, frequente. Luglio-Ag.

H. sabaudum L. Bertol. *β.* It. Geracio autunnale.

Colli e piano sottoposto, frequentissimo. (Costalunga, Nave, Capriano). Settembre-Ottobre.

H. boreale Fries (*H. sabaudum* L. Bertol.) It. Geracio lanceolato.

Da S. Eusebio al Dragone, frequentissimo. Agosto-Ottobre.

H. umbellatum L. It. Geracio ombrellato.

Colli di Prada e di Costalunga, frequente. Agosto-Ottobre.

H. Lactaris Bert. (*H. umbellati* variet. Koch.) It. Geracio lattajuolo.

Colli e campi adjacenti, frequentissimo (Costalunga, Desenzano, Lonato). Agosto-Ottobre.

ORDO LXIV. AMBROSIACEÆ.

Xanthium L. Sist. Sex. Monœcia Pentandria.

- X. strumarium L. It. Bardana minore, strappa lana. Br.
Tira caèi, Bardana minura, Bulighi.

Luoghi incolti e sterili del piano, frequentissimo. Giug.-lugl.

- X. macrocarpum DC. (X. italicum Moretti) It. Lappolone grande. Br. *Tira caèi, Bulighi.*

Campi sabbiosi e lungo i fiumi della bassa (Pontevico all'Oglio e allo Strone, abbondante). Luglio-Settembre.

- X. spinosum L. It. Lappole piccole, strappa lana. Br.
Tira caèi.

Al Chiese presso Goglione, raro. Luglio-Ottobre.

ORDO LXV. CAMPANULACEÆ.

Jasione L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

- J. montana L. It. Vedovelle celesti.

Cespugli dei colli aprici, frequente (Urago, Monticelli, Montebiano). Giugno-Ottobre.

Phytènna L. Sist. Sex. ut supra.

- Ph. pauciflorum L. It. Raponzolo spatolino.

M. Gazzo pendio al Benaco, rarissimo. Luglio-Agosto.

- Ph. emisphæricum L. It. Raponzolo gramignola.

Vette delle Colombine e del Mufetto, frequente. Luglio-Ag.

- Ph. humile Schleich. It. Raponzolo caricino.

Pendio meridionale del Blennone, raro. Luglio-Agosto.

- Ph. orbiculare L. It. Raponzolo montano.

Subalpi, frequentissimo (Dragone, Guglielmo, Cornabla, Colombine). Maggio-Luglio.

- Ph. Scheuchzeri Willd. It. Raponzolo cornuto.

Rive del Mella sopra S. Giacomo; colli-ombrosi, frequente. Giugno-Agosto.

β. Charmelii Vill. Monte Quarone scendendo al Mella.

- Ph. Michellii Bertol. It. Raponzolo di selva.

Maddalena al *Buren*, colli di Provaglio, e prealpi, frequentissimo. Luglio-Agosto.

β. betonicaefolium Vill. sul Maddalena colla specie.

Ph. Hålleri All. It. Raponzolo coda di volpe.

Monti e subalpi frequente. (S. Onorio, Conche, Pezzaze).
Giugno-Luglio.

β. nigrum Schmidt. Selvette a S. Vigilio sulla sponda del Mella.

Ph. comosum L. It. Raponzolo chiomoso.

Rupi prealpine, frequente (Monti Pajo, Frondeq, Cornablaeca).
Luglio-Agosto.

Campanula L. Sist. Sex. ut supra.

C. rotundifolia L. (C. rotundifolia, C. caespitosa et C. pusilla Koch (1)) It. Campanula soldanella.

Luoghi secchi, rupi de' colli e monti, frequentiss. Mag.-Sett.

C. linifolia *β.* Bertol. (C. Scheuchzèri Koch.) It. Campanella ginestrina.

Monte Guglielmo da Niddi salendo alle vetto, rara. Lug.-Ag.

C. elatinoides Moret. (non C. Elatines Koch.) It Campanella cotonosa.

Rupi lungo il Sebino a Tavernola, Marone, Vello, Guglielmo
a Costaricca, frequentissima, Luglio-Agosto.

C. Elatines L. Bert. Koch (2).

Muraglione di soslegno a mezzodi del piazzale sul M. Maddal.

C. Rainerii Lena Perpentì It. Campanella dell' arciduca.

Val di Paver per salire al Blennone; Cornablaeca. Lug.-Ag.

C. pyramidalis L. It. Campanula piramidale.

M. Conche salendo al santuario, rara. Agosto-Settembre.

(1) Collegi specimens cum foliis radicalibus fasciculisque sterilibus, praesertim in valle di Marone ad Guglielmom montem, in quibus uno eodemque individuo extant omnes ocae quibus Kochius distinguit tum *Campanulam rotundifoliam* cum varietalibus, tum *caespitosam* et *pusillam*.

(2) Haec Campanulae forms tomento quidem recedit ad C. Elatinoidem, sed habita multo minori, ramens laxiusculis, calyce emisphaerico, lacialisque basi saepe, non semper, sigostatis, videtur convenire cum C. Elatine, qualem Bertolaeus describit; foliis tamen obtusis, nec scuminatis a Kochians descriptione recedit. Quapropter *Cesati* scoteotiam libenter sequor, qui alteram alterius varietatem affirmat.

- C. persicifolia* L. It. Campanella. Br. *Campanèle*.
Colli suburbani (Costalunga, S. Gottardo), frequentissima,
Val di Gardone. Luglio-Ottobre.
- C. rhomboidalis* L. It. Raponzolo romboidale.
Monti sopra Lumezzane al *Dosso Galera*. Giugno-Agosto.
- C. Rapunculus* L. It. Raponzolo. Br. *Rapònzol*.
Tutti i colli in luoghi asciutti, frequentissima. Maggio-Glug.
 β . *foliis caulinis integerrimis*. Colle di Capriano, frequentiss.
- C. patula* L. It. Rapònzolo minore.
Val di Marone fluo alle vette; colli al Benaco, frequente.
Giugno-Ottobre.
- C. rapunculoides* L. It. Campanella serpeggiante.
Valletta da Virle a Botticino, frequente. Agosto-Settembre.
- C. bononiensis* L. It. Raponzolo di Bologna.
Ronchi suburbani, rara (S. Francesco). Luglio-Settembre.
- C. glomerata* L. It. Campanelle a capolino.
Tutti i colli anche suburbani, frequentissima. Luglio-Agosto.
 β . *elliptica* Kit. Colli di Monticelli e di Provaglio.
 γ . *aggregata* Willd. Colla specie sopra Zone.
- C. Cervicaria* L. It. Campanella ruvida.
Monti a sinistra della via da Bovegno a Collio, rara. Lu-
glio-Agosto.
- C. petræa* L. It. Campanella rupina.
Rupl del monte Gazzo quasi alla vetta. Luglio-Agosto.
- C. latifolia* L. It. Campanone.
Selve di Collio alle Zerle (Zant.). Luglio-Agosto.
- C. Trachelium* L. It. Imbutini. Br. *Campanèle*.
Piano e monti ai fossi e nel cespugli, frequentissima. Lu-
glio-Ottobre.
 β . *dasycarpa* Koch. Colla specie presso i fossi.
 γ . *racemosa* (1). Colli a Monticelli Brusati.
 δ . *denticulata* (2). Monti sopra Pezzòro.

(1) *Folliis* *floribus* *parvis* *bractææformibus*; et ideo *floribus* *subracemosis*.

(2) *Folliis* *marginè* *inæquali*, *vix* *denticulato*.

C. thyrsoides L. It. Campanelle gialle.

In una valletta del monte Vaja scendente al laghetto. Luglio.

C. spicata L. It. Raponzolo spigato.

M. Maddalena poco sopra la Margherita. Giugno-Agosto.

C. sibirica L. It. Campanella orecchiuta.

Colli secchi alla Badia a S. Eufemia, frequentissima. Campagna di Montechiaro, colli Benacesi, frequente. Apr.-Giug.

C. barbata L. It. Campanella barbata.

Pascoli sterili montani e subalpini, frequentissima. Lug.-Sett.

Specularia Heister. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

S. Speculum DC. (*Campanula speculum* L. Bertol.). It.

Billeri rossi, Specchio di Venere. Br. *Cantagai*.

Luoghi erbosi e fra le messi ovunque, frequentissima. Maggio-Ottobre.

♂. floribus albis. Qua e là colla specie, rarissima.

ORDO LXVI. VACCINIEÆ.

Vaccinium L. Sist. Sex. Octandria Monogynia.

V. Myrtillus L. It. Baggioioli, Mirtillo. Br. *Glizù, Siziæi*.

Maddalena, Quarone e tutte le prealpi, frequentissimo. Maggio-Giugno (4).

V. uliginosum L. It. Baggioiolo bianco. Br. *Glizù, Siziæi*.

Luoghi umidi dei monti e delle prealpi (Guglielmo, Mufetto). Maggio-Giugno. *

V. Vitis-Idæa L. It. Vigna d'orzo, Vite di monte. Br.

Glizù ross, Martili.

Dorso meridionale del Mufetto fra le rupi erbose, frequente.

Giugno-Luglio.

ORDO LXVII. ERICINÆ.

Arctostaphylos Adans. Sist. Sex. Decandria Monogyn.

A. Uva-ursi Spreng. (*A. officinalis* Koch. *Arbutus Uva-ursi*

L. Bert.) It. Uva orsina. Br. *Siziæi salvadeg*.

(4) Varietatem basels perfecte maturis albo-virentibus vidi promiscue cum specie in collibus bergomensibus; quem bæccarum colorem nullus auctor notat.

Boschetti dei colli, dei monti e delle prealpi, frequente.

(Colli a Provezze, a Provaglio, Maddalena al Buren; monti Guglielmo, di Lumezzane, di Tremosine). Aprile-Maggio.

A. alpina Spreng. (*Arbutus alpina* L. Bertol.) It. Rosello alpino.

Dorso settentrionale del monte Rondenino fra le rupi. Maggio-Giugno.

Calluna Salisb. Sist. Sex. Octandria Monogynia.

C. vulgaris Smith. It. Erica, Scope piccole. Br. *Brüc.*

Colli e monti in terreni magri a tramontana, frequentissima. Agosto-Novembre.

β. *floribus carneis*. Di raro, colla specie.

Erica L. Sist. Sex. Octandria Monogynia.

E. carnea L. It. Scopina. Br. *Fam, Regogna.*

Rupi delle valli Trompia o Sabbia, frequente (Caino, Rocca d'Anfo). febbrajo-Marzo.

E. arborea L. It. Scopa da bachi. Br. *Garnère, Ginestre.*

Colli ad Urigo, Collebeato, Provezze, abbondantiss. Apr.-Mag. Della radice, detta comunemente *Rádica*, si fanno rosarii, iabacchiere, vasi da pippa.

Azalèa L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

A. procumbens L. It. Azalèa bosso alpino.

Rupi delle prealpi, frequente. (Vette del Cigoletto e delle Colombine). Luglio-Agosto.

Dall'*A. indica* dell' India Orientale, e dall'*A. pontica* dell' Asia Minore derivano quasi tutte le varietà coltivate nei giardini.

Rhododendron L. Sist. Sex. Decandria Monogynia..

R. ferrugineum L. It. Rododendro, Rosa d'alpe. Br. *Mordène, Scórsoi.*

Tutte le prealpi, frequentissimo. Giugno-Settembre.

β. *flore albo* Monte Cigoletto colla specie, rarissimo.

R. hirsutum L. It. Rododendro peloso. Br. *Mordène peluse.*

Monte Guglielmo oltre Niidi; monti Vezegno, Pesseda, Cigoletto. Luglio-Settembre.

R. Chamæcistus L. It. Rododendro cistino.

Rupi dell' alpe di Vaja quasi alle vette, raro. Luglio-Agosto.

ORDO LXVIII. PYROLACEÆ.

Pyrola L. Sist. Sex. Decandria Monogynia.

P. uniflora L. It. Piroletta soldanina.

Cascine di Pesseda vicino al monte Cornablaça. Giugno-Lug.

P. secunda L. It. Ambrosia montana.

Monti sovrastanti all'alta Riviera, frequente. Giugno-Luglio.

P. minor L. It. Limonio montano minore.

Monte Vezegno, rara Giugno-Luglio.

β. *floribus niveis*. Boschi alle falde dell'Arlo, frequente. Luglio-Agosto.

P. rotundifolia L. It. Limonio montano.

Boschetti del monte Conche al sud, rara. Giugno-Luglio.

ORDO LXIX. MONOTROPEÆ.

Monotropa L. Sist. Decandria Monogynia.

M. Hypopitys L. It. Ipopilide.

Sotto i faggi e gli abeti tra le foglie secche, rara. Giug.-Lug.

SUBCLASSIS III. COROLLIFLORÆ.

ORDO LXX. EBENACEÆ.

Diospyros L. Sist. Sex. Octandria Monogynia.

D. Lotus L. (species Polygama) It. Guajaco falso, Loto falso. Br. *Pom Sant*.

Albero coltivato pel legno bruno e pel frutto. Trovasi qua e là rarissimo in virgulti sui colli di Venzagò e della Riviera. Non pare il Loto, ond' ebbero nome i Lotofagi.

Il *D. Ebenum* L. It. e Br. *Èbano* cresce nelle Indie Orientali e nell'Africa.

Lo *Stirax officinale* L. It. e Br. *Stirace* è della Siria e dell'Italia.

Seguirebbe la famiglia delle *Sapoteæ*, a cui appartienè la specie *Isonandra Gutta* Montgom. alberetto di Singapour, dal quale stilla la *Gutta perca*.

ORDO LXXI. AQUIFOLIACEÆ.

Ilex L. Sist. Sex. Tetrandria Tetragnia.

I. Aquifolium L. It. Agrifoglio, Leccio spinoso. Br. Scamfòi, Pamfòi.

Selve montane e prealpine, frequente. (Maddalena, Nave).

Aprile-Maggio.

ORDO LXXII. OLEACEÆ.

Coltivasi:

Olea L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.O. europea L. It. Oleastro, Olivastro selvatico, Olivo coltivato, Br. *Olìa*.

Indigeno delle isole italiane: coltivato sui Ronchi, nella Riviera del Sebino, e a larga mano nella benacese.

Phillyrèa L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.Ph. Latifolia L. It. Fillirèa, Lillatro. Br. *Bagatì*.

Qua e là lungo la Riviera benacese, rara. Aprile-Maggio.

Ligustrum L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.L. vulgare L. It. Ligustro, Olivetto. Br. *Cambròssol*, *Cambròssèn*.

Siepi e selvette dal piano ai colli elevati, frequentissimo.

Aprile-Maggio.

Fraxinus L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.F. excelsior. L. It. Frassino. Br. *Œza*.

Lungo il Melia, e nelle selve montane, poco frequente.

Aprile-Maggio.

F. Ornus L. It. Orno, Avorniello. Br. *Fràssen*.

Campi, siepi, muri, selve dal piano ai monti, frequentissimo.

Aprile-Maggio.

Nella bassa Italia dalle foglie stilla la *Manna*.

Coltivasi per ornamento:

Syringa vulgaris L. Br. *Lila*, *Sicomoro*, orig. dell'Asia.

ORDO LXXIII. IASMINEÆ.

Jasminum L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.I. officinale L. It. Gelsomino. Br. *Gæsmine*.

Benchè indigeno dell'Indie orientali, propagasi però spontaneamente nei luoghi ben esposti a mezzodi, e abbondantemente nelle siepi e sui muriccioli della Riviera benenese: ma di raro ne maturano le bacche.

ORDO LXXIV. ASCLEPIADÆÆ.

Cynanchum L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.C. Vincetoxicum Pers. It. Asclepiade, Vincitossico. Br. *Porselana*.

Siepi e dumeti, frequentissima. Maggio-Settembre.

β. caule valde elongato volubili. Siepi a occidente del colle della Badia.

ORDO LXXV. APOCINÆÆ.

Vinca L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.V. minor L. It. Vinca; Pervinca. Br. *Fiur de mort*, *Corniaela*, *Erba martilina*.

Siepi e luoghi erbosi del piano e dei colli, frequentissima, febbrajo-Settembre.

V. major L. It. Vinca, Fior di morto. Br. *Fiur de mort*, *Corniaela*.

Declivio appiè dei colli poco oltre la *Bornada*, rara. Apr.-Mag.

Nerium L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.N. Oleander L. It. Leandro, Lauro rosa. Br. *Leander salvadeg*.

... Spontaneo del litorale Mediterraneo, e della Riviera benenese a Limone, Campione, Salò, Moniga ecc. Luglio-Sett.

Coltivasi per la bellezza e soavità dei fiori:

N. Odorum L. It. e Br. *Leandro* dell' India orientale, a fiori doppi e a fiori bianchi.

Lo *Strychnos Nux-vomica* L. Br. *Nus vomica* cresce nel Malabar, e nel Ceylan.

ORDO LXXVI. GENTIANEE.

Menyanthes L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

M. trifoliata L. It. Trifoglio fibrino. Br. *Tresfői fñri*.

Lama Scovola nei fossi, rara. Aprile-Maggio.

Villarsia R. Brown. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

V. nymphoides Röm. et Schult. (*Limnanthëum nymphoides* Koch). It. Limantemo.

Lama la Bissa e risaje, rara. Giugno-Luglio.

Chlora L. Sist. Sex. Octandria Monogynia.

C. perfoliata L. It. Centaurèa gialla.

Colli aprici, frequentissima (Bovezzo, Desenzano, Mella).
Luglio-Agosto.

β. serotina Koch.

γ. acuminata Rehb.

} Luoghi umidi tra Rivoltella
e Sirmione.

Erythraea Rencalm. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

E. Centaurium Pers. It. Centaurèa minore. Br. *Erba per la fèer*, *Piloti*, *Erba china*.

Colline e bassi monti, frequentissima. Giugno-Settembre.

β. pulchella Hook. Luoghi magri ed umidi al sud del Benaco.

γ. depauperata-caule exili, humili, 1-3 floro. — Luoghi umidi, rara.

E. spicata Pers. It. Biondella spigata

Luoghi aridi sotto Pozzolengo, rara. Luglio-Settembre.

Gentiana L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

G. ciliata L. It. Gentianella sfrangiata.

Pascoli dai colli alle prealpi, frequente (Maddalena, Quaron) Agosto-Ottobre.

β. foliis internodio brevioribus. Qua e là colla specie.

G. amarella L. It. Amarella.

Prati montani e prealpini, frequente. (Monte Guglielmo da Nida alle vette, monte Calino). Giugno-Settembre.

β. germanica Willd. (1). M. Catino.

γ. uliginosa Willd. (2). Colla specie in luoghi umidi.

δ. obtusifolia Willd. (3). Alpi di Vaja.

G. verna L. It. Genzianella primaticcia. Br. *Ansianela*.

Dorso merid. del Guglielmo, monte Pessedà, frequente. Maggio-Luglio.

β. brachyphylla Vill. Alpi di Vaja, più frequente della specie.

γ. æstiva Röm. Monte Guglielmo colla specie all'asciutto.

G. bavarica L. It. Genzianella tardiva. Br. *Ansianela*.

Pascoli alle vette del monte Calino. Luglio-Agosto.

G. utriculosa L. It. Pettimborsa alata.

Monte Conche presso il Santuario; monte Dragone; monti di Lumezzane. Luglio-Agosto.

β. caule simpliciter unifloro. Colla specie in luoghi magri.

G. acaulis L. It. Genziana maggiore. Br. *Calse de cœc, Ræbaghe, S-ciopù*.

Val di Caino, monte Dragone, monti ad Irma, frequentissima. Aprile-Maggio.

β. excisa Schleh (4). Colla specie, rara (5).

G. Pneumonanthe L. It. Mettimborsa, Pettimborsa. Br. *Ansianela*.

Lame tra Torbole e Castelnuovo, frequentissima. Agosto-Sett.

(1) Capsula subsessili.

(2) Floribus internodia caulis superantibus.

(3) Folia caulinis medulla oblonga obtusa — Specimina in monte Guglielmo a me lecta possideo, in quibus rami caulis cum floribus internodia superant, et capsulae alpes dimiduum fere capsulæ æquat, et tandem folia caulina internodia obtusiuscula sunt. Cuiusmodi ex Willdenovianis speciebus formam istam tribuimus?

(4) Calycis dentibus patentibus. Varietas vix notabilis.

(5) Lusus singularis *G. acaulis* mihi obveniit in monte Colombina. Omnino acaulis folia radicalia rosulata, quorum superiora sensim minora locum calycis tenent, qui omnino defecit, basique corollæ complexantur: stamina tria deporata, petaloides corollæ concolora, duo foliaceae viridis: lineas 4 lata patulum: cingentia. Oculis, vel vitro adjectis, nullus insecti præsentia patet.

- G. asclepiadea* L. It. Asclepiade. Br. *Ansianela*.
Selvette dei colli e dei monti (ai Camaldoli, frequente).
Luglio-Settembre.
- G. cruciata* L. It. Genziana minore.
Pascoli montani, frequente (S. Gottardo, Maddalena, monti
ad Iseo). Luglio-Settembre.
- G. punctata* L. It. Genziana punteggiata. Br. *Genziana
falsa*.
Vette delle Colombine fino ai laghi di Desdana, frequente.
Luglio-Agosto.
- G. pannonica* L. It. Genziana rossigna.
Vette delle alpi di Vaja, rara. Luglio-Settembre.
- G. purpurea* L. It. Genziana porporina.
Sul monte Blennone nei boschetti, rara. Luglio-Agosto.
- G. lutea* L. It. Genziana vera. Br. *Genziana*, *Ansiana*.
Pascoli petrosi prealpini, frequente (Dossalto ad occidente).
Giugno-Agosto.
- Swertia** L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.
- S. perennis* L. It. Genziana stellata.
Monti Colombine, nei prati uliginosi presso *Ravènola vaga*,
abbondantissima. Luglio-Agosto.

*Segue la famiglia delle Bignoniaceæ, cui appartengono: Bignonia
Catalpa L., albero originario dell'America settentrionale che coltivasi
ad ornamento dei viali e dei giardini; Martynia proboscidea Aiton. Br.
Co d'elefant, Scheletro d'ozel, proviene dalla Florida, e coltivasi per
la singolarità dei frutti, che freschi presentano come una testa d'ele-
fante; secchi, spogliati dell'esterno involucri, semiaperti e riuniti op-
portunamente in numero di tre, formano come un carcame d'uccello.*

ORDO LXXVII. CONVULVACEÆ.

Convolvulus L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

- C. arvensis* L. It. Vilucchio minore, Erba leprina. Br.
Campanilè.
Campi, prati, vie, muri, frequentissimo. Maggio-Settembre.

β. obtusus (1). Margini della ferrovia al Mella.

C. sepium L. It. Campanelle, Rampichino bianco, Vilucchio maggiore. Br. *Idele*, *Iderete*, *Campanù de sess*.

Siepi e cespugli dal piano ai monti, frequentissimo. Giugno-Ottobre.

C. cantabrica L. It. Erba bicchierina, Vilucchiello.

Colli apriel, frequente (Badia, Montechiaro, Gargnano, Salò).
Giugno-Luglio.

β. pusillus (2). Colli a S. Pancrazio presso Montechiaro.

C. sylvestris Willd. It. Campanelle vescicose.

In qualche siepe del piano, a Lograto, rarissimo. Luglio-Ag.

Il *C. Scammonia* L. It. e Br. *Scammonèa* è dell'Asia Minore.

Il *C. Jalapa* L. It. Scialappa, Br. *Silapa*, è del Messico.

Cuscuta L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

C. europæa L. (*C. europæa* et *epilinum* Koch?) It. *Cuscuta*, *Granchierella*. Br. *Græm*.

Prati, campi, siepi, principalmente del piano, frequente. Luglio-Agosto.

C. Epithymum L. It. Epitimo, Pittimo. Br. *Græm*.

Prati, siepi, cespugli, principalmente dei monti, frequente
(Al Mufetto sulla *Solidago Virgaurea*) (3).

C. planiflora Ten.? Colli a Mompiano sul *Galium purpureum*. L.

ORDO LXXVIII. BORAGINÆ.

Echium L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

E. vulgare L. It. Buglossa selvatica. Br. *S-cercie salvadeghe*.

Campi, vie, siepi, frequentissimo. Giugno-Settembre.

β. subcordatum (4). Qua e là colla specie, raro.

(1) *Foliorum auriculis rotundatis omnibus.*

(2) *Caulibus ex una radice cespitosi, abbreviatis, bipollicaribus, exilibus; foliis omnibus linearibus acutis.*

(3) *In specimenibus nostris tum C. europææ, tum C. Epithymi corollæ tubus est semper urceolatus, nec cylindricus, nil de suis scribit Kochius.*

(4) *Folliis in basi racemorum subcordato ovatis.*

Litospermum L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

L. officinale L. It. Litospermo, Miglialsole.

Campi, pascoli, boschetti, frequente. Maggio-Luglio.

La radice atta a tingere in rosso gli olii e i grassi dicesi
Orcanèt.L. arvense L. It. Strigolo selvatico. Br. *Cue de soréc*.

Campi, vie, luoghi incolti, più frequente del primo. Mar.-Mag.

L. purpureo-cæruleum L. It. Miglialsole maggiore. Br. *Erba achèra*.

Boschetti dei colli, frequentissimo. (Badia, Collebeato, Ronchi, Riviera). Marzo-Maggio.

Pulmonaria L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.P. officinalis L. It. Polmonaria, Borrana selvatica. Br. *Polmonèra*.Rive de' fossi, luoghi ombrosi dai colli ai monti, frequente.
Marzo-Aprile.

P. angustifolia L. It. Borrana celestina.

Boschetti dei colli, frequentissima (Ronchi, Costalunga, Urago). Marzo-Maggio.

β. mollis Wulf	} Qua e là colla specie (1).
γ. azurea Bessev	

Oenoma L. Sist. Sex. Pent. Monog.O. montanum R. et Sch. (O. stellulatum WK. Koch.)
It. Viperina stellata.Via da Nuvolento a Serle, Campagna di Montechiaro, colli
al Benaco, frequente. Giugno-Luglio.**Cerintho** L. Sist. Sex. Pent. Monog.

C. minor L. It. Etba tortora de' grani.

Campi, margini, siepi, frequente. Giugno-Ottobre.

Myosotis L. Sist. Sex. Pent. Monog.M. palustris Spr. It. Talco celeste. Br. *Erba selestina*.

(1) Quædam specimenes *P. angustifolium* vidi præditis pilis caulis articulatis ut in *P. molli* Wulf., et corollæ faucē lotus infra circumulum barbatus glabra, ut in *P. azurea* Besser.

Ai fossi, e nei luoghi paludosi del piano e dei monti, frequente. Aprile-Giugno.

β . strigulosa Rchb (1). Boschi umidi all' Oglio.

M. alpestris Willd. (*M. sylvatica* Hoffm. Koch) It. Orecchia di topo alpina.

Pascoli dei monti e delle prealpi, frequente. (Vette del Guglielmo, monti a Bovegno). Luglio-Agosto.

β . suaveolens Kit. Prati di Forcazzo presso Bovegno.

M. arvensis Roth. Bertol. It. Centonchio selvatico. Br. *Erba selestina*.

Pascoli del piano e dei colli, abundantissima ovunque. Aprile-Giugno.

α . intermedia Link (2). Pascoli pingui.

β . stricta Link (3). Pascoli aridi.

γ . hispida Schlechtend (4). Pascoli, campi, colle altre varietà.

M. versicolor Persoon. It. Centonchio selvatico di due colori.

Luoghi umidi, paludosi, ghiaie de' fiumi, rarissimo. (Lama Chioldo). Aprile-Maggio.

Eritrichium Schrad. Sist. Sex. Pent. Monog.

E. nanum Schrad. (*Myosotis nana* Willd. Bertol.) It. Orecchia di topo canuta.

Monte Rondenino ad un ruscello che forma il laghetto, raro. Luglio-Agosto.

Anchusa L. Sist. Sex. Pent. Monog.

A. officinalis L. It. Buglossa, Lingua bovina. Br. *Lengua de bò*.

Strade e campi del piano, frequente. (S. Gervasio, Pontevico, Verolanuova). Maggio-Giugno.

β . angustifolia Pollin. Comoll. Rota, non L. Campi montani a Lumezzane, Caino, ecc.

(1) *Pilis caulis patentibus.*

(2) *Pedicellis calyce duplo longioribus. Flores magni.*

(3) *Pedicellis calyce brevioribus. Flores parvi.*

(4) *Pedicellis calycem aequantibus. Flores parvi.*

- A. italica Willd. It. Buglossa volgare. Br. *Lengua de bò*.
 Messi e margini dei campi, frequente (al Mella, Campagna
 di Montechiaro). Maggio-Giugno.

Cynoglossum L. Sist. Sex. Pent. Monog.

- C. officinale L. It. Cinoglossa, Lingua di cane.
 Campi del piano, frequente. (Castrezzato, S. Gervasio). Giu-
 gno-Luglio.

β. montanum Lamk. Falde del Dragone sopra Nave.

- C. pictum Willd. It. Cinoglossa reticolata.

Strade, ruderali, frequente. (Ronchi, Serle ecc.). Maggio-Lug.

Omphalodes Tournef. Sist. Sex. Pent. Monog.

- O. verna Mœnch (Picotia verna R. et Sch. Bertol.) It.
 Borrana montanina.

Seriola Fusa tra Paratico e Palazzolo, abbondante. Aprile.

Echinospermum Swartz. Sist. Sex. Pent. Monog.

- E. Lappula Lelnn. (Myosotis Lappula L. Bertol.) It. Lap-
 polini. Br. *Piægg*.

Colli aprici, campi, frequente. (Iseo, Rezzato ecc.). Mag-
 gio-Luglio.

Asperugo L. Sist. Sex. Pent. Monog.

- A. procumbens L. It. Lingua di bue.

Siepi e campi della bassa pianura, frequente. Aprile-Giug.

Licopals L. Sist. Sex. Pent. Monog.

- L. arvensis L. It. Lingua di bue.

Vie e campi del piano, rarissima. Giugno-Agosto.

Borago L. Sist. Sex. Pent. Monog.

- B. officinalis L. It. Borraggine. Br. *Borài*.

Margini dei campi, del piano e dei colli, frequentiss. Apr.-Set.

Symphytum L. Sist. Sex. Pent. Monog.

- S. officinale L. It. *Anegàl*, *Renegàl*. Consolida maggiore. Br.

Terreni umidi, margini dei fossi, frequentissimo. Magg.-Giug.

- S. tuberosum L. It. Consolida tuberosa. Br. *Anegàl de
 mont.*

Selvette de' colli, frequentissimo. (Badia, Mompiano). Mar-
 zo-Maggio.

β. macrolepis Gay. Scarpe de' ruscelli sotto Brescia.

Heliotropium L. Sist. Sex. Pent. Monog.

H. europæum L. It. Erba de' porri, Eliotropio. Br. *Vaniglia salvadega*.

Colli suburbani a S. Fiorano; Sirmione, frequente. Luglio-Sett.

Coltivasi comunemente per la soavità dell'odore: *H. Peruvianum* L. It. e Br. *Vaniglia*. (Per la *Vaniglia* usata come aroma V. Ord. CXVI.).

ORDO LXXIX. SOLANACEÆ.

Solanum L. Sist. Sex. Pent. Monog.

S. nigrum L. It. Solatro nero, Morella. Br. *Tosseg negher*. Siepi, ruderali, alle case, dappertutto. Maggio-Ottobre.

β. *chlorocarpum* Koch. Nel podere della Conchiglia presso Brescia.

S. miniatum L. It. Solatro rosso. Br. *Tosseg ross*.

Ove l'antecedente, frequentissimo. Maggio-Ottobre.

β. *villosum* Re, non Lamk. Salò, Lonato, Mompiano, Ronchi.

S. Dulcamara L. It. Dulcamara. Br. *Dūcamara*.

Rive de' fossi, siepi, luoghi ombrosi, ruderali, frequente. Giugno-Luglio.

Coltivasi per il tubero mangiabile:

S. tuberosum L. B. *Patata*, *Pom de tera*, recatoci dall'America.

Il *S. Pseudo-Capsicum* L. It. Falso pepe, Marenella. Br. *Marenèle*, coltivato anche ne' vasi per ornamento, è indigeno dell'isola di Madera.

Physalis L. Sist. Sex. Pent. Monog.

Ph. Alchechengi L. It. Cigliegine, Palloncini. Br. *Bolunsi* *Pa de cuco*, *Chechingi*.

Luoghi ombrosi del piano e dei colli, frequente (sopra S. Gottardo). Maggio-Giugno.

Atropa L. Sist. Sex. Pent. Monog.

A. Belladonna L. It. Belladonna, Solatro maggiore. Br. *Beladóna*.

Monti intorno a Collio e Bagolino; falde del Dossalto, frequente. Giugno-Luglio.

L'A. *Mandragora* tanto favoleggiata non esiste nella provincia nostra nè in altre dell'Italia settentrionale. Questa è forse il *Duedim* degli Ebrei.

Hyosclamus L. Sist. Sex. Pent. Monog.

H. niger L. It. Giusquiamo nero, Erba da piaghe. Br. *Erba S. Polonia*, *Fiur ress*.

Ruderati, frane, alle stalle dei colli e dei monti, frequente. Giugno-Luglio.

H. albus L. It. Giusquiamo bianco. Br. *Erba S. Polonia*.
Sulle mura di S. Giovanni; Ronchi presso le case; raro.
Maggio-Luglio.

Datura L. Sist. Sex. Pent. Monog.

D. Stramonium L. It. Stramonio, Noci pazze. Br. *Stermonio*, *Endormia*.

Originario dell'America è fatto ormai naturale fra noi. Campi, vie ruderati, principalmente alla bassa (S. Gervasio alle Baite e alle Casazze, abbondante). Giugno-Settembre.

Coltivansi:

Lycopersicum esculentum Mill. Br. *Pom d'or*, *Pomales*, originario dell'America.

Capsicum annuum L. Br. *Peerù* dell'America Meridionale.
Melongena teres Mill. Br. *Melansana*, *Maregiuna*, dell'India Orientale. — La varietà spinosa che produce i frutti della forma, della grossezza e del colore d'un uovo di gallina dicesi *Pianta ad uova*, Br. *Oef de vass*. — *Nicotiana Tabacum*, con altre specie e varietà, Br. *Tabàc*, dell'America.

ORDO LXXX. VERBASCEÆ.

Verbascum L. Sist. Sex. Pent. Monog.

V. Thapsus L. (V. Schraderi Koch) It. Barabosco, Tasso-barbasso. Br. *Tas-barbòss*, *Laedù*.

Vie, ruderati, frane, frequente. (Cava di pietre a Costalunga). Giugno-Settembre.

- V. thapsiforme Röm. et Schult. It. Falso barabasco. Br. *Laedù*.

Come l' antecedente. (Monte Conche in una frana verso Caino). Giugno-Settembre.

- V. pholomoides L. It. Barbarastio. Br. *Tas barbàs, Laedù*.
Come gli antecedenti, frequentissimo.

β. interruptum (1). Ove la specie, rarissimo.

- V. montanum Schrad. It. Barabasco montanino. Br. *Laedù*.
Selvette del monte Dragone verso Serle, raro. Giugno-Sett.

- V. sinuatum L. It. Tasso barbasso. Br. *Tas barbàs, Laedù*.
Vie, ruderati, margini del campi, frequentissimo. Giug.-Sett.

- V. floccosum Willd. It. Barabasco a candelabro. Br. *Laedù*.
Ruderi, margini secchi de' campi, frequente. Giugno-Agosto.

- V. Lychnitis L. It. Verbasco Licnite.

α. floribus luteis. Luoghi incolti, frequentissimo. Luglio-Sett.

β. floribus albis. Raro. Vette dei colli tra Provaglio ed Iseo.

- V. nigrum L. It. Verbasco nero. Guarognasco femina.
Boschetti dei monti e luoghi magri dei colli e del piano,
frequente. (Mura di Brescia). Giugno-Luglio.

β. lanatum Schrad. Pascoli montani.

γ. obtusum (2). Qua e là colla specie.

δ. austriacum Schrad. Stradicciuole presso Nave.

- V. phoeniceum L. It. Polline porporino (3).

Lungo il sentiero da Urago ai Campiani frequente; altrove rarissimo. Aprile-Maggio.

- V. Blattaria L. It. Polline (4).

Piano e monti nei campi sterili, margini delle vie, frequente
(Collebeato, Nave, Riviera Benacese). Giugno-Ottobre.

β. pinnatifidus (5). Campi fra Bassano e S. Gervasio, abbondante.

(1) Racemo valde interrupto, foliis utriusque denudatis.

(2) Foliis omnibus exquisitè ovato-cordatis apice rotundato obtusissimis.

(3) Flores intense violacei.

(4) Flores lutei, basi luteo purpurei.

(5) Foliis radicalibus caulisque inferioribus pinnatifidis, segmentis lobulatis.

Scrophularia L. Sist. Sex. Didynamia Angiospermia.

S. vernalis L. It. Scrofularia gialla.

Monti e prealpi alle stalle, frequente (Guglielmo, Dragone).
Aprile-Maggio.

S. aquatica L. (*S. Ehrharti* Koch) It. Scrofularia.

Ai fossi, poco frequente (Bagnolo, Volta, Isorella). Giug.-Ag.

S. nodosa L. It. Castagnòla, Millemorbia. Br. *Erba morela*, *Erba mora*, *Erba de moroidi*.

Luoghi erbosi, margini dei fossi dal piano ai monti, frequente. Giugno-Settembre.

β. *Scopolii* Pers. ? (1). Ad un fosso presso Sirmione.

S. canina L. It. Dente di cane, Ruta canina.

Luoghi aprici e sassosi del piano e dei monti, muri, frequentissima. Maggio-Luglio

β. *albiflora*. Rupi fra Barghe e Vestone.

S. Hoppii Koch. It. Scrofularia coriandollina.

Ghiaie de' torrentelli sui monti Cornablaeca, Pajo, Ario. Luglio-Agosto.

ORDO LXXXI. ANTIRRHINEÆ.

Gentiana L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.

G. officinalis L. It. Graziola. Stancacavallo. Br. *Grasiola*.

Luoghi paludosi, frequente (Torbole abbondantiss.). Aprile-Agosto.

Digitalis L. Sist. Sex. Didynamia Angiospermia.

D. grandiflora Lamk. It. Digitale grande gialla. Br. *Didài*.

Monti e prealpi, frequentissima. Giugno-Agosto.

D. lutea L. It. Digitaria, Erba aralda. Br. *Didaline*.

Selvette, frequentissima (Colli suburbani, Costalunga). Giugno-Ottobre.

La *D. purpurea* L. It. Digitale, Br. *Digitál*, non l'ho ancora incontrata spontanea nella provincia, quantunque mi si volle far credere che cresca presso Collio.

(1) Caule simpliciter, exili, elato, foliis parvis ovato ellipticis apice rotundato acutiusculis. Flores non vidi.

Antirrhinum L. Sist. Sex. Didynamia Angiospermia.

A. majus L. It. Antirrino, Bocca di cane. Br. *Boca de ca.*

Muri vecchi, poco frequente (Castello, Ronchi, Camaldoli).

Maggio-Ottobre. Coltivasi nei giardini con alcune varietà poco notevoli.

A. Orontium L. It. Gallinaccia, Gallinella.

Fra le messi, frequente (Ronchi, Desenzano, Iseo). Giugno-Luglio.

Linaria Tournef. Sist. Sex. Didyn. Angiosp.

L. Cymbalaria Mill. (Antirrhinum Cymbalaria L. Bertol.)

It. Cimbalaria. Br. *Erba tondèla.*

Su pei muri ovunque. Marzo-Settembre.

L. Elatine Mill. (A. Elatine L. Bert.) It. Soldina, Cencio molle.

Campi e luoghi incolti (Palazzolo, Bogliacco, Nave). Ag.-Sett.

L. spuria Mill. (A. spurium L. Bertol.) It. Cencio molle maggiore.

Campi umidi del piano, poco frequente (Dello).

L. minor DC. (A. minus L. Bertol.) It. Antirrino minore.

Campi, strade, ruderali, frequente. Maggio-Agosto.

L. chalepensis Mill. (A. chalepense L. Bert.) It. Erba ragna.

Fra le messi a Toscolano, rarissima. Aprile.

L. alpina Mill. (A. alpinum L. Bert.) It. Linajuola d'alpe.

Rupi delle prealpi, frequente (Alpi di Vaja; monte Rondino), Luglio-Settembre.

L. vulgaris Mill. (A. Linaria L. Bert.) It. Linaria. Br.

Boche de ca zalde.

Campi, strade, boschetti del piano e de' colli, frequentissima.

Maggio-Novembre.

Anarrhinum Willd. Sist. Sex. Didyn. Angiosp.

A. bellidifolium Willd. It. Muffolino frastagliato.

Rive dell'Oglio poco sotto Monticelli, rarissimo. Giugno.

Veronica L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.

V. scutellata L. It. Capellina, Gramignolle.

Risaje a Torbole, rara. Maggio-Agosto.

- V. *Anagallis* L. It. Crescione, Erba grassa. Br. *Grassù salvadeg.*

Acque lente o stagnanti, frequente. Maggio-Agosto.

- V. *Beccabunga* L. It. Beccabunga. Br. *Grassù salvadeg.*
Come l' antecedente, frequentissima. Maggio-Agosto.

- V. *urticæfolia* L. fil. It. Veronica Ortica.

Selve ombrose montane, frequente (monti di S. Onofrio, Iseo, Provaglio). Maggio-Luglio.

- V. *Chamædrus* L. It. Crescione dei prati. Br. *Veronica.*
Prati e margini de' campi, di collina e di montagna, frequentissima. Aprile-Giugno.

- V. *officinalis* L. It. The europeo, Veronica maschio. Br. *Te de mont.*

Colli, monti e prealpi, frequente (ad Iseo, Costalunga, Madalena). Aprile-Luglio.

β. cuneata (1). Vette delle Colombine.

- V. *aphylla* L. It. Veronica piccina.

Rupi sul monte Dossalto e Pessedà, frequente. Luglio-Ag.

- V. *prostrata* L. It. The selvatico. Br. *Te de mont.*

Colli apri, frequentissima (Castello, Badia, Urago, Sirmione). Aprile-Giugno.

- V. *latifolia* L. Bert. (V. *latifolia* α. Koch.) It. Erba celestina.

Colle Badia, e boschetti presso Lavenone. Maggio-Giugno.

- V. *Teucrium* L. Bert. (V. *latifolia* β. Koch) It. The lanciuolo.

Colli sopra Gardone di Salò vicino a Serniga. Maggio-Giug.

- V. *spicata* L. It. Veronica spigata.

Prati di collina e di montagna (S. Eufemia, Camaldoli, Iseo). Luglio-Ottobre.

β. hybrida L. colla specie in suolo pingue (Quarone).

- V. *bellidioides* L. It. Veronica Margherita.

Prati ed estreme vette del M. Mufetto. Luglio-Agosto.

(1) *Folia rotundato-cuneatis, racemo solitario.*

- V. fruticulosa L. It. Veronica fior di rosa.
M. Colombine a *Ravènola soliva*, Mufetto. Luglio-Agosto.
- V. alpina L. It. Erba Gualda alpina.
Rupi e luoghi erbosi delle Colombine a *Ravènola vaga*; rupi di Pesseda. Luglio-Settembre.
- V. serpyllifolia L. It. Erba Gualda selvatica.
Prati del piano e dei monti, frequentissimo (Mompiano). Aprile-Maggio.
- V. arvensis L. It. Ederella, Serpollino.
Campi, orti, luoghi erbosi, vie, frequentissima. Marzo-Magg.
- V. verna L. It. Veronica primaticcia.
Prati presso Pontoglio, rarissima. Marzo-Aprile.
- V. triphyllos L. It. Veronica manine.
Campi, massime a frumento, frequente. (Campi suburbani a Mombello). Marzo-Aprile.
- V. didyma Ten. (V. agrestis Auct. non L.) It. Veronica pratajuola.
Prati, campi, vie, muri, frequentissima. febbrajo-Aprile (4).
- V. Buxbaumii Ten. It. Veronica querciola. Br. *Veronica*.
Campi, orti, vie, frequentissima ovunque. febbrajo-Ottobre.
- V. hederifolia L. It. Veronica morso di gallina.
Orti, campi, muri, frequentissima. febbrajo-Aprile
- Pæderòta** L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.
P. Bonarota L. It. Bonarota.
Rupi dei monti Fronden, Dossalto, Ario, Cornablaça. Luglio-Agosto.
- Lindernia** L. Sist. Sex. Didynamia Angiosp.
L. Pixidaria Allion. It. Pissidaria palustre.
Lama Scovola e risaje, rara. Settembre-Ottobre.

(4) *F. opaca* Fries, ed *F. polita* Fries, sunt, ex Bertolonii sententia, una eademque species cum *F. didyma* in diversae plantae evolutione,

ORDO LXXXII. OROBANCHEÆ.

Orobanche L. Sist. Sex. Didyn. Angiosp.**O. cruenta** Bert. It. Succiamiele sanguigno.

Prati del piano e dei colli sulle Leguminose. (Sud del Benaco, selvette a Lavenone). Aprile-Giugno.

O. major L. (O. *Rapum* Thuill. Koch.) It. Succiamiele maggiore.

Rara: parassitica del *Sarothamnus scoparius* sul monte di Conche. Giugno.

O. pruinosa Lap. It. Lupo di Fave.

Sulla *Vicia Faba* in un campicello presso il Goletto. Giugno.

O. epithymum DC. It. Succiamiele del timo.

Sul *Thimus Serpyllum* alla Badia e sui Ronchi. Maggio-Giug.

O. caryophyllacea Smith. (O. *Galii* Koch.) It. Succiamiele garofanato.

Ronchi al Buren; a Tremosine sul *Galium Mollugo*. Maggio.

O. minor Sutton. It. Succiamiele minore.

Sul *Trifolium pratense* e sulla *Medicago lupulina*, frequente. (Castello a S. Pietro, prati a Ponte alto). Aprile-Giugno.

β. *Hederæ* Ten. Rota. Sull' *Hedera helix* alla Bornada.

O. elatior Sutton (O. *rubens* Koch.) It. Succiamiele pratjolo. Br. Fiuràss.

Campi a Sarezzo sulla *Medicago falcata* ed altre piante. Giugno-Agosto.

β. corolla flava, Sul Cornablaa al Pajo.

O. ramosa L. It. Succiamiele piccolo.

Sulla *Cannabis sativa*, sul *Solanum nigrum*, e sullo *Zea Mais*. Colline a Provaglio, alla ferrovia tra S. Eufemia e Rezzato. Maggio-Luglio.

β. *simplex* (1). Ronchi sopra Ponte alto, frequentissima.

(1) Caule simplicissimo.

O. cærulea Willd. It. Succiamiele porporino.

In un vaso d'aranciera dell'Orto Botanico di Brescia nel 1857, ove cresceva in terra di brughiera il *Chamaerops humilis* !

Lathraea L. Sist. Sex. Didyn. Angiosp.

L. squamaria L. It. Dentaria.

Colli lungo il sentiero lacuale da Clusane a Paratico, a Costalunga lungo il Garza e poco lungi dalla Chiesa. Marzo-Aprile.

ORDO LXXXIII. RHINANTHACEÆ.

Tozzia L. Sist. Sex. Didyn. Angiosp.

T. alpina L. It. Tozzia alpina.

Rupi del monte Pajo presso il Cornabacca. Luglio-Agosto.

Melampyrum L. Sist. Sex. Didyn. Angiosp.

M. cristatum L. It. Triticum vaccino crestato.

Colli erbosi, frequente (Badia, Costalunga, Riviera). Maggio-Giugno.

M. arvense L. Coda di volpe, Fiamma. Br. *Cue de luf*.

Messi del piano e dei colli, frequentissimo. Aprile-Giugno.

β. albinum (1). Un solo individuo fra le messi a Mompiano.

M. nemorosum L. It. Melampiro azzurro. Br. *Stringùla bô*, *Erba castegnara*.

Boschi montani, frequente (Quarone, Gargnano al Mulini). Luglio-Settembre.

M. pratense L. It. Melampiro bianco. Br. *Erba castegnara*.

Colli di Mompiano, monte Maddalena, Quarone, frequente. Luglio-Ottobre.

M. sylvaticum L. It. Melampiro fiorellino.

Boschetti sui monti Conche e sopra Lavenone. Luglio-Ag.

Pedicularis L. Sist. Sex. Didyn. Angiosp.

P. verticillata L. It. Pedicolare a ghirello.

Vette del monte Guglielmo alle cascine. Luglio-Agosto.

(1) *Corollis bractæaque totis niveis, exsiccatione nigris.*

P. rostrata L. (*P. rostrata* et *P. Jacquinii* Koch.) It. Pedicolare beccuta.

Monte Colombine sulle vette, e alle *Poffe Ratte*; monte Cigoletto, frequente. Luglio-Agosto.

P. tuberosa L. It. Pedicolare zolfina.

Val di Marone, pascoli sopra Lumezzane, frequente. Giugno-Luglio.

β. *Darellieri* Koch. Monti sopra Lavenone.

P. incarnata Willd. It. Pedicolare carnicina.

M Cigoletto alle *Corti di Campo molle* (Zant.).

P. aspleniifolia Willd. It. Pedicolare cetracchina.

Monte Gazzo fra le rupi, rarissima. Luglio-Agosto.

P. rosea Willd. It. Pedicolare sottile.

Rupì in una valletta del monte Catino verso mezzodi, rarissima. Luglio.

P. fasciculata Bellard. It. Pedicolare fasciolata.

Monti sopra Irma e presso Bovegno. rara. Luglio-Agosto.

P. foliosa L. It. Pedicolare fronzuta.

Lungo il rio che esce dai laghi di *Ravenola* sulle Colombine. Luglio-Agosto.

P. recutita L. It. Pedicolare alata.

Monte Gazzo al confine tirolese, rara. Luglio-Agosto.

P. acaulis Wulf. It. Pedicolare primaticcia.

Vecchio sentiero alle coste di S. Eusebio, Val Bertone sopra Caino, frequente. Aprile-Maggio.

P. palustris L. It. Pedicolare.

Fossi e paludi al sud del Benaco, frequente. Giugno.

Rhinanthus L. Sist. Sex. Didyn. Angiosp.

R. minor Ehrh. (*R. cristagalli* L. Bertol.) It. Cresta di gallo. Br. *Gresta de gal*, *Brüzaræi*.

Sponde del lago d' Idro, prati turfosi a Bagnolo. Giug.-Ag.

β. *angustifolius* Koch. Falde del M. Ario lungo un ruscello.

R. Alektorolophus Pollich. It. Cresta di gallo pelosa. Br. *Brüzaræi*.

Prati e campi magri ovunque, frequentissimo. Maggio-Lug.

Euphrasia L. Sist. Sex. Didyn. Angiosp.

E. officinalis L. It. Eufrasia. Br. *Brüza fer*, *Eufrasia*.

Prealpi, monti e colline, lame a Torbole, campagna di Montechiaro, frequentissima. Maggio-Settembre.

α. *pratensis* Reichenb. Prati umidi del piano e dei colli.

β. *nemorosa* Pers. Prati asciutti.

γ. *pectinata* Reich. Prealpi.

δ. *alpestris* Koch. Prealpi.

ε. *minima* Schleich. Prati prealpini.

ζ. *salisburgensis* Funk. Terreni ghiaiosi dei monti (1).

E. tricuspidata L. It. Eufrasia triforcuta.

Pascoli sterili montani e prealpini, frequente (monti Conche e Fronden). Luglio-Agosto.

E. Odontites L. (*Bartsia Odontites* Bertol.). It. Perlina primaticcia.

Colline e piani vicini fra le messi, margini umidi, frequentissima. Maggio-Agosto.

E. serotina L. (*Bartsia serotina* Bertol.). It. Perlina rossa.

Colli asciutti, frequente (Bollicino, Riviera). Settembre-Ott.

E. lutea L. It. Perlina gialla.

Colline asciutte ed apriche, frequentissima (Badia, S. Eufemia). Settembre-Ottobre.

Bartsia L. Sist. Sex. Didyn. Angiosp.

B. alpina L. It. Clinopodio alpino.

Pascoli e rupi prealpine (Cornabla a Pajo, Dossalto). Luglio-Agosto.

Trixago Link. Sist. Sex. Didyn. Angiosp.

T. latifolia Reichenb. (*Bartsia latifolia* Sm. Bert.). It.

Perlina, rossiccia.

Lama la Pranduna nei rialzi, rara. Aprile-Maggio.

(1) Has varietates, Bertolonium et Kochium secutus, adnotavi; sed mihi tum planitiem, tum colles, montes, et subalpes peragranti tot obvenerunt, vel eodem loco, eodemque individuo, formae magnitudine, foliis, pilis, dentibus et florum colore, ut impossibile fuerit ex his omnibus varietates probe distinctas de-promere.

ORDO LXXXIV. LABIATÆ.

Mentha L. Sist. Sex. Didynamia Gymnospermia.

- M. rotundifolia** Koch. (non L. ex Bert.; *M. macrostachya* Bert.). It. Menta selvatica, Mentastro. Br. *Menta de foss.*

Rive de' fossi, frequente (Torbole). Luglio-Settembre.

- M. sylvestris** L. It. Menta selvatica. Br. *Menta, Sarvezi salvadeg.*

Strade, margini dei campi e dei fossi, frequentissima. Luglio-Settembre.

β. *nemorosa* Comol. Siepi dei colli e del piano.

γ. *candicans* Crtz. Colli erbosi.

δ. *crispata* Schrad. Ronchi presso il Goletto.

- M. viridis** L. (*M. sylvestris* δ Koch.) It. Menta romana. Br. *Menta, Erba diauluna.*

Orti, vigne, campi, rara. (Campo a Pontoglio presso il Climitero). Luglio-Agosto.

- M. pratensis** Solh. Koch. (*M. arvensis* « Bertol.). Br. *Menta.*

Tra il grano turco dietro al Castello, rarissima. Settembre.

- M. arvensis** L. Koch. (*M. arvensis* ζ Bertol.). Br. *Menta.*

Campi a prato, vie principalmente del piano, frequentissima. Luglio-Settembre.

β. *glabriuscula* Koch. Colla specie.

- M. aquatica** L. Koch. (*M. hirsuta* L. Mant., Bertol.) It. Menta d'acqua.

β. *glabrata* Koch. Colla specie.

γ. *incana* (1). Risaje a Torbole.

- M. sativa** L. Koch. (*M. arvensis* « Bertol.). Br. *Menta.*

Ai fossi appiè de' colli di S. Giorgio presso Montechiaro.

- M. Pulegium** L. Bert. (*Pulegium vulgare* Koch.) It. Menta piccola.

(1) Follis dense in ano-tomentosa.

Prati umidi del piano, frequente. (Orti a Torbole, campi già a frumento fra Passano e S. Gervasio). Luglio-Sett.

Lycopus L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.

L. europæus L. It. Erba sega, Marrubio acquatico.

Piano e monti lungo i fossi, frequentissimo. Luglio-Settem.

L. exaltatus L. It. Erba sega maggiore.

Paludi e fossi, al sud del Benaco. Luglio-Agosto.

Rosmarinus L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.)

R. officinalis L. It. Rosmarino, Ramerino. Br. *Osmari*.

Spontaneo a Limone e in altri luoghi della Riviera. Coltivasi ovunque. Marzo-Aprile.

Salvia L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.

S. glutinosa L. It. Fuso di Giove. Rocca di Giove.

Boschetti ombrosi dal piano ai monti, frequentissima. Agosto-Ottobre.

L. Verbenàca L. It. Chiarella minore.

Colli presso Venzago, rarissima. Maggio-Luglio.

S. Sclæræa L. It. Chiarella maggiore, Sclærea. Br. *Erba moscadela*, *Sclæræa*.

Colli aridi presso Gargnano; erratica nel piano. Maggio-Lug.

S. verticillata L. It. Ormino spurio,

Colli di Capriano in luoghi umidi, rarissima. Luglio-Sett.

S. pratensis L. It. Cavolaccio, Chiarella. Br. *Salvia de prat.*

Prati e luoghi erbosi dei colli e dei monti, frequentissima. Aprile-Ottobre.

β. albiflora. Al cimitero di Peschiera d' Iseo.

Coltivansi:

S. splendens Ker., Br. *Salvia splendida*, per ornamento. Del Messico.

S. officinalis L., Br. *Salvia*, per condimento e come medicinale.

Spontanea nella bassa Italia.

Lavandula L. Sist. Sex. Didynamia Gymnospermia.

L. spica L. It. Lavanda. Br. *Laanda*.

Rupi benacesi, frequente. Maggio-Ott. Coltivasi ad ornamento.

Coltivasi anche:

L. latifolia Ehrh. It. Lavanda, Br. *Laanda*, spontanea nelle provincie contermini alla nostra.

Origanum L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

O. vulgare L. It. Origano, Erba acciuga. Br. *Mazzerana de mont.*

Tutti i colli ed i monti poco elevati, frequentissimo, Lug.-Ag.

Coltivansi pel grato odore di tutta la pianta;

O. Dictamnus L. Br. *Ditimo*. Dell' Isola di Creta.

O. majoranoides Willd. Br. *Mazzerana*. Della Palestina o dell' Africa.

Ocimum basilicum L. Br. *Bazalèco gross.* Dell' Asia.

O. minimum L. Br. *Bazalèco*. Di Ceylan.

Thymus L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

T. Serpyllum L. It. Timo, Serpolino, Popolino. Br. *Timo salvadeg*, *Peerèl*.

Dal piano alle prealpi, frequentissimo. Marzo-Ottobre (1).

T. pannonicus Benth. Bertol. It. Pepolino peloso. Br. *Timo pelus*.

Margini dei campi lungo il Mella, frequente (2).

Coltivasi:

T. vulgaris L. Br. *Timo*, *Peerèl*, spontaneo della Liguria.

Satureja L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

S. hortensis L. It. Coniella, Santoreggia. Br. *Segrezæla*, *Sigrizina*

Qualche muro vecchio della città; vie a Palazzolo; campi tra il Castello e la strada di circonvallazione, rara. Luglio-Settembre.

S. montana L. It. Erba acciuga, Santoreggia. Br. *Segrezæla salvadega*.

Sponde del lago d' Idro fra Anfo e Lavenone, frequente. Giugno-Agosto.

Calamintha Moench. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

C. Acinos Clairv. (*Thymus Acinos* L. Bert.) It. Timo selvatico.

Tutti i colli, frequente. Aprile-Settembre.

(1) Varietates innumeras, nec ab auctoribus bene extricatas, quod quidem impossibile videtur, consilio prætermisi.

(2) Hic quoque fortasse varietas præcedentia.

C. alpina Lam. (Thymus alpinus L. Bert.) It. Acino odoroso.

Monti e prealpi fra le rupi, frequente. (Dragone, Irma).
Maggio-Luglio.

C. grandiflora Moench. (Thymus grandiflorus L. Bert.) It. Melissa peperina.

Colli fra Gargnano e Tignale, poco frequente. Giugno-Ag.

C. Nepeta Clairvill. (Thymus Nepeta L. Bert.) It. Nepitella. Br. *Pælezæl*.

Colli e monti, rupi, muri, vie, campi, frequentissima. Luglio-Novembre.

C. officinalis Moench (Thymus Calamintha L. Bert.) It. Calamento.

Luoghi erbosi dei colli e dei monti, frequente. (Badia, Caccavero, Salò). Giugno-Ottobre.

Clinopodium L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

C. vulgare L. It. Clinopodio, Menta senza odore.

Colli e piano sottoposto in siti erbosi, frequentissimo. Luglio-Novembre.

β. floribus albis. Colla specie, rarissimo.

Melissa L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

M. officinalis L. It. Melissa, Cetronella. Br. *Erba setronela*, *Melissa*.

Siepi e vie erbose dei colli e del piano, frequente. Giugno-Settembre.

Ornithoglossum L. Sist. Sex. Digyn. Gymnosp.

O. pyrenaicum L. It. Ormino montano.

Pascoli sassosi di tutti i monti, frequente. (Da S. Eusebio su pel Dragone). Maggio-Agosto.

Hisopus L. It. Issopo, Isopo. Br. *Isopo*, *Esopo*.

Venni assicurato che cresce nel versante settentrionale del Guglielmo; ma coltivali per l'aroma di tutta la pianta. Luglio-Ottobre.

L'*Hisopus* o *Esop* del *Miserere* pare che appartenga ad altro genere di piante non bene determinato (vedi *Capparis*).

Nepeta L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

N. Cataria L. It. Gattaria, Menta dei gatti. Br. *Erba dei gacci*.
Orti e lungo le vie a Bovegno. Luglio-Agosto.

N. nuda L. It. Mentastro.

Colli della Riviera benacese, frequente. Giugno-Luglio.

Glechoma L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

G. hederaceum L. It. Edera terrestre. Br. *Erba terestra*.
Siepi, orti, margini dei campi, frequentissimo. Marzo-Apr.

Melittis L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

M. Melissophyllum L. It. Melino, Bocca di lupo. Br. *Teta bossi*.

Boschi e luoghi erbosi dei colli e dei monti, frequentissimo. Aprile-Maggio.

Lamium L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

L. Orvula L. It. Orvula. Br. *Tetù, Ortigòcc*.

Selvette e rive de' fossi (Garza, Val di Nave, Caino, Lonato, Valsabbia). Marzo-Giugno.

L. amplexicaule L. It. Erba ruota.

Via a Rebuffone, campi ad Agnosine, muri a S. Gervasio. Marzo-Aprile.

L. purpureum L. It. Dolcimele, Ortica morta. Br. *Cicia-bossi*.

Sirade, rive, campi, orti, vigne, frequentissimo. Marzo-Ott.

L. maculatum L. It. Dolcimèle, Ortica morta. Br. *Cicia-bossi*.

Orti, campi, vie dappertutto. Marzo-Ottobre (1).

L. album L. It. Lamio bianco. Br. *Ortiga bianca, Cicia-bossi bianc*.

Ove l' antecedente, ma meno abbondante.

Galeobdolon Hudson. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

G. luteum Hudson It. Ortica gialla. Br. *Ortiga zalda*.

Boschetti, orti, siepi dei colli e dei monti, frequente. Maggio-Luglio.

Galeopsis L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

G. Ladanum L. It. Gallinaccia, Gallinella.

(1) *L. hirsutum* Lamk. est haec eadem species.

Fra le messi dal piano ai monti, frequente. Giugno-Agosto.

α angustifolia Wimm. (G. Ladanum α . Bertol.).

β . latifolia Wimm. (G. Ladanum β . Bertol.).

γ . glandulifera (1).

G. Tetrabit L. It. Canape selvatica, Erba giudaica. Br. *Cà-nef salvadeg.*

α . major (G. Tetrabit et pubescens Koch.). Prati, campi, vie, fossi dei colli e del piano (2).

β . minor (3). Monti e prealpi. (Monte Guglielmo).

G. versicolor Curt. (G. cannabina Pollin). It. Canapuc-cia screziata.

Messi dei monti e pascoli delle prealpi (Monte Mufetto).
Giugno-Agosto (4).

Stachys L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

S. germanica L. It. Erba S. Pietro, Madrisalvia, Br. *Erba pèlèza*.

Vie, ruderati dei colli e del piano adjacente (Goletto; lungo l'acquedotto di Mompiano). Maggio-Agosto.

S. palustris L. It. Scabbiosa.

At fossi principalmente del piano, frequente. Giugno-Sett.

β . ambigua Smitt. Ove la specie.

S. sylvatica L. It. Matricale.

Boschetti e siepi del piano e dei colli, frequente. Magg. Glug.

S. alpina L. It. Salvia alpina.

Monti e prealpi (Guglielmo, Mufetto, Ario, frequente). Luglio-Agosto.

S. erecta L. It. Strigonella.

Colli e monti in luoghi erbosi, frequentissima. (Fadia). Giugno-Settembre.

(1) Hæc forma occurrit tum in α , tum in β .

(2) Corolla lacinia calycis duplo vel triplo longiore.

(3) Corolla exigua; lacinia calycis tubo suo longioribus. Variat tamen mirimode pilis mollibus vel hispidis, simplicibus vel glanduliferis, latitudinis foliorum, et coloribus corollæ.

(4) Sunt qui putant, nec prorsus immerito, hæc quoque esse præcedentis varietatem.

S. annua L. It. Erba strega, Erba turca.

Campi magri fra le messi (Prati presso Nave, frequentissima). Giugno-Ottobre.

S. labiosa Bertol.

Rupi e pascoli del Maniva e dell'Ario, rara. Luglio-Agosto.

Betonica L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

B. officinalis L. It. Betonica. Br. *Betonega*.

Pascoli, ericeti, selvette del colle e del monte, frequentissima. Maggio-Ottobre (1).

B. hirsuta L. It. Betonica porporina.

Rupi del Rondenino, di Prada, del Broffione alle Crocette. Luglio-Agosto.

B. alopecùros L. It. Betonica gialla.

Pascoli montani, frequente. (Nave, S. Onofrio, Conche, Dragone). Giugno-Agosto.

Sideritis L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

S. romana L. It. Stregònia.

Declivio delle colline al sud di Venzago, rara. Giugno-Lug.

Marrubium L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

M. vulgare L. It. Marrubio, Erba apiòla.

Colli aridi Benacesi, e presso Pozzolengo. Maggio-Agosto.

Leonurus L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

L. cardiaca L. It. cardiaca.

Siepi e strade del piano (Mulino presso il Cimitero, siepi a Capriano). Giugno-Ottobre.

β. lanatus (2). Non ricordo il luogo ove l'ho colto.

L. Marrubiastrum L. (*Chaiturus Marrubiastrum* Rehb. Koch.) It. Nepitellone³.

Colli a Venzago, ed al Benaco, raro. Luglio-Agosto.

Ballota L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

B. nigra L. It. Ballota, Cimiciotto, Marrubiastro. Br. *Balòta*.

Siepi, ruderali, vie, frequentissimo ovunque. Giugno-Ottob.

(1) *B. hirta* Leyn. et *B. stricta* Art. sunt hujus speciei.

(2) Totus densa lanatus verticillis contiguus.

Scutellaria L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

S. galericulata L. It. Terzianaria.

Margini dei fossi, e luoghi umidi, frequente (S. Rustachio, Mompiano, Calcinato). Giugno-Agosto.

S. minor L. It. Scutellaria sanguigna.

In una risaja poco lungi da S. Gervasio, rara. Luglio-Ag.

Prunella L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

P. vulgaris L. It. Prunella, Consolida minore. Br. *Erba Ghisleta, Brünèla*.

Pascoli dal piano alle prealpi, frequentissima. Giugno-Nov.

P. glandiflora L. It. Morella maggiore. Br. *Erba Ghisleta, Brünèla*.

Pascoli dei colli e dei monti, brughiere del piano, frequente. Maggio-Agosto.

β . *pinnatifida* Koch. Sul colle la Margherita, frequente.

P. laciniata L. Bertol. (*P. alba* β . Koch.) It. Morella.

Colli secchi di Capriano e di Poncarale, abbondante. Giugno-Agosto.

Ajuga L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.

A. reptans L. It. Bùgola, Consolida media. Br. *Erba S. Maria*.

Pascoli e margini dei campi, del piano e dei colli, frequentissima. Marzo-Maggio.

β . *albiflora*. Qua e là colla specie, rara.

A. genevensis L. It. Bùgola silvana. Br. *Erba S. Maria*.

Colli secchi, frequente (alla Bornada).

β . *elongata* (1). Rupì a Nuvolento.

A. pyramidalis L. It. Bùgola rossa.

Rupì di Ravenola sulle Colombine; monti Cigoletto e Ron-denino. Luglio-Agosto.

A. Chamæpitys Schreb. It. Iva Artetica. Br. *Erba artetica*.

Còlti, strade, muri, rupi, frequente (a S. Francesco). Marzo-Settembre.

(1) *Folliis inferioribus et caulinis medlis in petiolum longum decurrentibus; caule elongato; verticillis subcontiguis, bracteis superioribus verticillo longioribus. Videtur transitum facere in sequentem.*

Tèuerlum L. Sist. Sex. Didyn. Gymnosp.**T. Botrys** L. It. Camedrio secondo.

Campi a Bogliaco e Toscolano, frequente. Ferrovia a Pazzolo. Luglio-Settembre.

T. Scordium L. (T. Scordium et Scordioides Koch.) It. Erba aglio, Scordio.

Luoghi palustri, frequente. (Fossi ad Iseo, risaje a Torbole). Giugno-Settembre.

T. Chamædris L. It. Querciola, Camedro. Br. *Calmeder*, *Erba China*.

Ciglioni dei campi, vie, muri, frequentissimo ovunque. Giugno-Agosto.

T. Scorodonia L. It. Scorodonia.

Selvette de' monti e delle prealpi, frequentissimo (Da Bovegno a Collio). Giugno-Agosto.

T. montanum L. It. Polio secondo, Ramerino montano. Br. *Erba Iva*.

Luoghi aspri e secchi de' colli e del piano. (Ronchi, Guglielmo, campagna di Calcinatello). Giugno-Agosto.

ORDO LXXXV. VERBENACEÆ.

Verbena L. Sist. Sex. Didynamia Angiospermia.**V. officinalis** L. It. Verbena, Erba croce, Erba sacra. Br. *Erba S. Gioan*.

Campi, vie, colli, frequentissima. Giugno-Novembre.

Coltivansi:

V. triphylla Herit. Br. *Erba timunsina*, *Erba luigia*, indigena del Chili. Le altre specie e le molte varietà di Verbene or coltivate sono quasi tutte dell'America.

Vitex Agnus-castus L. It. Vitice, Pepe de' monaci. Trovasi anche qua e là per le siepi, come al casello della ferrovia al Mella; ma è spontaneo nel litorale d'Italia.

ORDO LXXXVI. LENTIBULARIÆ.

Pinguicula L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.

P. alpina L. It. Erba da taglio di fior bianco.

- Dalle vette del Mufetto e del Dossalto scende fino a Caino lungo il Garza. Aprile-Luglio.

P. vulgaris L. It. Erba da taglio porporina. Br. *Erba de tai.*

Rupi umide e prati prealpini (Colombine frequente, Dossalto). Giugno-Luglio.

β. minor (1). Sulle estreme vette.

γ. major (2). Terreno grasso ed umido nelle depressioni.

Utricularia L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.

U. vulgaris L. It. Erba vescica, Uova di ranocchi. Br.

Oev de sacc.

Fossi e paludi, frequente. (Padule Lavajone a Venzago).

Maggio-Agosto.

U. minor L. It. Uova di botta minute. Br. *Oev de sacc.*

Paludi e fosse morte, frequente. (Lame Bissa e Pranduna).

Maggio-Luglio.

ORDO LXXXVII. PRIMULACÆ.

Lysimachia L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

L. Nummularia L. It. Erba soldina, Centimorbia. Br. *Soldarella.*

Margini erbosi dei campi e dei fossi, frequente. Magg.-Lugl.

L. nemorum L. It. Centonchio giallo.

Ai limiti erbosi d'un boschetto d'abeti sopra Bagolino. Giug.

L. vulgaris L. It. Lisimachia, Verga d'oro.

Siepi, boschetti, margini dei fossi, frequente. (Virle, Mazzano). Maggio-Agosto.

(1) Floribus fere duplo minoribus.

(2) Floribus duplo majoribus.

Anagallis L. Sist. Sex. Pent. Monog.

A. arvensis L. It. Anagallide, Centonchio rosso. Br. *Erba che fa cantà le galine.*

Vie, orti, campi, muri, frequentissima. Aprile-Ottobre.

A. cærulea Schreb. Bertol. It. Centonchio azzurro. Br. come sopra.

Luoghi stessi ove la precedente e spesso con essa frammista.

A. Monellii L. Sist. Nat. ? (1).

Campi magri di Prada al sud di Nave, ed ivi frequentiss.

Centunculus L. Sist. Sex. Tetrandria Monog.

C. minimus L. It. Centonchio.

Paludi e risaje, rara (Torbole). Giugno-Luglio.

Androsace L. Sist. Sex. Pentand. Monog.

A. alpina Lamk. (*A. glacialis* Hopp. Koch. Aretia penina Mur. Bert.) It. Sedo alpino stellato.

Ad una depressione nevosa d'una vetta del Broffione. Luglio.

A. tomentosa Gaud. Comol. (*A. imbricata* Lamk. Koch. Aretia tomentosa Schl. Bertol.). It. Sedo alpino cenerino.

Un solo gruppetto d'individui sul monte Marogna al confine Trentino.

A. Chamæjasme Hoff. It. Androface cigliata.

Rupi settentrionali dell'alpe di Vaja, rarissima. Luglio.

A. obtusifolia Allion. It. Gelsomino di montagna.

Rupi occidentali dell'alpi di Vaja, rara. Luglio.

Aretia Gaud. Sist. Sex. Pentand. Monog.

A. Vitaliana Koch (*Vitaliana primulaeflora* Bert.). It. Sedo alpino, Primofiore.

Rupi del Broffione al confine Trentino, rara. Luglio.

(1) Antecedentibus paullo maior: caule erecto, firmo; foliis lanceolatis acutis oppositis ternatis; corollæ lobulis suberosulis, dentibus undis vel glanduliferis. Flores elegantè rosei, fauce purpurecente. Altamen nisl clarissimorum virorum oblatet auctoritas, tres has species in unam colligerem.

Primula L. Sist. Sex. Pentand. Monog.

P. farinosa L. It. Primavera impolverata. Br. *Violine molene*.

Lame di Bagnolo, della Scòvola, di Ghedi e di Leno nella planura, abundantissima. Nei monti non l'ho peranco trovata. Aprile-Maggio.

β. *prœcera* (1). Colla specie.

P. longiflora All. It. Primavera di lungo collo.

Rupi del monte Mufetto, frequente. Luglio.

P. veris (*P. veris* × *L. Bert. P. officinalis* Koch.) It. Primavera odorata. Br. *Primaera*.

Selve e prati montani, frequente. (Guglielmo al sud).

Aprile-Maggio. Se ne coltivano parecchie varietà.

P. elatior Jacq. It. Orecchio di civetta, Primavera maggiore.

Selve e prati montani: coi fiumi discende talora al piano. Marzo-Giugno.

P. acaulis Jacq. It. Primavera minore. Br. *Primaera, Viale alde*.

Colli, eiglioni dei campi e dei fossi, dappertutto. Febr.-Glug.

β. *purpurescens*. Ad alcuni fossi suburbani, rarissima.

P. minima L. It. Orecchia d'orso ventagliata.

Somme rupi dei monti Dossalto e Vaja, rara. Luglio-Agosto.

P. glaucescens Morett. (*P. spectabilis* Koch ex parte)

It. Orecchia d'orso lanciata.

Vette del Guglielmo, frequentissima. Giugno-Agosto.

P. spectabilis Trattin. (*P. Polliniana* Moret. *P. spectabilis* Koch ex parte) It. Orecchia d'orso a mazzolini.

Pascoli della valletta Bertone oltre Caino, e dei monti di Lumezzane. Aprile-Maggio (2).

P. carniolica Jacq. It. Orecchia d'orso liscia.

Vette del monte Dossalto (Zanted.). Luglio-Agosto.

P. integrifolia L. It. Orecchio d'orso cigliata.

(1) Caulibus ex eadem radice 3-5. etiam sesquipetalibus.

(2) Differt ab antecedente foliis lanceolatis acuminatis, et floribus dimidio minoribus. — Num varietas?

Pascoli umidi delle alpi di Vaja, rara. Luglio-Agosto.

β. *brevis* (1). Ove la specie, ma meno rara.

P. villosa Jaq. It. Orecchia d'orso pelosa.

Vette delle Colombine, frequentissima. Monte Cigoletto a
Stabile solato. Luglio-Agosto.

P. pedemontana Thom. (*P. villosa* Bertol.) (2).

Ove l'antecedente.

β. *rhætica* Koch. Colla specie.

P. glutinosa L. It. Orecchia d'orso vischiosa.

Vette del monte Garzo al confine tirolese, rara. Lugl. Ag.

P. auricola L. It. Orecchia d'orso gialla. Br. *Cavèr zald*,
Orecia d'ors.

Rupi del Guglielmo a *Costaricca*; Fronden; Vette del Dos-
salto; Tremosine. Maggio-Giugno.

Molte varietà se ne coltivano ad ornamento.

Hottonia L. Sist. Sex. Pentandria Monogynia.

H. palustris L. It. Fertro, Scopa d'acqua.

Ai fossi palustri, frequente. (Clusane, Sirmione). Aprile.

Soldanella L. Sist. Sex. Pentand. Monog.

S. alpina L. It. Soldanella alpina.

Pascoli montani e prealpini, frequente. (Mufetto, Ario, Fron-
den). Giugno-Luglio.

S. pusilla Baume. It. Soldanella campanella.

Dorso e vette delle Colombine, frequente. Giugno-Agosto.

β. *minima* Hoppe. Colla specie nelle rupi umide.

Cyclamen L. Sist. Sex. Pentand. Monog.

C. europæum L. It. Pan porcino, Baccara. Br. *Bàcara*.

Boschetti, rupi dei monti e dei colli, frequentissimo (Sa-
rezzo lungo la via). Maggio-Ottobre.

C. hederæfolium Ait. It. Ciclamino, Pamporcino, Br. *Bà-
cara senza udùr*.

Rupi delle vette del Maddalena. Settembre-Ottobre. Rari-
simo di qua del Po.

(1) Scapo abbreviato unifloro, involucro nullo.

(2) *Fortasse varietas antecedentis cum qua promiscue crescit, quamvis mense præ-
coctius floreat.*

Sâmolus L. Sist. Sex. Pentand. Monog.

S. Valerandi L. It. Sâmolò, Lino d'acqua.

Fossi e stagni, poco frequente. (Lame di Bagnolo, Torbole e Lonato). Maggio-Giugno.

ORDO LXXXVIII. GLOBULARIÆ.

Globularia L. Sist. Sex. Tetrandia Monogynia.

G. vulgaris L. It. Morine, Bottonaria.

Tutti i colli, frequentissima. Marzo-Maggio.

G. nodicaulis L. It. Margherite azzurre.

Pascoli montani e prealpini, frequente. (Dragone, Fronden).

G. cordifolia. L. It. Vedovelle celesti.

Colli e monti; letto arenoso dei fiumi (Maddalena, Dragone, greti dell' Oglio). Aprile-Giugno.

ORDO LXXXIX. PLUMBAGINÆ.

Armeria Willd. Sist. Sex. Pentandria Pentagynia.

A. alpina Hop. (Statice vulgaris Bert. S. alpina Koch.) It.

Brillantini lisci.

Monte Broffone, in un pascolo sassoso, rarissima. Lug.-Ag.

ORDO XC. PLANTAGINÆ.

Littorella L. Sist. Sex. Monœcia Tetrandia.

L. lacustris L. It. Budellina acquatica.

Rive arenose del Sebino a Clusane, del Benaco a Sirmione.

Maggio-Luglio.

Plantago L. Sist. Sex. Tetrandia Monogynia.

P. major L. It. Piantaggine maggiore, Centinervia. Br. *Piantana, Orece d'azen.*

Prati, vie, ruderali, dappertutto. Maggio-Settembre.

P. media L. It. Piantaggine mezzana, Centinervia. Br. *Piantana.*

Prati, vie, margini, principalmente di collina, frequentissima.
Maggio-Giugno.

P. lanceolata L. It. Lanciolo, Piantaggine femmina. Br.
Lengua de ca.

Prati stabili e luoghi erbosi, frequentissima al piano e ai
monti.

β. spica composita. Colla specie.

P. montana Lam. (*P. alpina* Bertol.) It. Piantaggine nera.
Vette delle Colombine, frequentissima. Luglio-Agosto.

P. serpentina Lamk. (*P. maritima* L. Bertol.) It. Serpentina.
Colli e monti aprici al secco, frequentissima. (Badia, S. Eu-
femia, Riviera). Maggio-Settembre.

Segue la famiglia delle *Nyctagineæ* col genere *Mirabilis* della
Pentandria Monoginia, le cui specie coltivate volgarmente sono:

Mirabilis Jalapa L. It. Bella di notte, Br. *Maraè*, a fiori rossi,
gialli e screziati. Delle Indie orientali.

M. longiflora L. It. Bella di notte, bianca o violacea; Br. *Maraè*.
americana. Del Messico.

SUBCLASSIS IV. **MONOCLAMIDEÆ.**

ORDO XCI. **AMARANTHACEÆ.**

Amaranthus L. Sist. Sex. Monœcia Pentandria.

A. Blitum L. Bertol. (*A. sylvestris* Desf. Koch.) It. Blito
minore.

Campi, orti, vie, ruderali, frequente. (Ferrovia dalla Sta-
zione urbana al Mella). Luglio-Settembre.

A. adscendens Lois (*A. Blitum* Birol, Koch.) It. Blito
maggiore. Br. *Viadù*.

Orti e margini dei campi, frequente. Agosto-Ottobre.

A. retroflexus L. It. Blito spazzola. Br. *Viadù*, *Bidù*.
Campi, orti, ruderali, frequente. Luglio-Settembre.

A. hypocondriacus Pollin. (*A. patulus* Bertol.) It. Blito rosso.

Ruderati e vie, frequente. Luglio-Settembre.

Coltivasi per ornamento:

A. caudatus L. Br. *Cue*, *Discipline*, dell' Indie orientali.

Celosia cristata L. Br. *Greste*, *Smassete*, *Gelosie*, dell' Indie.

Gomphrena globosa L. Br. *Sempiterni ross o bianc*, dell' Indie.

ORDO XCII. PHYTHOLACEÆ.

Phytholacca L. Sist. Sex. Decandria Decagynia.

Ph. decandra L. It. Fitolacca, Uva di Spagna. Br. *Verzi*, *Ua Spagna*.

Originaria dell' America, ora da noi spontanea nelle siepi e nei ruderati. Dalle sue bacche si trae il bel colore detto *Rosso d'amaranto*. Br. *Amarant*.

ORDO XCIII. CHENOPODEÆ.

Polygonum L. Sist. Sex. Triandria Monogynia.

P. Arvense L. It. Canforata bastarda.

Campi arenosi presso Pontoglio, rarissimo. Luglio.

Kochia Roth. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

K. scoparia Schrad. It. Beebèri, Belvedere. Br. *Sciùe*, *Garnère*.

Margini ombrosi dei campi (Folzano). Luglio-Agosto. Coltivasi per farne scope.

Chenopodium L. Sist. Sex. Pentand. Dig.

C. Vulvaria L. Koch. (*C. olidum* Bertol.) It. Vulvaria, Erba puzzolona. Br. *Erba che spæssa de bacalà*.

Vie, ruderati, poco frequente. (Presso Fiumicello; Conicchio). Giugno-Settembre.

C. album L. It. Spinace selvatico, Cencio molle. Br. *Farinei*.

Margini dei campi, frequentissimo. Giugno-Settembre.

β. *viride* L. Colla specie, frequente.

- C. ambrosioides L.** It. *Chenopodio ambrosioides*.
Campi ed orti umidi della bassa (sentiero da Pontevico allo
Sirono) Giugno-Agosto.
- C. murale L.** It. *Spinace selvatico*, *Piè d'oca*. Br. *Farinei*.
Ruderati, appiè dei muri dappertutto. Luglio-Settembre.
- C. urbicum L.** It. *Piè d'anatra*. Br. *Farinei*.
Come l'antecedente, ma più raro (muri a Capriano). Lu-
glio-Settembre.
- C. polispermum L.** It. *Polispòro*, *Bieta grappolosa*.
Campi, vie, non tanto frequente. (Ferrovia al Melia, Vero-
ianuova). Luglio-Settembre.
- C. opulifolium Scrad.** It. *Piè di pàpero*.
Campi, vie, orti, poco frequente. Giugno-Settembre.
- C. hybridum L.** It. *Spinace velenoso*.
Colle di Poncarale, e presso la chiesa, raro. Giugno-Sett.
- C. Botrys L.** It. *Botri*, *Pazienzia*.
Lungo il Chiese oltre Montechiaro, rarissimo. Luglio-Ottobre.
- C. Bonus Henricus L.** (*Blitum Bonus-Henricus Koch.*)
It. *spinacio selvatico*, *Tutta buona*, *Bono Enrico*. Br.
Staràss.
Monti e prealpi presso le stalle, frequentissimo. (Dragone,
Conche, S. Colombano). Maggio-Agosto.

Atriplex L. Sist. Sex. Polygamia Monœcia.

- A. angustifolia Smith Bertol.** (*A. patula Koch.*) It. *Erba*
coreggiola.
Campi, vie, siepi, dumeti, frequentissima. Luglio-Settembre.
- A. patula Smith Bertol.** (*A. latifolia Koch.*) It. *Atriplice*
triangolare.
Nelle stesse località ma più rara (Sirmione). Agosto-Sett.

Si coltivano per alimento:

Beta L. Sist. Sex. Pent. Dig.

- B. vulgaris L.** It. *Barbabietola*. Br. *Raavieda*, da cui si trae
zucchero.
- B. Cicla L.** It. *Bietola da erbucchie*. Br. *Erbe*.

Le quali due specie presentate come distinte da Linneo, e da altri autori, derivano, secondo Koch, per lunga cultura dall' unica specie selvatica *B. vulgaris* L. che cresce spontanea sul litorale Adriatico.

Spinacia L. Sist. Sex. Diœcia Pentandria.

S. oleracea L. It. Spinace. Br. *Spinasse*.

β. *inermis*. La specie e la varietà sono di provenienza incerta.

Segue la famiglia delle Begoniaceæ, cui appartiene la specie *Begonia discolor*, Bresc. Bela de dre, originaria della China.

ORDO XCIV. POLIGONÆ.

Rumex L. Sist. Sex. Hexandria Trigynia.

R. acetosella L. It. Acetosa minore. Br. *Erba de S. Gioan*, *Erba salina*, *Galei*, *Scorlôgg*, *Panvi*.

Prati dal piano ai monti, frequentissima. Aprile-Maggio.

β. *multifidus* Bertol. Colline a Montechiaro.

R. arifolius All. Koch (*R. montanus* Bertol.) It. Gichero di montagna.

Prati delle prealpi (Mufetto, Ario). Giugno-Luglio.

R. acetosa L. (*R. pseudo acetosa* Bertol.) It. Erba brusca selvatica. Br. *Galei*, *Panvi*, *Pancûc*, *Paciûc*.

Prati dal piano ai monti, frequentissima. Maggio-Giugno.

R. scutatus L. It. Acetosa romana, Acetosa tonda. Br. *Erba salina*.

Sponde del lago d' Idro, muri da S. Colombano al Giogo. Maggio-Giugno.

R. alpinus L. It. Rabarbaro alpino. Br. *Ræmes*, *Lapäss*.

Monti e prealpi presso le stalle (Guglielmo, frequentissimo). Giugno-Agosto.

R. pulcher L. It. Cavolaccio, Rombice selvatica. Br. *Mainôcc*.

Margini delle strade e dei campi, frequentissimo. Mag.-Giug.

R. obtusifolius L. It. Rombice dei prati. Br. *Maine*, *Ræmes*.

Prati e luoghi erbosi dal piano ai monti, frequentissimo. Maggio-Giugno.

R. Nemolapathum Ehrh. (*R. acutus* L. Bertol. *R. conglomeratus*. Murr. Koch.) It. Romice campestre. Br. *Maine*, *Ræmes*.

Strade, campi, prati umidi dal piano ai monti, frequente. Maggio-Ottobre.

R. sanguineus L. *viridis* Koch? (1).

Prati fertili sopra Pezzoro in val di Pezaze. Luglio-Agosto.

R. crispus L. It. Rombice crespo, Lapazio, Rombice cavolajo. Br. *Ræmes*, *Maine*.

Margini dei fossi, e luoghi erbosi, frequentissimo. Mag.-Giug.

R. Hydrolapathum Huds. It. Tabacco di palude. Br. *Mainöce*.

Ai fossi, nelle lame e nelle risaje, frequente. Maggio-Giugno.

Oxtrila Hill. Sist. Sex. Hexandria Trigynia. (Sed hæc species digyna).

O. digyna Hill. (*Rumex digynus* L. Bertol.) It. Acetosa soldanella.

Muriccioli e rupi di pascoli prealpini, rara (alpi di Vaja). Luglio-Agosto.

Polygonum L. Sist. Sex. Octandria Trigynia.

P. hydropiper L. It. Pepe d'acqua. Br. *Erba pèer*, *Pèer d'acqua*, *Bruzaboca*.

Ai fossi e in luoghi umidi, frequentissimo. Giugno-Settem.

P. mite Schrank. (*P. laxiflorum* Ten. Bertol.) It. Persicario dolce.

Coll' antecedente. Giugno-Ottobre.

P. persicaria L. It. Persicaria, Salcerella. Br. *Galei de luff*.

Fossi, margini umidi dei campi e delle vie, frequentissimo. Luglio-Ottobre.

P. lapathifolium L. It. Persicaria maggiore, Persicaria punteggiata.

(1) Folia omnibus petiolatis, radicalibus caulisque inferioribus lato-deltoidenatis, successivis ellipticis sensim minoribus, obtusis omnibus planisque: verticillis inferioribus foliis fultis, cæteris nudis; perigonii laciniis oblongo-linearibus integerrimis vel utrinque unidentatis, unica callifera.

Qua e là ai fossi, poco frequente (Lungo il Boa; ferrovia a S. Francesco). Luglio-Agosto.

P. amphibium L. It. Persicaria anfibia.

- α . *nalans* Moench. Al Sebino presso Iseo.
 β . *cænosum* Koch. Ad Iseo, e alla Fenice.
 γ . *terrestre* Leers. Ferrovia presso Brescia.

} Giugno-Luglio.

P. viviparum L. It. Bistorta minore.

Pascoli prealpini, frequente (Guglielmo, Vaja, Ario). Luglio-Agosto.

P. Bistorta L. It. Bistorta, Serpentina.

Pascoli prealpini, frequentissimo (Ario, S. Colombano, Guglielmo). Giugno-Agosto.

P. aviculare L. It. Centinodia, Coregiòla. Br. Erba de la Madona, Scorazola.

- α . *prostratum* } vie, campi, margini, ruderali, frequentissi-
 β . *erectum* } mo. Luglio-Ottobre.

P. Bellardii All. (P. aviculare x Bertol.) (1).

Campi a frumento fra il Benaco e Pozzolengo, frequentissimo. Giugno.

P. alpinum All. It. Persicaria alpina.

Pascoli del monte Gazzo, rarissimo. Luglio-Agosto.

P. minus Huds. It. Persicaria delle risaje.

Fossi paludosi a Sirmione, e sul Mufetto; risaje, frequente. Luglio-Settembre.

P. Convolvulus L. It. Convolvolo nero, Erba saettina.

Siepi, campi, boschetti del piano e de' colli, frequente. Agosto-Settembre.

P. dumetorum L. It. Convolvolo nero, Erba saettina.

Come il precedente, ma più abbondante. Agosto-Settembre.

Coltivansi per i semi farinosi e per foraggio:

P. Fagopyrum L. It. Grano saraceno, Br. Formentia negher.

P. Tataricum L. It. Grano di Tartaria, Br. Siberia.

P. orientale L. It. Code. Br. Grana; coltivasi pei fiori, e proviene esso pure dall'Asia.

(1) *Plantae habitus, praesertim in loco natali, ab antecedente satis diversus.*

Il *Rheum compactum* L. It. Rabarbaro, Br. *Reo barbaro*, è un' erba della China, coltivato in Inghilterra ed in Germania per la radice compatta, medicinale.

ORDO XCV. THYMELEÆ.

Passerina L. Sist. Sex. Octandria Monog.

P. annua Wikström (Stellèra Passerina L. Bertol.) It. Linaria.

Campi e colli arenosi (Desenzano, Lonato, Montechiaro, Carpenedolo) Luglio-Ottobre.

Daphne L. Sist. Sex. Octandria Monog.

D. Mezereum L. It. Mezzereu, Dafnoide.

Tutte le selvette montane e prealpine (Dragone, Serle). Marzo-Maggio.

D. Laurèola L. It. Laurèola, Pepe montano. Br. *Erba caguna*.

Colline e bassi monti, poco frequente (valletta Bertone). Aprile.

D. alpina L. It. Olivella.

Fessi delle rupi prealpine (monte Pajo). Giugno-Agosto.

D. Cneorum L. It. Cneoro, Timelèa odorosa.

Vette di Pajo, del Dossalto, del Mufetto. Giugno-Agosto.

ORDO XCVI. LAURINDÆ.

Laurus L. Sist. Sex. Enneandria Monog.

L. nobilis L. It. Lauro, Alloro. Br. *Laoro*.

Spontaneo sui colli benacesi: coltivasi dappertutto. Marzo-Aprile.

Il *L. Cinnamomum*, donde si stacca la scorza, detta *Cannella*, è dell' isola di Giava.

Il *L. Camphora*, onde viene la *Canfora*, è della China e del Giappone.

ORDO XCVII. SANTALACEÆ.

Thesium L. Sist. Sex. Pentand. Monog.

T. linophyllum Bertol. (*T. intermedium* Koch) It. Alchimilla linajola.

Colli e monti nelle selvette, frequente (Costalunga). Maggio-Luglio.

β. *montanum* Ehrh. (*T. linophyllum* β. Bertol.). Dragone.

T. pratense Ehrh? (1).

Monte Dragone, rarissimo.

T. alpinum L. It. Casia alpina.

Luoghi sassosi prealpini (Guglielmo, Mufetto, le Zerle). Giugno-Luglio.

ORDO XCVIII. ELÆAGNEÆ.

Hippophae L. Sist. Sex. Diœcia Tetrandria.

H. rhamnoides L. It. Olivella spinosa.

Sabbie alle rive dei fiumi (Oglio sotto Pontevico, Chiese a Bedizzole). Aprile-Maggio.

ORDO XCIX. ARISTOLOCHIEÆ.

Asarum L. Sist. Sex. Dodecandria Monog.

A. europæum L. It. Asara baccara, Renella.

Boschetti della valletta Pendolina da Collebeato al Campiani. Marzo-Maggio.

Aristolochia L. Sist. Sex. Gynandria Hexandria.

A. rotunda L. It. Aristolochia rotonda.

Colline fra Venzago e Pozzolengo, rara. Maggio-Giugno.

- (1) Radice fusiformi, caulibus paniculatis, foliis lanceolato-linearibus, obsolete ternatis, bracteis ternis, perigonii laciniis sub anthesi horizontaliter patentibus. Defectu tamen speciminum fructiferorum dubium omnino tollere non sum ausus.

A. pallida Willd. It. Aristolochia gialla.

Prati ad Agnosine, S. Bartolomeo presso Salò, a Segonazzo presso Dovegno, poco frequente. Aprile-Maggio.

A. Clematidis L. It. Aristolochia Clematite. Br. *Sæchili salvadeg.*

Luoghi incolti, ruderali, margini dei campi, frequente. (Castello, ronchi). Maggio-Giugno.

ORDO C. EMPETREÆ.

Empetrum L. Sist. Sex. Diœcia Triandria.

E. nigrum L. It. Erica baccifera.

Rupi umide delle vette di Vaja, rarissimo. Luglio-Agosto.

ORDO CI. EUPHORBIACÆ.

Buxus L. Sist. Sex. Monœcia Tetrandria.

B. sempervirens L. It. Bosso, Bòssolo. Br. *Martel.*

Spontaneo in cespiti sul colle di Mompiano. Coltivasi ad ornamento. Aprile-Maggio.

Euphorbia L. Sist. Sex. Dodecandria Trigynia.

E. camæsyce L. It. Erba pondina, Fico per terra.

Vie della città, orti, giardini, poco frequente. Luglio-Ottob.

E. maculata L. (E. trinervis Bertol.) It. Peglio macchiato.

Colline al sud del Benaco, poco frequente. Luglio-Ottob.

E. dulcis Jacq. (E. purpurata Bertol. E. verrucosa Cesati)

It. Titimàlo bitorzoluto. Br. *Latarèi.*

Selvette ombrose (Costalunga, Collebeato, Conche, lungo

l'Oglio tra Paratico e Palazzolo). Aprile-Giugno.

β. purpurata Thuill (1). Più frequente della specie.

E. helioscopia L. It. Erba calenzòla. Br. *Erba lataræla, Rogna.*

Margine dei campi, rive, orti, frequentissima. Febbr.-Dicem.

(1) Capsula verrucosa, non tamen pilosis

- E. verrucosa* Lamk. Koch (*E. dulcis* Bertol. *E. flavichoma* DC.). It. Titimalo dolce. Br. *Erba lатарæla*.
Colli, rupi, vigne, frequente (Badia, Costalunga, Nave).
Marzo-Maggio.
- E. epithymoides* L. It. Erba fragolosa.
Colli secchi e rupestri a Nave, frequente. Maggio-Giugno.
- E. carniolica* Jacq. It. Titimalo penzolo.
Boschetti dei colli e dei monti (Val Bertone a Caino, Val
piana sopra Serle). Aprile-Maggio.
- E. palustris* L. It. Esula maggiore. Br. *Erba lатарæla*.
Fossi paludosi al sud del Benaco, frequente. Aprile-Giugno.
- E. procera* M. Bieb. Koch. (*E. pilosa* Pollin. non Bertol.).
In mezzo alla lama la Bissa. Giugno-Luglio.
- E. coralloides* Bertol? (1).
Lame tra Ghedi e Leno, frequentissima.
- E. gerardiana* Jacq. It. Esula linoide
Campagna di Montechiaro e Ghedi, frequentissima. Apr.-Lug.
- E. nicæensis* All. It. Titimalo olivello. Br. *Rogna*.
Campagna di Calcinaletto, frequentissima. Giugno-Luglio.
- E. amygdaloides* L. It. Tertomaglio di selva. Br. *Latarei*,
Rogna.
Selve de' colli e de' monti, e lungo il Mella, frequentissima.
Marzo-Maggio.
- E. platiphylla* L. It. Titimalo palustre. Br. *Erba lатарæla*,
Rogna.
Campi umidi e loro margini, rive de' fossi, frequente. Mag-
gio-Settembre.
- β. stricta* L. (2). Colla specie.
- E. cyparissias* L. It. Erba cipressina. Br. *Latarei*, *Rogna*.
Colli, margini delle strade e dei campi, frequentissima. Feb-
brajo-Ottobre (3).

(1) Capsulis levibus pilosissimis, foliis integerrimis.

(2) Seminum verrucis elongato cylindricis.

(3) Quandoque folia correpta a fungo croceo (*Oecidium cyparissim*) sunt latiora,
obtusata et flavida.

E. Esula L. It. Esula minore.

Siepi a Forca-di-cane, e alla Volta, rara. Aprile-Maggio.

β . minor (1). Margini dei campi a Ghedi presso la lama *Fransina*, abbondante.

E. variabilis Cesati, Bertol. It. Calenzòla montana.

Vette dei monti calcari di Val Bertone sopra Caino nella regione del faggio, rara. Aprile-Maggio.

E. Peplus L. It. Calenzòla piccola. Br. *Latarei, Rogna.*

Campi, orti, vie, frequentissima. Marzo-Agosto.

E. falcata L. It. Calenzòla aristata. Br. *Latarei ecc.*

Ferrovia presso Brescia, Campagnola di Calcinatello, frequentissima. Marzo-Settembre.

E. exigua L. It. Esola sottile.

Campi, pascoli arenosi, rara. (Quinzanello fra le messi). Maggio-Agosto.

E. Lathyris L. It. Cutapuzia, Gomitoria. Br. *Tend a Port.*

Raramente qua e là negli orti e nei giardini della provincia, specialmente nella Riviera. Maggio-luglio.

***Mercurialis* L. Sist. Sex. Diœcia Enneandria (In Bertolonii Fl. Ital. ex errore typ. Monœcia).**

M. perennis L. It. Mercorella bastarda. Br. *Mercorella bastarda.*

Colli e monti (S. Gottardo, Maddalena, Collebeato). Mar. Apr.

M. annua L. It. Mercorella, Puzzoncella. Br. *Mercorella.*

Campi, orti, vigne, ruderali, siepi, frequentiss. Mag.-Set. (2).
Cultivasi:

Ricinus communis L. Br. *Ricino, Manteca*, dell'India, per ornamento, e per l'olio purgativo dei semi.

Da alcuna specie del genere *Siphonia* Schreb. dell'America tropicale stilla per incisione il *Cautchou*, o *Gomma elastica*.

Dal *Croton tilius* L. delle Molucche si estrae l'olio di *Croton-tiglio*.

(1) Follis obverse lanceolato-linearibus.

(2) Hanc vidi sæpe in muris hieme perdurantem et denique Martio-Aprili florentem.

Dal *Croton tinctorium* L. della Francia, si cava la tintura detta di *tornasole*.

Dalla *Jatropha Manihot* L. dell'America si trae la *Tapioca*.

ORDO CII. URTICÆ.

Urtica L. Sist. Sex. Monœcia Tetrandria.

U. urens L. It. Ortica piccola. Br. *Ortiga*, *Ortighela*.

Ruderati, appiè dei muri anche della città, frequente. Maggio-Settembre.

U. dioica L. It. Ortica, Urtica. Br. *Ortiga*.

Dal piano alle prealpi, frequentissima. Giugno-Settembre.

Parietaria L. Sist. Sex. Tetrandria Monogynia.

P. officinalis L. It. Cimiciatola, Erba vitriola. Br. *Erba Sæmega*, *Erba Fedriæla*.

Muri, vie, rupi, frequentissima. Aprile-Giugno.

α. erecta Koch. }
β. diffusa Koch. } dappertutto.

Cannabis L. Sist. Sex. Diœcia Pentandria.

C. sativa L. It. Canape. Br. *Canef*.

Originario della Persia, coltivasi ora comunemente, e cresce spontaneo nella bassa provincia, p. es. a S. Gervaso, dove a memoria d'uomo non fu mai coltivato.

Humulus L. Sist. Sex. Diœcia Pentandria.

H. Lupulus L. It. Luppolo. Br. *Loertis*.

Siepi e boschetti dal piano ai monti, frequentissimo. Luglio-Agosto. Serve alla fabbricazione della birra.

Ficus L. Sist. Sex. Polygamia Monœcia.

F. Carica. L. It. Fico. Br. *Fic salvadeg*.

Frequentemente selvatico ne' muri e nelle rupi de' colli e ai laghi, fiorisce in Agosto e Settembre. Le piante coltivate, se fruttificano due volte, fioriscono prima in Giugno, d'onde i frutti maturati diconsi *Fichi fiori*, Br. *Fiure*; indi in Agosto o Settembre.

Le principali varietà coltivate sono le seguenti:

1. Verdi, piccoli, ovato-oblungi, *Fic de la gossa*.

2. Neri, ovali, *Fic negher*.
3. Bruno-violacei, ovali, con peduncolo grosso, *Fic beriti*.
4. Bruno-verdi, grossi a forma di cipolla, *Fic de la marca*.
5. Bianco-giallognoli quasi rotondi, piccoli, *Fic de la Madona*.
6. Verdi colla sottopelle rossa, *Fic verca*.

I fichi secchi ci vengono quasi tutti dall' Italia meridionale.
Dal *F. indica* L. dell' India, e dal *F. religiosa* Willd. della
China, stilla la Gomma lacca.

Il vero *Sicomòro*, albero caro ai poeti e ai romanzieri, è il
Ficus Sycomòrus L. dell' Arabia e dell' Egitto.

Cultivansi

Morus L. Sist. Sex. Monœcia Tetrandria.

M. nigra L. It. Moro nero: frutti grossi, neri; indigeno dell' Italia, è coltivato assai di raro per frutti aciduli.

M. alba L. It. Moro, Gelso. Br. *Mar* qui trasportato dalla China a frutti più piccoli dolci, bianchi, rossi o neri.

M. cucullata Bonaf. It. Moro delle Filippine.

M. papirifera L. della China e del Giappone: ornamento dei viali e dei giardini.

Celtis L. Sist. Sex. Polygamia Monœcia.

C. australis L. It. Bagolaro, Fragiraco, Loto ciriegio.
Br. *Romiglie*.

Colli aprici, frequentissimo Al piano nelle siepi e in grandi alberi. Maggio.

Ulmus L. Sist. Sex. Pentandria Digynia.

U. campestris L. It. Olmo. Br. *Ulem*, *Ormizi*, *Ormadel*.
Selve, margini dei campi, siepi, frequente. Marzo-Aprile.

β. suberosa Nelle stesse località, frequente.

Il *Piper nigrum* L. (Sist. Sex. Triandria Dig.), It. Pepe nero,
Br. *Pèer*, è delle Indie orientali.

ORDO CIII. JUGLANDÆ.

Juglans L. Sist. Sex. Monœcia Poliandria.

J. regia L. It. Noce. Br. *Nüss*.

Originario della Persia, ora ovunque coltivato, e quasi spontaneo sui bassi monti. Le varietà sono poche, e poco

distinte: quella a frutti assai grossi, ma col gheriglio tuttavia piccolo, è detta nel vernacolo *Nuss sàchèra*.

Coltivasi come albero d'ornamento ai viali e ai giardini:

- J. Nigra* dell'America settentrionale, Br. *Nuss moscada* (da non confondersi colla vera *Noce moscata* aromatica, che è delle Isole Molucche, ed appartiene alla famiglia delle *Myristiceæ*, ed è la *Myristica moschata* L. Uno degli involucri di questo frutto dicesi comunemente *Macis*.

ORDO CIV. CUPULIFERÆ.

Fagus L. Sist. Sex. Monœcia Polyandria.

F. sylvatica L. It. Faggio. Br. *Fò*.

Monti e prealpi, frequente. (Monti di Conche). Mag.-Giug.

Castanea Tourn. Sist. Sex. Monœcia Polyandria.

C. vesca Willd. (*C. vulgaris* Lamk.) It. Castagno. Br. *Castègna*.

Cresce spontanea fra le rupi, ma coltivasi largamente con alcune varietà, fra cui il Marone, Br. *Marù*, a frutto molto più largo che lungo, segnato da strie più chiare longitudinali, ed assai saporito.

Quercus L. Sist. Sex. Monœcia Polyandria.

Q. sessiliflora Smith. (*Q. Esculus* et *Q. Robur* Pollin.).

It. Quercia Roverella. Br. *Rùer*, *Seradèl*.

Tutti i colli e bassi monti, formandovi anche de' boschi. Apr.

Q. Esculus L. Bertol. It. Eschio, Quercia castagnola, Quercione.

Frequenti di là dal Po, ma raro da noi. (Riviera). Aprile.

Q. pedunculata Ehrhart. Koch. Pollin. (*Q. Robur* L. Bert.)

It. Farnia. Br. *Rùer*.

Frequente principalmente nel piano (lungo l'Oglio da Pazzolo a Sarnico, Rivoltella, Desenzano, Salò).

Q. pubescens Willd. It. Quercia molle. Br. *Seradèl*.

Colli e bassi monti, raro (a S. Eufemia). Aprile.

Q. Cerris L. It. Cerro, Ghianda amara. Br. *Ser*.

Rupi e luoghi sassosi de' monti, raro, Maggio.

Q. Ilex L. It. Leccio, Elice. Br. *Èless, Less.*

Colli benacesi, frequente. Maggio.

β . spinulosus. Ove la specie.

Il *Q. Suber* dal cui tronco staccasi la corteccia detta Sovero, Sughero, Br. *Legnàss, Sùer*, è indigeno dell'Italia media e bassa, e delle isole.

Le Noci di galla Br. *Gale, Boriline de riser*, determinate dalla puntura e dalla presenza d'insetti (*Cynips*), crescono sulle nostre querce; ma le migliori ci vengono dall'Asia minore formate sulla *Q. infectoria* L.

Corylus L. Sist. Sex. Monœcia Polygamia.

C. Avellana. L. It. Avellana, Nocciuola. Br. *Nessæla tonda.*

Colli e monti, frequentissima, ove forma estesi boschetti. febbrajo-Aprile.

C. tubulosa Willd. It. Nocciuolo tubuloso. Br. *Nessæla longa.*

Colla precedente.

Colla coltivazione si ottennero e dall'una e dall'altra specie frutti molto più grossi e saporiti. Br. *Olâne, Nessoloca.*

Carpinus L. Sist. Sex. Monœcia Polyandria.

C. Betulus L. It. Càrpino, Càrpigno. Br. *Càrpen.*

Colli e monti ne' boschetti, e sulle rupi, frequente. Se ne fanno siepi. Aprile.

Ostrya Micheli. Sist. Sex. Monœcia Polyandria.

O. carpinifolia Scop. (*O. vulgaris* Willd. Bertol.) It. Ostrìa, Càrpino nero. Br. *Tàera.*

Colli e monti nelle selvette e nelle siepi, frequente (S. Gotardo). Aprile.

ORDO CV. SALICINEÆ.

Salix L. Sist. Sex. Diœcia Diandria.

S. pentandria L. It. Salcio odoroso. Br. *Salghèt.*

Selvette presso Bovegno a *Zigole*, raro. Maggio.

S. fragilis L. It. Salcio fragile. Br. *Salghèt.*

Lungo i fossi presso Mompiano, raro. Aprile.

- S. alba L. It. Salcio, Salicone, Salcio da pali. Br. *Sàles*.
Rive de' fiumi e de' torrenti, frequente. Coltivasi ovunque
nel piano. Marzo-Maggio.
- S. vitellina L. Salcio giallo, Vetrice giallo. Br. *Stropei zalcc*.
Ove il precedente, frequente. Coltivasi per trarne i vimini.
- S. triandria L. Bert. (S. *amigdalina* « et β . Koch.). It.
Salcio da fare le ceste. Br. *Sàles de sestèi*.
Margini de' fiumi e de' ruscelli del piano. Coltivasi estesamente
fuori di provincia. Aprile-Maggio.
- S. pontederiana Willd. It. Salcio tirolese.
Piano sotto il fianco settentrionale del monte Catino. (Zant.).
Aprile.
- S. purpurea L. (S. *monandra* Pollin.) It. vimini. Br.
Sbri, *Stropei salvadeg*.
Lungo il Mella, il Chiese ed i torrentelli, frequentissimo.
Marzo-Aprile.
- β . *Helix* L. Koch. Coltivasi nei vimini. Br. *Pèndol*, *Stropei ross*.
- S. daphnoides Vilar. It. Salcio barbato.
Qua e là coltivato, p. es. alla ferrovia presso il Mella.
- S. rosmarinifolia L. It. Salcio alpino.
Val di Paver presso il Blennone (Zant.).
- S. viminalis L. It. Vimini. Br. *Pèndol*, *Stropei*.
Coltivasi nei vimini alle rive dei fossi, e in luoghi umidi.
Aprile.
- S. incana Schrank. (S. *riparia* Willd. Bertol.) It. Salcio
ripajolo. Br. *Sbri*, *Salghèt*, *Salèzèt de rie*.
Dense macchie lungo i fiumi ed i torrenti, frequentissimo.
(Mella). Aprile.
- S. cinerea L. (S. *acuminata* et *cinerea* Poll.) It. Salcio
cenerognolo. Br. *Sbri*.
Lungo i fiumi ed i torrenti, frequente. (Seriola Fusa). Marzo.
- S. grandifolia Sering (S. *aurita* et *polymorpha* Pollin.)
It. Salcio stipoloso.
Lungo la seriola Fusa, e sulla via da Bovegno a Collio.
Marzo-Aprile.

S. nigricans Fries Bertol. (*S. hastata* et *Wulfeniana* Pollin.). It. Salcio silvano. Br. *Salghèt*.

In larghe macchie sui dorsì settentrionali del Guglielmo e del Rondenino. Aprile-Maggio.

S. Caprea L. It. Sàlica. Br. *Gàtol*.

Selve montane, e ai torrenti, frequente. Marzo-Aprile.

S. spathulata Willd? (1).

S. glabra Koch. (*S. corruscans* Willd.) It. Salcio lucido.

Br. *Gatol de montagna*.

Vette del monte Fronden, ed alle Zerle. Maggio.

S. repens L. It. Salcio sdrajato.

Qua e là lungo il Mella in Valle Trompia. Aprile.

S. Myrsinites L. It. Mirsinite.

Piano, sotto le vette del monte Catino, e sul Blennone. Giug.

S. reticulata L. It. Salcio reticolato.

Rupi sui monti Pajo, Fronden e Dossalto, frequente. Luglio-Agosto.

S. retusa L. It. Salcio sermellino.

Vette dei monti Fronden, Blennone e Cigoletto. Luglio-Ag.

S. herbacea L. It. Salcio sassatile.

Sommità dei monti Vaja e Blennone. Luglio-Agosto.

Cultivasi per ornamento:

S. babylonica L. It. Salice piangente. Br. *Salce piangente*, dell'Asia.

Pòpulus L. Sist. Sex. Diœcia Octandria.

P. alba L. It. Alberello, Pioppo bianco. Br. *Albera molenera*.

Selve umide e lungo i fossi spontanea, e frequentemente coltivata. Marzo-Aprile.

P. canescens Smith. It. Pioppo gatterino. Br. *Albarèta molenera*.

Qua e là lungo i fossi, rara. Marzo-Aprile.

(1) Conveniant in meo exemplari notæ foliorum, stipularum et gemmarum; sed amenta desunt.

P. tremula L. It. Albarello, Tremolo, Br. *Albarela*.

Colli e monti nei boschi, frequente. Marzo-Aprile.

P. nigra L. It. Àlbero, Pioppo. Br. *Albera*, *Piòpa*.

Luoghi umidi, e lungo le acque frequentissimo. Marzo-Apr.

P. pyramidata Manh. It. Pioppo italico. Br. *Albarot*, *Albera pina*.

Spontaneo lungo il Po, coltivato da noi, e qua e là sporadico in luoghi umidi e sabbiosi. Marzo-Aprile.

ORDO CVI. BETULINÆ.

Bètula L. Sist. Sex. Monœcia Polyandria.

B. alba L. It. Bètula, Betulla, Bidollo. Br. *Bédola*.

Selve dei monti e delle prealpi, frequente. Aprile-Maggio.

B. nana L. It. Bètula nana.

M. Broffione dalle *Crocette* alle foreste di *Brumino*. Luglio.

Alnus Tournef. Sist. Sex. Monœcia Tetrandria.

A. viridis DC. (*Betula ovata* Pollin.) It. Ontano verde.

Br. *Maròss*.

Al Castellino presso Collio, e sul monte Ario, abbondante. Maggio-Giugno.

A. incana DC. (*Betula incana* Pollin.). It. Ontano peloso.

Colli di *Prada* a mezzodì di Nave, rara. Aprile.

A. glutinosa L. It. Ontano, Alno. Br. *Onèss*.

Selve umide e luoghi acquosi, frequente. Coltivasi per le siepi. febbrajo-Marzo.

Coltivasi pel viali e nei giardini:

Platanus L. Sist. Sex. Monœcia Poliandria. Fam. Natur. *Amentaceæ* Juss. *Platanæ* Lestib.

P. orientalis L. It. Platano. Br. *Platen*, dell'Asia minore.

P. occidentalis L. It. Platano d'America.

ORDO CVII. CONIFERÆ.

Taxus L. Sist. Sex. Diœcia Monadelphia.

T. baccata L. It. Libo. Tasso, Nasso, Veleno. Br. *Nass*,

Tass.

Selvette a Marmentino, a Cimmo, a Bovegno. Un gigantesco individuo maschio sta sopra le sorgenti di Mompiano. Marzo-Aprile.

Juniperus L. Sist. Sex. Diœcia Monadelphia.

J. communis L. It. Ginepro. Br. *Zenér*.

Colli e monti, frequentissimo. Marzo-Maggio.

J. nana Willd. It. Ginepro sdrajato. Br. *Zenér*.

Vette delle prealpi, frequente. Giugno-Agosto.

Il *J. Sabina* L. It. Sabina, Br. *Erba Sabina*, cresce in Val Malenco sopra Sondrio.

Coltivansi comunemente come alberi d'ornamento:

Cupressus sempervirens L. It. Cipresso. Br. *Pi*, *Siprés*, indigeno del litorale Mediterraneo, e quasi spontaneo nella Biviera benacese.

Thuja occidentalis L. It. Tuja, Br. *Tifa* indigena dell'America: si taglia ad uso siepe.

Pinus L. Sist. Sex. Monœcia Monadelphia.

P. Mughus Scop. Bertol. (P. Pumiliò Haenke). It. Mugo. Br. *Mægh*.

Vette prealpine fra la Valtrompia e la Valsabbia; manca alla catena tra Valtrompia e Valcamonica. Maggio (1).

P. sylvestris L. It. Pino selvatico. Br. *Pi salvadeg*.

Boschi presso Bovegno, e qualche individuo a Tremosine.

Sul colle Badia è coltivato. Aprile-Maggio.

P. picea L. (*Abies pectinata* DC.) It. Abete maschio, Pino bianco. Br. *Avèss*.

Selve montane e prealpine colla seguente, ma più scarsa. Maggio.

P. Abies (L. *Abies excelsa* Lamk.) It. Abete, Abete rosso, Sapino. Br. *Paghèra*.

Forma selve più o meno estese, che ogni dì s'impoveriscono. Maggio.

P. Larix L. (*Larix europæa* DC.) It. Larice. Br. *Làres*,

Monti e prealpi (Pezzaze, Graticelle, Valsabbia, Tremosine). Maggio-Giugno.

(1) *P. rotundata* Link est varietas hujus speciei, caule clatiori.

Pare che il *P. Cembra*, abbondante a Bormio, a noi manchi intieramente.

Coltivansi:

P. Cedrus L. It. e Br. *Cedro del Libano*: albero magnifico.

P. Pinea L. It. Pino da pinocchi. Br. *Pigna*, i cui semi si dicono pinocchie, Br. *Pignai*. È indigeno dell'Italia d'oltre Po.

Dalle diverse specie nostrali ed esotiche del Gen. *Pinus* si estraggono con vari processi la *trementina*, la *pece greca* (Br. *pisagrega*), la *pece* (Br. *pégola*), il *catrame*. — Da alcune specie esotiche di Ginepro cavasi la *sandraca*. — Alcune conifere danno anche una specie d'incenso, che viene sostituito spesso al vero incenso. (Vedi *Boswellia*).

Nota. Dopo l'ord. XX *Acerinæ* seguirebbe la famiglia delle *Erythroxyloæ*, cui appartiene l'*Erythroxylum Coca*, It. e Br. *Coca*, arboscello del Perù, le cui foglie sono narcotiche.

CLASSIS II.^a

MONOCOTYLEDONEÆ

ORDO CVIII. HYDROCHARIDÆ.

Vallisneria L. Sist. Sex. Diœcia Diandria.

V. spiralis L. It. Alga corniculata, Vallisneria.

Acque morte, sponde dei laghi, rara (presso Sirmione; fossi alle lame di Bagnoio). Agosto-Settembre.

Hydrocharis L. Sist. Sex. Diœcia Enneandria.

H. Morsus-ranæ L. It. Morso di rana.

Ove l'antecedente e nelle risaje, rara. (Risaje e fossi a Torbole). Luglio-Agosto.

ORDO CIX. ALISMACEÆ.

Alisma L. Sist. Sex. Hexandria Polygynia.

A. Plantago L. It. Alisma, Piantaggine acquatica; Br. *Mestolasse*, *Mestole*, *Piantana de foss*.

In tutte le acque stagnanti, frequentissima. Giugno-Luglio.
β. lanceolata (1). Colla specie frequente.

(1) *Folhis lanceolatis, longe petiolatis.*

Sagittaria L. Sist. Sex. Monœcia Polyandria.

S. sagittæfolia L. It. Erba saetta, Occhio d' asino.

Acque palustri, rara. (Fossi presso Sirmione). Giugno-Ag.

ORDO CX. BUTOMEÆ.

Butòmus L. Sist. Sex. Enneandria Hexagynia.

B. umbellatus L. It. Giunco fiorito, Aglio acquatico.

Risaje e paludi poco frequente. (Torbole, lama Scovola).
Giugno-Settembre.

ORDO CXI. JUNCAGINEÆ.

Triglochin L. Sist. Sex. Hexandria Trigynia.

T. palustre L. It. Giuncastrello.

Lame del piano, frequente. Luoghi umidi delle Colombine
a Ravennola. Luglio-Agosto.

ORDO CXII. POTAMEÆ.

Potamogeton L. Sist. Sex. Tetrandria Tetragynia.

P. natans L. It. Verniera, Lingua d' acqua.

Acque stagnanti (ad Iseo). Maggio-Luglio.

β. lacustre Fries. Alla Torricella.

γ. fluitans Rth. Palude Lavajone presso Venzago.

P. lucens L. It. Brasca, Erba tinca.

Acque a Sirmione lungo l' Istmo. Giugno-Settembre.

P. perfoliatum L. It. Lattuga ranina, Abbracciafusto.

Bassi fondi dei laghi, acque lente e quiete, o palustri, frequentissimo. Giugno-Luglio.

P. crispum L. It. Cicerbita di palude, Lattuca ranina.

Fossi ed acque paludose, frequentissimo. Maggio.

β. complanatum (1). Fossi tra Borgo Pile e S. Bartolomeo.

P. pusillum Berts. It. Gramigna acquatica sottile.

Fossi stagnanti o di lento corso, frequentissimo. Giugno-Lug.

(1) Follis omnibus planis.

P. compressum All. (*P. zosteræfolium* Bert.). It. Gramigna di palude.

Acque basse del Benaco, frequente. Giugno-Luglio.

P. densum L. It. Erba Gala.

Fossi stagnanti e di lentissimo corso (alla Torricella). Aprile-Giugno.

P. pectinatum L. It. Fieno di palude.

Qua e là nei fossi morti, e alle sponde del Benaco. Giugno-Luglio.

Zannichella L. Sist. Sex. Monœcia Monandria.

Z. palustris L. It. Alga di Chiana.

Risaje della bassa provincia (presso Pontevico). Aprile-Ott.

ORDO CXIII. NAJADEÆ.

Najas Sist. Sex. Dioecia Monandria.

N. minor All. It. Ranocchina falcata. Br. *Ranina*.

Paludi e risaje, frequentissima. Giugno-Luglio.

N. major All. It. Spina di ranocchi. Br. *Ranina*.

Paludi, risaje, sponde del Benaco e del lago d' Idro, frequente. Giugno-Luglio.

ORDO CXIV. LEMNACEÆ.

Lemna L. Sist. Sex. Diandria Monogynia.

L. trisulca L. It. Erba pulla. Br. *Ranella*, *Erba ranina*.

Fossi a Torbole, poco frequente. Giugno-Luglio.

L. polyrrhiza L. It. Lente palustre. Br. *Erba ranina*.

Acque stagnanti, frequente. (Via da Iseo a Clusane). Giugno-Agosto.

L. minor L. It. Lente palustre. Br. *Erba ranina*.

Acque stagnanti, frequentissima. Giugno-Luglio.

L. gibba L. It. Lente palustre. Br. *Erba ranina*.

Come l' antecedente, ma meno copiosa. Giugno-Luglio.

ORDO CXV. TYPHACEÆ.

Typha L. Sist. Sex. Monœcia Triandria.

T. latifolia L. It. Tifa, Mazza sorda. Br. *Carezù, Massaciù.*

Acque stagnanti, frequente. (Lame del piano). Giugno-Lug.

T. angustifolia L. It. Sala. Br. *Massachècc.*

Lama di Bagnolo verso la Scòvola, frequente. Giugno-Lug.

T. minor Smith. Bertol. It. Sala minore. Br. *Massachì.*

Fosso paludoso a S. Francesco, rara. Maggio-Giugno.

β. *minima* Pollin. Colla specie.

Sparganium L. Sist. Sex. Monœcia Triandria.

S. ramosum Huds. It. Sparganio, Coltellacci. Br. *Carezòt.*

Tutti i fossi d'acqua morta; risaje, frequentissimo. Giug. Lug.

S. natans L. It. Sparganio minuto.

Laghetti prealpini del Rondenino e di Desduna. Luglio-Ag.

Segue la famiglia delle Palme (Sist. Sex. Diœcia Hexandria), fra cui è interessante la *Phoenix dactylifera* dell'Asia e dell'Africa; It. *Palma dei Datteri*, Br. *Datolo*. Colle fibre legnose d'alcune Palme d'America si tessono cappelli.

A questa famiglia appartengono pure la *Sagus genuina* dell'India e l'*Arèca oleracea* della China, dalle quali traesi la fècola detta *Sagù*.

Le avemarie di alcuni rosarj detti *Curune de coc*, penso, ma non asserisco, che sieno del legno del Cocco (*Cocos nucifera*), specie di Palma dell'Africa e dell'Asia.

Vien poi la famiglia delle Amomeæ (Sist. Sex. Monandria Monogynia), di cui notiamo la *Canna Indica* L. dell'India orientale, coltivata ne' giardini per la bellezza dei fiori; ma non è la canna d'India, di cui si fanno bastoni.

Della stessa famiglia, e crescente pure nelle Indie è lo *Zingiber officinale* R. Brown. It. Zingero, Br. *Zénzer*.

ORDO CXVI. AROIDEÆ.

Arum L. Sist. Sex. Monœcia Polyandria.

A. italicum Lamk. It. Aro, Gichero, Erba saetta. Br. *Lengue de bo, Papaciù de luff.*

Siepl appiè de' muri, vie, frequentissimo.

A. maculatum L. It. Gichero ecc.

Valletta fra i monti Dragone e Dragoncello.

β. *Folius omnino immaculatis*. Al Sebino fra Iseo e Paratico.

ORDO CXVII. ORCHIDÆ.

Orchis L. Sist. Sex. Gynandria Monandria.

O. Morio L. It. Gigli caprini, Testicolo di cane. Br. *Castegnæla*.

Pascoli dal piano alle prealpi (Badia, lame di Bagnolo, di Ghedi ecc.). Aprile-Maggio.

O. laxiflora Lam. It. Giglio di prato. Br. *Castegnæle*.

Paludi e prati turfosi, rara (lama Franzina presso Ghedi). Aprile-Maggio.

O. pallens L. It. Giglio puzzolente. Br. *Castegnæle bianche*.

Colli e monti, frequente (Urago, Collebeato, Val Bertone a Caino). Aprile-Maggio.

O. provincialis Balb. It. Giglio pallido. Br. *Castegnæle bianche*.

Colli, frequente (Urago, Collebeato, Calino, Torbiate). Aprile-Maggio.

O. mascula L. It. Giglio caprino. Br. *Castegnæle, Cojò de ca*.

Colli e bassi monti (Badia, Costalunga, Irma). Maggio-Giug.

β. *folius maculatis*. Sirmione, Urago, Dragone.

γ. *acuminata* (1). Monte Dragone.

O. papilionacea Sibth. et Smith (*O. rubra* Jacq. Bertol.) It. Cipressini.

Valletta Bertone oltre Caino, rara.

O. coriophora L. It. Cipolla cimiciattola. Br. *Castegnæle*.

Lame e colli, frequentissima. (Bagnolo, Desenzano, Venzago, Calino). Giugno (2).

O. ustulata L. It. Giglio macchiettato.

Ronchi sotto S. Gottardo; Monte d'Isola, frequente. Maggio-Luglio.

(1) *Perigonii, laciniis exterioribus longe acuminatis*.

(2) *O. fragrans* Pollin. est levis juvenis speciei.

O. variegata Lamk. It. Giglio screziato. Br. *Castegnale*.
Colli, frequente (S. Eufemia, Maddalena, Gardone di Salò,
Monte d' Isola). Maggio-Giugno.

O. tephrosanthos Vill. (*O. Simia* Koch.) It. Giglio omi-
ciattolo. Br. *Omassi*.

Badia, Ronchi, Gardone di Salò, Monte d' Isola, frequentis-
sima. Maggio.

O. militaris L. It. Giglio crestato. Br. *Cojò de ca*.

Pascoli sopra Gardone di Salò, rara. Maggio.

O. fusca Jacq. It. Ciglione. Br. *Castegnale*, *Cojò de ca*.

Colli sopra Gargnano. Aprile-Maggio.

O. sambucina L. It. Giglio sambucino.

Prati dei colli e dei monti, frequente. (Callno, Val di Ma-
rone, Valpiana presso Serle). Aprile-Giugno.

O. maculata L. It. Concordia, Palmachristi. Br. *Manine*.

Da Costalunga su pel Maddalena frequentissima. Mag. Giug.
β. carnea (4). Alla chiesa di Costalunga colla specie.

O. latifolia L. (*Orchis latifolia β. majalis* Reich.) It. Or-
chide palmata.

Lame di Bagnolo e della Scòvola, frequente. Maggio-Giug.

Anacamptis Richard. Sist. Sex. ut supra.

A. pyramidalis Rich. (*Orchis pyramidalis* L. Bert.) It. Or-
chide piramidale.

Colli suburbani, Badia, Desenzano, Venzago, Calino, Monte
d' Isola. Maggio-Giugno.

Hermium R. Br. Sist. Sex. ut supra.

H. Monorchis R. B. It. Monorchide.

Pascoli uliginosi montani e subalpini (Colombine). Lug. Ag.

Himantoglossum Spreng. Sist. Sex. ut supra.

H. hircinum Spreng. It. Barbone. Fico cappuccio.

Costalunga; margini dei campi fra Desenzano e Venzago.
Maggio-Giugno.

H. viride Rchb. (*Peristylus viridis* Lindl. Bertol.) It. Te-
sticcolo di volpe.

Pascoli prealpini, rarissimo (monte Broffone). Magg.-Lug.

(4) *Folia immaculata*, *Goribus carnea*.

Platanthèra Rich. Sist. Sex. ut supra.

P. bifolia Rich. It. Cipolla di due foglie.

Colli, frequente (Nave, Gussago, Iseo, Monticelli). Mag. Giug.
β. chloraniha Cust. Monte Dragone, rara.

Corallorhiza Hal. Sist. Sex. ut supra.

C. innata R. Br. (*Ophrys Corallorhiza* L.) It. Radice corallina.

Boschi sopra Collio, rarissima. Luglio.

Gymnadenia R. Br. Sist. Sex. ut supra.

G. odoratissima Richard (*Orchis odoratissima* L. Bert.)
 It. Orchide odorosa.

Pascoli sassosi montani e prealpini, frequente (Sarezzo, Guglielmo). Giugno-Luglio.

G. Conopsea R. Br. (*Orchis Conopsea* L. Bertol.) It. Orchide garofanata.

Vette del Guglielmo, monte Colombine alle *Poffe ratte*. Giugno-Luglio.

Nigritella Rich. Sist. Sex. ut supra.

N. angustifolia Rich. It. Palmacristi fragrantissima. Br. *Müs-ci*.

Vette del Guglielmo, e monte Colombine alle *Poffe ratte*, frequentissima. Giugno-Luglio.

N. globosa Rich. (*Orchis globosa* L. Berlol.) It. Orchide appendicolata.

Val di Marone al *Palmaross*, frequente. Giugno-Luglio.

Spiranthes Rich. Sist. Sex. ut supra.

S. autumnalis Rich. It. Testicolo odoroso.

Colli aprici a S. Eufemia, Gardone, Riviera. Settembre-Ott.

S. æstivalis Rich. It. Viticcini d'estate.

Lame di Bagnolo e della Scovola nei rialzi asciutti. Giugno-Luglio.

Aceras R. Br. Sist. Sex. ut supra.

A. anthropophora R. Br. It. Ballerino.

Luoghi erbosi sopra Zone, rarissima. Giugno-Luglio.

Ophrys L. Sist. Sex. ut supra.

- O. myoides Willd. Bertol. (O. muscifera Hudson, Koch.) It. Pecchie.

Sentiero dal Goletto alla Margherita; lungo lo Strone a Pontevico. Aprile-Maggio.

- O alpina L. (Chamaeorchis alpina Rich. Koch.) It. Vesparia d'alpe.

Luoghi depressi tra le vette del monte Gazzo, rara, Luglio.

- O. apifera Willd. It. Vesparia.

Colli di Calino, della Badia, di Costalunga, Campagna di Calcinatello, frequente. Maggio-Giugno.

- O. arachnites Willd. It. Vesparia crestatata.

Colli fra Desenzano e Lonato, frequente. Maggio-Luglio.

- O. aranifera Willd. It. Calabrone. Br. *Uzili al specc, Polzi.*

Colli, frequente. (Badia, Castello, Calino, Adro, Riviera). Aprile-Maggio.

- O. Bertolonii Morett. It. Uccellino allo specchio. Br. *Uzili al specc.*

Colle Badia; colli sopra Caino fra le rupi, frequente Aprile-Giugno.

Scrapias L. Sist. Sex. ut supra.

- S. Lingua L. Bertol. (S. longipetala Pollin. S. pseudo-cordigera Koch.) It. Satirio incappucciato.

Prati umidi fra il Benaco e Pozzolengo, frequentiss. Maggio.

- β. S. Lingua β. Bertol. (S. cordigera Koch non L.) Colli di Nave e di Sarezzo (1).

- S. cordigera L. Bertol. It. Satirio barbone.

Prati a Torbole, e sul colle di Capriano, abundantissima. Maggio.

Habenaria R. Br. Sist. Sex. ut supra.

- H. albida R. Br. (Gymnadenia albida Koch. Peristylus albidus Bert.) It. Testicolo fascicolato.

Prati di Val di Marone appiè delle vette del Guglielmo. Giugno-Agosto.

(1) Labil lobe medio late elliptico subcordata, abrupte acuminato.

Limodorum L. Sist. Sex. ut supra.

L. abortivum Willd It. Limodoro, Fico di legne.

Colli e monti, frequente (Badia, Monticelli, Provaglio).
Maggio-Giugno.

Cephalanthèra Rich. Sist. Sex. ut supra.

C. rubra Rich. It. Elleborina rosea.

Selvette dei colli sopra Gargnano, poco frequente. Mag. Giug.

C. ensifolia Rich. It. Elleborina bianca.

Boschetti erbosi dei colli, frequente. (Urago, Montorfano, Costalunga). Aprile-Maggio.

C. pallens Rich. (*C. grandiflora* Bert.) It. Elleborina giallognola.

Prati a Provaglio d' Iseo. Maggio-Giugno.

Goodlèra R.Br. Sist. Sex. ut supra.

G. repens R.Br. (*Satyrion repens* L.) It. Elleborina serpeggiante.

Boschi umidi delle prealpi (monti sopra Collio e sopra Llmone), rara. Luglio-Agosto.

Neottia L. Sist. Sex. ut supra.

N. Nidus-avis L. It. Nido d' uccello.

Pascoli selvosi sopra Lumezzane, rara. Maggio-Luglio.

Listèra R.Br. Sist. Sex. ut supra.

L. ovata R.Br. It. Orchide di primavera.

Ronchi a S. Gottardo, valletta fra il Dragone e il Dragoncello. Maggio-Giugno.

Epipactis R.Br. Sist. Sex. ut supra.

E. rubiginosa Koch. (*E. latifolia* Bert.) It. Elleborina crestata.

Boschi sopra Pezzoro presso la Cappelletta, rara. Giug.-Lug.

E. palustris Swartz. It. Mughetti pendolini.

Lame di Bagnolo e della Scòvola; al Garza dopo Caino, frequente. Giugno-Luglio.

E. microphilla Swartz. It. Elleborina odorosa.

Boschetti fra Calino ed Adro, rarissima. Maggio-Giugno.

L'Epidendron Vanilla L., d' onde si trae la droga *Vuniglia*, è un' orchidea parassitica delle Indie Orientali.

ORDO CXVIII. IRIDEÆ.

Crocus L. Sist. Sex. Triandria Monogynia.

C. biflorus Mill. It. Zafferano italiano. Br. *Campardec*,
Safrà salvadeg, *Maigole*.

Colli, piani adjacenti, monti, abbondantissimo. febbrajo-Apr.

C. vernus All. It. Zafferano selvatico.

Pascoli sui monti di Lumezzane, frequentissimo.

β. *albiflorus* WK. Monte Dragone e vette delle Colombine.

Coltivasi da noi per curiosità in qualche giardino, ma estesamente altrove, il *C. sativus* Willd., d'onde si cava lo Zafferano comune. Br. *Safrà*.

Gladiolus L. Sist. Sex. Triandria Monog.

G. communis L. It. Gladiolo, Lanciola, Spadino. Br. *Spadine*.

Messi del piano e dei colli, ed in luoghi erbosi. Apr. Mag.

β. *sægetum* Koch. Tra le messi colla specie.

Iris L. Sist. Sex. Triandria Monogynia.

I. germanica L. It. Ghiaggiòlo, Giglio pavonazzo. Br. *Zèi de spada*.

Muri e rupi dei Ronchi e di quasi tutti i colli. Aprile-Mag.

Le radici tagliuzzate Br. *Radis de Zèi*, danno odore alla biancheria.

I. pallida Willd. It. Ghiaggiòlo odoroso. Br. *Zèi selès-cc*.
Sopra un muro presso Venzago, Maggio.

I. graminea L. It. Iride susinaria.

Rarissima. Boschetti tra S. Gottardo e la Margherita. Magg.

I. Pseudo-Acorus L. It. Àcoro falso, Iride gialla. Br. *Carezù*.
Fossi del piano, frequentissimo. Aprile-Maggio.

La *I. florentina* L., indigena della Toscana e della bassa Italia, è quella della cui radice si forma la profumata polvere d'*Ireos*.

ORDO CXIX. AMARYLLIDÆ.

Narcissus L. Sist. Sex. Hexandria Monogynia.

N. poeticus L. It. Narcisso, Giunchiglia bianca. Br. *Tassèta de mont.*

Valletta Bertone sopra Caino; pascoli sopra Limone. Maggio.

N. pseudo-Narcissus. L. It. Narcisso trombato. Br. *Tassèta salvadega.*

Parecchi individui in un prato a Ponte-alto, forse da bulbi avventizj. — Coltivasi per ornamento anche a fiori doppi.

N. biflorus Willd. It. Giunchiglia pagliata. Br. *Tassèta salvadega.*

Lama la Bissa nei rialzi asciutti, rarissima. Maggio.

Si coltivano coi precedenti:

N. Tazzetta L. Br. *Tassèta* } spontanei nelle provincie fini-

N. Jonquilla L. Br. *Giunchiglia* } time alla nostra e d'oltre Po.

Leucòjum L. Sist. Sex. Hexandria Monogynia.

L. vernum L. It. Narcisso a campanelle. Br. *Giasint salvadeg.*

Rive de' fossi e margini dei campi, frequentissimo. Febbrajo-Marzo.

L. æstivum L. It. Narcisso a campanello. Br. *Fiur de carizi.*

Ai fossi tra Borgosatollo e Ghedi. Aprile-Maggio.

Galanthus L. Sist. Sex. Hexand. Monog.

G. nivalis L. It. Buca neve. Br. *Fiur de nev.*

Riva destra del Mella e lungo il Celato; colli e monti. Febbrajo-Marzo.

ORDO CXX. ASPARAGÆ.

Aspàragus L. Sist. Sex. Hexand. Monog.

A. tenuifolius Lamk. It. Asparago selvatico. Br. *Spàres salvadeg.*

Rive dell' Oglio lungo la seriola Fusa; monte Dragone, frequente. Aprile-Maggio.

A. acutifolius L. It. Asparago pungente.

Colli benacesi nelle siepi e nei boschetti, frequente. Luglio-Agosto.

Cultivasi per i primi talli mangiabili

A. officinalis L. Br. *Späres*, indigeno del litorale.

Streptopus Michaux. Sist. Sex. Hexand. Monog.

S. amplexifolius DC. It. Lauro Alessandrino.

Selve montane e prealpine, raro. (Monti sopra Irma). Giugno-Luglio.

Paris L. Sist. Sex. Octandria Tetragynia.

P. quadrifolia L. It. Erba Paris, Erba crociana, Uva di volpe.

Boschetti de' monti e delle prealpi, (Dragone, Vezegno). Maggio-Giugno.

Convallaria L. Sist. Sex. Hexand. Monog.

C. verticillata L. It. Ginocchietto stellato.

Boschetti del Dragone versante occidentale, frequente. Maggio-Giugno.

C. Polygonatum L. It. Sigillo di Salomone. Br. *Lelio salvadeg.*

Boschetti di tutti i colli, frequentissimo. Aprile-Maggio.

C. multiflora L. It. e Br. come sopra.

Versante occidentale del Dragone; Badia; Lumezzane. Mag.

C. majalis L. It. Giglio delle convalli, Fioraliso. Br. *Lelii.*

Pascoli del Maddalena, Dragone, Conche, S. Onofrio, frequentissimo. Aprile-Maggio.

Cultivasi per cingere le ajuole dei giardini

C. japonica L. fl. Br. *Lacrime de la Madona*, del Giappone.

Majanthemum Link. Sist. Sex. Hexand. Monog.

M. bifolium DC. It. Gramigna di Parnaso. Br. *Lelio salvadeg.*

Selve ombrose dei monti, frequente (Guglielmo a Spondaricca). Maggio-Luglio.

Ruscus L. Sist. Sex. Diœcia Syngenesia (Bertol.).

R. aculeatus L. It. Pungiratto, Bruscolo. Br. *Spina sorèc.*

Tutti i colli fra i sassi e le rupi, frequentissimo. Marzo-Apr.

Lo *Smilax Salsaparilla*, It. e Br. *Salsapariglia*, cresce nel Perù, nel Brasile e nel Messico.

ORDO CXXI. DIOSCOREÆ.

Tamus L. Sist. Sex. Diœcia Pentandria.**T. communis** L. It. Tàmaro, Vite nera. Br. *Tossec, Fa-*
zœi de bosc.

Selvette dei colli e dei monti, frequente. Maggio-Giugno.

ORDO CXXII. LILIACÆ.

Tulipa L. Sist. Sex. Hexand. Monog.**T. sylvestris** L. It. Tulipano selvatico. Br. *Tulipani.*Monte Guglielmo presso le Cascine, al Dosso Croce e Co-
staricca. Aprile.**T. præcox** Röm et Schult. It. Tulipano d'Olanda. Br. *Tu-*
lipà salvadeg.

Ciglioni dei campi sotto la collina alla Bornada. Marzo (1).

Coltivasi in innumerabili varietà

T. Gessneriana L. Br. *Tulipà;* della Crimea e dell'Asia.**Lilium** L. Sist. Sex. Hexand. Monog.**L. bulbiferum** L. It. Giglio rosso. Br. *Zei ross, Fiur de*
S. Gioan (2).Luoghi erbosi dei colli e dei monti, frequentissimo. Badia,
Maddalena. Maggio-Luglio.**L. Martagon** L. It. Martagone, Bella montanara. Br. *Rees*
*de dame, Zei de mont.*Tutti i monti nei pascoli e nelle seivette, frequente. (Mad-
dalena). Giugno-Luglio.

Coltivasi per la speciosità e fragranza dei fiori

L. candidum L. Br. *Zei de S. Antone*, indigeno del litorale italiano.

(1) *T. Clusiana* Röm. et Schult. Bertol. It. Tulipano di Persia. In aggeribus
sæpibus et dumetis Bergomi inter lo Spalto delle Mura et viam la Scaletta
magna mens nascitur. — Hanc pulcherrimam speciem adnotavi quod primo
mihi obvenit in Italia septentrionali sponte prævalens.

(2) In speciminibus sylvestribus bulbillos nunquam vidi.

Lloydia Salisbur. Sist. Sex. Hexand. Monog.

L. serotina Salisbur. (*Anthericum serotinum* L. Bertol.)

It. Falangio tardivo.

Luoghi aprici delle prealpi, frequente (Maniva, Colombine).
Giugno-Agosto.

Erythronium L. Sist. Sex. Hexand. Monog.

E. Dens-canis L. It. Dente di cane. Br. *Erba serpentaria*.

Colli e bassi monti ovunque frequentissimo. Marzo-Maggio.

Asphodelus L. Sist. Sex. Hexand. Monog.

A. albus Willd. It. Porraccio. Br. *Por saleadeg*.

Pascoli umidi in Val di Marone, e sopra Caino e Lumerzane, frequente. Maggio-Giugno.

Anthericum L. Sist. Sex. Hexand. Monogyn.

A. Liliago L. It. Liliagine.

Luoghi rupestri dai colli alle prealpi, frequente. (Urago, Cigoletto). Aprile-Giugno.

A. ramosum L. It. Liglio asfodelo pannocchiato.

Ove il precedente; più raro. Luglio-Settembre.

Paradisia Mazzuccato. Sist. Sex. Hexand. Monog.

P. hemeroanthericoides Mazzuc. (*P. Liliastrum* Bert.) It. Paradisia.

Pascoli prealpini, frequente. (Dorso dei monti Mufetto, Cigoletto, Colombine). Giugno-Agosto.

Ornithogalum L. Sist. Sex. Hexand. Monog.

O. pyrenaicum L. Bertol. (*O. sulphureum* Koch.) It. Coda di scojattolo.

Prati e cespugli montani, frequente (Maddalena, S. Onofrio, Guglielmo). Giugno-Luglio.

O. umbellatum L. It. Latte di gallina, Aglio selvatico.

Br. *Ai de luf*, *Fiur de la Madona*.

Campi, prati del piano e dei colli, frequentissimo. Apr. Mag.

Gagea Salisbur. Sist. Sex. Hexand. Monog.

G. arvensis Koch (*Ornithogalum arvense* Pers. Bert.) It.

Cipollaccio de' campi.

Campi, ciglioni del piano e dei colli (Bornada, Venzago; lungo lo Strone). Marzo-Aprile.

G. lutea Koch (Ornithogalum luteum L. Bertol.) It. Cipolaccio giallo.

Pascoli dei monti Broffone e Colombine, rara. Giugno-Lug.

Sella L. Sist. Sex. Hexand. Monog.

S. bifolia L. It. Giacinto carico. Br. *Narsiss salvadeg.*

Maddalena, colle a Mompiano verso il Conicchio, al Mella, allo Strone. Marzo-Aprile.

S. autumnalis L. It. Giacintello autunnale minore.

Boscetti erbosi oltre Pozzolengo, rara. Agosto-Settembre.

Allium L. Sist. Sex. Hexand. Monog.

A. sphærocephalum L. It. Aglietto, Aglio di serpe. Br. *Ai de biss.*

Campagnola di Calcinatello, colli tra Desenzano e Salò, a Venzago, al Sebino dopo Marone, frequentissimo. Giugno-Luglio.

β. descendens L. (A. sphærocephalum. β. Bertol.). Monti sopra Vello.

γ. albiflorum. Colla specie, rarissimo.

A. vineale L. It. Aglio pipolino. Br. *Ai de luff.*

Campi e loro margini, frequente. Giugno-Luglio.

β. bulbilliferum (1). Più frequente della specie.

γ. capsuliferum (2). (A. descendens Koch. Ed. 1.^a non L.). Rarissimo; campi al sud del Cimitero.

A. fallax Röm. et Schult. It. Alio falso calamo.

α. fallax Koch. Rupi e pascoli umidi montani (Mufetto). Luglio-Agosto.

β. acutangulum Koch. Fossì al Sebino presso Iseo, ed al Benaco fra Rivoltella e Sirmione, frequente.

γ. albifloro (3). Presso Rivoltella colla specie.

(1) Capit. toto bulbifero, floribus nullis.

(2) Umbella tota capsulifera, bulbillis nullis.

(3) Quod evenit tum in α, tum in β.

A. suaveolens Willd. It. Scalogna lunga.

Pascoli montani (*Càrega* e a *Magno* appiè del Guglielmo), e lame del piano (fra Torbole e Castelnuovo), frequentissimo. Luglio-Settembre.

A. pedemontanum Willd. It. Aglio sanguigno.

Monte Colombine alle coste di Ravènola sopra i laghi. Luglio-Agosto.

A. neapolitanum Cyrill. It. Aglio bianco.

Spontaneo in alcuni orti della città, e in alcuni campi della Riviera. Ronchi presso S. Francesco. Aprile-Maggio.

A. fuscum WK. It. Aglio bianco.

Monte Dragone scendendo verso Serle, raro. Giugno-Luglio.

A. ursinum L. It. Aglio orsino.

Colli fra Clusane e Paratico, sponde fra l'Oglio e la Fusa. Aprile-Giugno.

A. oleraceum L. It. Aglio d'ortaggio. Br. *Ai salvadeg.*

Siepi appiè de' colli, e lungo il canale Celato, raro. Luglio.

A. montanum Bertol. (*A. paniculatum* Pollin. *A. carinatum* β . *capsuliferum* Koch.) It. Aglio violetto. Br. *Ai salvadeg.*

Colli e monti, frequente. Giugno-Luglio.

β . *carinatum* Pollin (1). A S. Onofrio.

A. schænoprasum L. It. Aglio di serpe, Porro sottile. Br. *Santrigola.*

Vette delle Colombine. Coltivasi dai montanari per condimento.

A. paniculatum L. It. Aglio rosellino. Br. *Ai salvadeg.*

Dosso sopra il Goletto, raro. Giugno-Luglio.

Coltivansi per uso di encina:

A. Cepa L. It. Cipolla. Br. *Sigola*, colle varietà:

Sigola pomasca, di forma discoidale, pellicola giallo d'oro.

Sigola rossa, discoidale; carne e pellicole rossicce.

Sigola, ovale piriforme, bianca. D'origine incerta.

A. Porrum L. It. Porro. Br. *Porr.* D'origine incerta.

A. Ascalonicum L. It. Cipolla Ascalonica. Br. *Scalogna*. Della Palestina.

A. sativum L. It. Aglio. Br. *Ai.* D'origine incerta.

(1) *Umbella* basi bulbifera.

Hemerocallis L. Sist. Sex. Hexandria Monog.

H. flava L. It. Giglio dorato.

Valletta lungo la via da S. Eusebio a Preseglie, abbondante.
Giugno-Luglio.

H. fulva L. It. Emerocalli, Giglio, Narciso.

Ad un fosso lungo il sentiero fra Calcinatello e Rezzato.
Giugno.

La *H. alba* Andr. Br. *Amaro calice* è della China e del Giappone.

Muscari Tourn. Sist. Sex. Hexand. Monog.

M. comosum Mill. It. Cipolla canina, Giacinto delle vigne. Br. *Ai de luff*.

Margini dei campi e fra le messi frequentissimo. Mag. Giug.

M. racemosum Willd. It. Giacinto muscino. Br. *Müs-ci*.

Coll. e piano sottoposto in luoghi erbosi, frequentissimo.
Aprile-Maggio.

M. botryoides. Mill. It. Muscini selvatici. Br. *Müs-ci*.

Piano, coll. e monti, frequente. (Travagliato, Lonato). Aprile-Maggio.

Coltivansi ovunque per ornamento e pel grato odore:

M. moschatum Willd. It. Muscino. Br. *Müscio greco*, Dell'Asia.

Hyacinthus orientalis It. Giacinto. Br. *Narsiss*, *Arsiss*, *Giasint*, a fiori semplici e doppi e a vari colori. Dell'Asia.

Polyanthes Tuberosa L., It. e Br. *Tuberosa*, Dell'India.

Il **Calamus Rotang** L., It. e Br. *Canna d'India comune o grossa*, è delle Indie, e se ne fanno bastoni d'appoggio.

Il **Calamus verus** L., It. e Br. *Canna d'India sottile*, è pure dell'India, e se ne fanno verghette di mano, e impagliature di seggiole.

ORDO CXXIII. BROMELIACEÆ.

Agave L. Sist. Sex. Hexandria Monog.

A. americana L. It. Aloe americana, Aloe fiorentina. Br. *Aloe*, *Spadi*.

Rupi della Riviera, frequente. (Gargnano, Limone). Vi fiorisce però assai di raro. Taluno la vuole trasportata dall'America, altri indigena del litorale Mediterraneo.

La *Bromëlia Ananas* L. It. e Br. *Ananäs* dell'America meridionale coltivasi nelle serre per la squisitezza dei frutti.

ORDO CXXIV. COLCHICACEÆ.

Colchicum L. Sist. Sex. Hexandria Trigynia.

C. autumnale L. It. Colchico, Zaffranone. Br. *Sibörgolë*.

Prati dal piano ai monti, frequentissimo. Settembre-Ottob.

β. *alpinum* DC. Monti e prealpi. Agosto-Ottobre.

Veratrum L. Sist. Sex. Polygamia Monœcia.

V. lobelianum Bernh. (*V. album* β. *lobelianum* Koch.) It.

Giglio verde, Velâdro. Br. *Velâr*, *Veladri*, *Fald*.

Pascoli e boschi sassosi prealpini, frequente. (Dragone, Guglielmo, Vezegno). Giugno-Luglio.

V. nigrum L. It. Elâbro nero. Br. *Velâr scür*.

Ove il precedente, ma assai più raro. Giugno-Luglio.

I semi del *V. Sabadilla* L. it. e Br. *Sabadiglia* sono purgativi.

Toffieldia Huds. Sist. Sex. Hexandria Trigynia.

T. calyculata Röm. et Schult. It. Falso Asfodêlo.

Monti e prealpi nei luoghi erbosi, frequente (Guglielmo).
Giugno-luglio.

ORDO CXXV. JUNCACEÆ.

Juncus L. Sist. Sex. Hexandria Monogynia.

J. Jacquini L. It. Giunco a mazzetto.

Prati umidi prealpini, frequente (Guglielmo; Maniva, Ciglioletto). Luglio-Agosto.

J. conglomeratus L. It. Giunco da mazzocchi. Br. *Carizi*, *Zigoi*.

Prati magri ed umidi, frequente (Torbole, Torbiato).
Giugno-Luglio.

- J. effusus* L. It. Giunco dei contadini. Br. *Carizi, Zigoi*.
Luoghi umidi; lungo i fossi dal piano ai monti, frequentissimo. Giugno.
- J. glaucus* Ehrh. It. Giunco da fiscelle. Br. *Carizi, Zigoi*.
Come l' antecedente. Giugno.
 β . *diffusus* Hopp. (1). Luoghi umidi all' ombra.
- J. filiformis* L. It. Giunco sottile. Br. *Zigoli*.
Prati paludosi prealpini, frequente (Mufetto, Vaja). Luglio-Agosto.
- J. capitatus* Weig. It. Giuncherello a capolino. Br. *Zigoli*.
Al Mella sotto Castelnuovo, Aprile. Colombine a Ravennola solita. Giugno.
- J. triglumis* L. It. Giuncherello nudo. Br. *Zigoli*.
Prati umidi del Cigoletto e dell' Ario, frequente. Giug. Lugl.
- J. trifidus* L. It. Giuncò trifogliato. Br. *Zigoli*.
Rupi umide delle Colombine e del Mufetto, frequente. Lug.
 β . *monanthos* Jaq. (*J. Hostri, specimen uniflorum, Koch.*).
Rupi lungo la via da S. Colombano al Giogo, rarissimo.
- J. bufonius* L. It. Giunco delle botte. Br. *Zigoli*.
Fossi e luoghi umidi dal piano alle prealpi, frequente. Maggio-Luglio.
- J. compressus* Jacq. (*J. bulbosus* Pollin. non. L.) It. Giunco degli acquitrini. Br. *Zigoli*.
Stagno alla Torricella; campi umidi a Desenzano. Maggio.
- J. lamprocarpos* Koch. (*J. articulatus* L. Bertol.) It. Giunco nodoso.
Paludi e fossi (lame Bissa e Chiodo) Giugno.
 β . *alpinus* Vill. Koch. Luoghi paludosi del Mufetto.
 γ . *inconspicuus* (2). Mufetto.
- J. acutiflorus* Ehrh. (*J. articulatus* β . Bertol.) It. Giunco nodoso.
Paludi presso Iseo e Sirmione; pascoli umidi del Guglielmo. Giugno-Luglio.

(1) Caulis viridi, non glauco.

(2) Follorum dissepimentis valde distantibus, externe vix conspicuis.

β. viviparus (1). Risaje a Torbole; paduli fra Rivoltella e Sirmione.

J. obtusiflorus Ehoh. It. Giunco panocchiato Br. *Zigoi*, *Carizi*.

Terreni palustri, frequentissimo. (Lame di Bagnolo e della Scovola). Maggio-Luglio.

***Luzula* DC. Sist. Sex. Hexand. Monog.**

L. campestris DC. It. Bugnamàcolo, Giunco secco.

Pascoli e selvette dei colli e dei monti, frequentissima. Marzo-Maggio.

β. sudetica DC. (2). Colla specie, frequente.

γ. multiflora Lejeun. Colla specie.

L. spicata DC. It. Bugnamàcola nera.

Pascoli prealpini, frequente (Mufeto, Ario, Broffione). Giugno-Luglio.

L. lutea DC. It. Bugnamàcolo giallo.

Prati delle Colombine a *Ravenola vaga*. Giugno-Luglio.

L. nivea DC. It. Erba Lucciola bianca.

Boschetti de' colli a tramontana, frequentissima. (Costalunga, Iseo). Giugno-Luglio.

L. albida DC. Erba Lucciola gramignola.

Monte Colombine a *Ravenola vaga* e presso le vette. Luglio-Agosto.

L. spadicea DC. It. Erba Lucciola rossigna.

Vette delle Colombine ed adiacenze, frequente. Luglio-Ag.

β. glabrata Hopp. Alpi di Vaja.

L. maxima DC. (*L. sylvatica* Bertol.) It. Erba Lucciolona.

Colombine alle *Ravenole* oltre il torrentello. Giugno-Luglio.

L. Forstèri DC. It. Erba Lucciola.

Selvette de' colli, poco frequente (Costalunga, Margherita). Marzo-Maggio.

L. pilosa Willd. It. Erba Lucciola sparpagliata.

Selvette dei colli, frequentissima. Marzo-Maggio.

(1) Floribus partim vel omnibus viviparis, stolonibus elongatis foliosis.

(2) Floribus fructibusque nigrescentibus.

ORDO CXXVI. CYPERACEÆ.

Cyperus L. Sist. Sex. Triandria Monog.

C. flavescens L. It. Bottoncino. Br. *Zigoli triangolât.*

Luoghi palustri, frequentissimo (Torbole, Lograto, Palaz-
zolo, risaje). Luglio-Agosto.

C. Monti L. fil. It. Stiance da paludi. Ar. *Zigol triango-
lât, Carizi.*

Lame, risaje, paludi, frequente (Torbole, Lograto; all'Oglio).
Luglio-Settembre.

C. fuscus L. It. Giunco nero. Br. *Zigoli, Carizi.*

Paludi e risaje, poco frequente (lungo lo Strone a Ponte-
vico). Giugno-Settembre.

C. longus L. It. Ciperò, Giunco odorato Br. *Siparo, Zi-
gol triangolat.*

Luoghi paludosi, frequente (Torbole, Bagnolo). Giug.-Ag.

C. glomeratus Host. It. Giunco cannellino. It. *Zigoi, Carèze.*

Rarissimo nella provincia. (Strone riva sinistra tra Pon-
tevico e Verolanuova). Agosto-Settembre.

C. difformis L. It. Giunco delle risaje. Br. *Zigoi, Carèze.*

Paludi e risaje, frequentissimo. (Torbole, Betegno, lama
Scdeola). Luglio-Settembre.

Il *C. Papyrus* è spontaneo nella bassa Italia e nell'Africa
settentrionale.

Schænus L. Sist. Sex. Triandria Monogynia.

S. nigricans L. It. Giunco nero. Br. *Zigoi, Carizi.*

Luoghi acquitrinosi dal piano ai monti (Torbole, lungo il
Garza tra Nave e Caino; monti di Lumezzane). Marzo-
Maggio.

Rhynchospora Vahl. Sist. Sex. Triand. Monog.

R. fusca Röm et Schult. It. Giunco bruno.

Luoghi turfosi, rara (Provaglio d'Iseo). Giugno-Luglio.

R. alba Vahl. It. Giunco tenero (species diandra).

Luoghi turfosi, rarissima (lago d'Idro presso Anfo). Lu-
glio-Agosto.

Cladium R. Br. Sist. Sex. Triand. Monog.

C. Mariscus R. Br. It. Panicastrella di palude.

Paludi, frequente (Torbole, al Benaco, risaje). Mag. - Ag.

Eleocharis R. Br. Sist. Sex. Triand. Monog. (Heleocharis Koch.).

E. palustris R. Br. It. Giunco d'acqua, Cavolaja. Br. Zigoì.

Prati turfosi, e fossi paludosi (Torbole, Iseo, S. Francesco).
Maggio-Giugno.

E. acicularis Röm et Schult. It. Capitello, Trottolini.

Paludi al sud del Benaco, e pascoli turfosi sul Mufetto. Giug.

Scirpus L. Sist. Sex. Triandria Monog.

S. cespitosus L. It. Giuncolino giallo. Br. Zigoì.

Luoghi acquosi presso le vette delle Colombine. Luglio-Ag.

S. setaceus L. It. Giuncolino setaceo. Br. Zigoì.

Paludi fra Clusane e Iseo, rarissimo. Maggio.

S. supinus L. It. Giunco giacente.

Risaje della bassa, raro. Giugno.

S. mucronatus L. It. Giunco affilato. Br. Zigoì triangolàt.

Fossi paludosi e risaje, frequentissimo. Giugno-Agosto.

S. lacustris L. It. Giunco da stuoje. Br. Stær.

Paludi e laghi, frequentissimo. Maggio-Giugno.

β. Tabernæmontani Röm e Schult. Paludi ad Iseo.

S. maritimus L. It. Nocco, Giunco sfrangiato.

Stagni dal Benaco a Pozzolengo. Giugno.

β. macrostachys (1). Colla specie.

S. sylvaticus L. It. Giunco panocchiuto. Br. Carezòcc.

Paludi e fossi (al Mella tra Urigo e Collebeato). Giug. Lug.

S. triquetus L. It. Giunco triangolare. Br. Zigoì triangolàt.

Paludi, risaje, frequente. Giugno-Luglio.

S. holoscœnus L. It. Giunco sottile.

Lame e paludi, frequente (Scovola, Pranduna). Giugno.

β. australis L. Pascoli acquitrinosi sopra Salò.

S. michelianus L. It. Giunco capolino. Br. Zigoì.

Arene umide lungo l'Oglio, poco frequente. Agosto-Settem.

(1) *Spiraea elongata pollicaribus.*

Fimbristyllis Vahl. Sist. Sex. Triand. Monog.

F. annua Röm. et Schult. (*F. dichotomus* Bertol.). It.
Giunchetto ombrellato.

Paludi lungo l'Oglio, e al sud del Benaco. Agosto-Settem.
β. dichotoma Vahl (1). Colla specie ne' luoghi stessi, rara.

Eriophorum L. Sist. Sex. Triand. Monog.

E. vaginatum L. It. Giunco sericeo. Br. *Penaci*.

Pascoli umidi delle Colombine ed adjacenti. Maggio-Giugno.

E. capitatum Röm. et Schult. It. Pennacchio rotondo. Br.
Penacc.

Pascoli umidi delle Colombine e Desdana. Maggio-Giugno.

E. alpinum L. It. Pennacchio crespo. Br. *Penaci*.

Pascoli umidi del monte Broffone. Maggio-Giugno.

E. latifolium Hopp. (*E. pubescens* Bertol.). It. Pennacchi penzoli. Br. *Penacc.*

Prati turfosi. (Lama di Bagnolo, Colombine). Aprile-Giugno.

E. angustifolium Willd. It. Pennacchi grandi. Br. *Penacc.*

Prati turfosi dai monti alle prealpi (M. Vaja). Maggio-Lug.

Carex L. Sist. Sex. Monœcia Triandria.

C. Davalliana Smith. (species dioica) It. Carotto falcato.

Lama di Bagnolo; pascoli umidi del Guglielmo, rara. Giugno-Luglio.

C. dioica L. It. Carotto dritto (species dioica).

Pascoli sassosi umidi delle Colombine. Maggio-Giugno.

C. pulicaris L. It. Carotto pulciajo.

Colline umide a Clusane. Aprile-Maggio.

C. rupestris All. It. Carice rupina.

M. Broffone fra gli avanzi di neve. Luglio-Agosto.

C. pauciflora Lightfoot. It. Carotto lesinino.

Torbiera a Torbiato; prati umidi sul Mufetto. Maggio-Lug.

C. cyperoides L. ?

Ho trovato un esemplare imperfetto in un covoncello di riso a Torbole, nè potei assicurarmi della specie.

(1) *Follis caulem superantibus.*

- C. baldensis* L. It. Carice bianca.
Pascoli montani, frequentissimo (Dragone, Gugliemo, rupi a Marone). Aprile-Maggio.
- C. cùrvula* All. It. Carice giuncolina.
Pascoli umidi dell'alpi di Vaja presso il laghetto. Luglio-Ag.
- C. divisa* Hudson. It. Carice scirpina.
Pascoli petrosi tra Salò e Gargnano, rara. Aprile-Maggio.
- C. fœtida* All. It. Carice puzzolente.
Rupi poco lungi dal passo *Cruz Domini*. Luglio-Agosto.
- C. vulpina* L. It. Carice compatta. Br. *Carezét*.
Fossi, risaje, paludi, frequente (tra il Mella e la Torricella). Aprile-Maggio.
- C. muricata* L. It. Erba lucciola.
Prati umidi e margini de' ruscelli, frequente. Aprile-Magg.
- C. divulsa* Gand. It. Carice diradata.
Prati, ruscelli, vie erbose, cortili, frequente. Aprile-Maggio.
- C. teretiuscola* Willd. It. Carice tondeggiante.
Al laghetto di Vaja, rarissima. Giugno.
- C. paniculata* L. It. Carice pannocchiata.
Fossi e luoghi palustri del piano e dei monti, poco frequente (Torbole, Lavenone). Aprile-Giugno.
- C. Schrebèri* Schrank. It. Carice serpeggiante.
Lungo il Mella presso Poncarale, poco frequente. Marzo-Apr.
- C. brizoides* L. It. Carice brizolina.
Lama la *Bissa* nei rialzi asciutti, rara. Aprile-Maggio.
- C. remota* L. It. Carice ascellare.
Prati umidi, e margini dei fossi, frequente. (Ponte delle Grotte, Torricella). Aprile-Maggio.
- C. stellulata* Good. It. Giunco stellare.
Pascoli a mezza via fra S. Colombano e il Giego; rara. Maggio-Giugno.
- C. leporina* L. It. Carice piè di lepre.
Valletta a destra lungo la via fra Vello e il Guglielmo, rara. Giugno-Luglio.
- C. elongata* L. It. Carice allungata.
Laghetto a Venzago; lame a Torbole, rara. Aprile-Maggio.

C. canescens L. (*C. Buxbaumii* Koch.) It. Carice cenericcia.

Margine palustre meridionale del lago d' Idre, rariss. Mag.

C. mucronata All. It. Carice setacea.

Rupi dei monti sopra Lumezzane, frequente. Giugno-Lugl.

C. stricta Goodenough. It. Carice filacciosa Br. *Carezéc.*

Paludi, frequente (Iseo, Clusane, Sirmione, Venzago).

Aprile-Maggio.

C. vulgaris Fries (*C. caespitosa* Koch. Ed. 1.a) It. Carice flagellosa.

Rive del Naviglio da Rezzato a S. Zeno, rara. Giugno-Lug.

C. acuta L. It. Nocca. Br. *Caréza.*

Paludi, rive dei laghi « dei fossi, frequentiss. Maggio-Giug.

C. nigra Willd. It. Carice nereggiante.

Pascoli presso le cime dei monti Gavio e Broffione. Luglio-Agosto.

C. atrata L. It. Carice abbronzata.

Monti di Vaja e Dossalto, non rara. luglio-Agosto.

C. pilulifera L. It. Carice pallottolina.

Monti Vaja e Blennone, rara. Giugno-Luglio.

C. tomentosa L. It. Carice canuta.

Lame irrigatorie tra Ghedi e Leno. Aprile-Maggio.

C. montana L. (*C. collina* Bertol.) It. Carice villosa.

Colli asciutti, frequentissima. (Ponte alto, Costalunga).

Aprile-Maggio.

β. viridis (1). Colli secchi ad Agnosine.

C. ericetorum Pollich. It. Carice cigliata.

Dorso settentrionale del Mufetto. Giugno.

C. præcox Jacq. It. Carice primaticcia.

Colli, e pascoli secchi del piano, frequentissima. Febb.-Apr.

C. polyrhiza Wallroth. (*C. longifolia* Bert.) It. Carice ombrosa.

Rupi ombrose al nord di Caino; colli sopra il Goletto.

Aprile-Maggio.

(1) *Flores vaginae basi viridibus.*

- C. humilis* Leymer (*C. clandestina* Good. Bert.) It. Carice rossigna.
Colli asclutti, frequente (S. Gottardo, Dragone, Maddalena, Salò, Gargnano). Febbrajo-Marzo.
- C. gynobasis* Villars It. Carice pedunculosa.
Colli e monti, frequente. (Urago, S. Vigilio, Bogliaco). Marzo-Maggio.
- C. digitata* L. It. Carice digitata
Torbiere ad Iseo, e in tutte le lame secche. Marzo-Aprile.
β. ornithopoda Willd. Qua e là colla specie.
- C. alba* Scop. It. Carice argentina.
Pascoll di collina, frequente (Mompiano, Agnosine, Riviera). Aprile-Maggio.
- C. nitida* Willd. It. Carice lustra.
Colli asciutti a Sopraponte, Gavardo, Gargnano, frequente. Aprile-Maggio.
- C. pylosa* Scop. It. Carice pelosa.
Colli aprici suburb. nelle selvette; colli a Venzago. Apr. Magg.
- C. panicea* L. It. Carice migliacea.
Prati umidi a Clusane; torbiera a Torbiato, frequente. Apr. Maggio.
- C. glauca* Scop. (*C. recurva* Huds. Bert.) It. Carice glauca.
Br. *Carezze*.
Pascoll sì aprici che a bacio, frequentissima (Badia, Monte d' Isola, Pozzolengo. Aprile-Maggio.
β. aggregata Reich. Alla Badia.
γ. erythrostachis Hoppe. } Colla specie indistintamente.
δ. acuminata Willd. }
ε. clavæformis Hoppe. Monte d' Isola.
- C. maxima* Scop. (*C. pendula* Huds. Bert.) It. Sala. Br. *Careza*.
Margine dei fossi e dei laghi, frequente (Sirmione). Aprile-Maggio.
- C. pallescens* L. It. Carice verde-pallida.
Prati del piano e dei colli, frequente (Badia all' occidentale). Aprile-Maggio.

- C. capillaris* L. It. Carice capillare.
Tutti i pascoli prealpini, frequente (Guglielmo, Colombine).
Giugno-Luglio.
- C. frigida* Willd. It. Carice divergente.
Pascoli umidi del Mufetto e dell'Ario, rara. Luglio-Agosto.
- C. ferruginea* Willd. Bertol. (*C. sempervirens* Villars, Koch.) It. Carice multiforme.
Pascoli prealpini, frequentissima. Maggio-Giugno.
- C. firma* Willd. It. Carice rigida.
Pascoli prealpini, poco frequente (Muffetto, Broffione). Luglio-Agosto.
- C. Scopolii* Gaud. (*C. ferruginea* Scop. Koch.) It. Carice dimagrata.
Broffione, alpi di Vaja, rara. Giugno-Luglio.
- C. Oederi* Retz. It. Carice color d'oro.
Prati turfosi da Isèo a Clusane, frequentissima. Apr. Magg.
- C. Michellii* Willd. It. Carice maremmana.
Colli a S. Eufemia; lame del piano, frequente. Aprile-Mag.
- C. flava* L. It. Carice rimbeccata.
Lame presso Ghedi, massime nella Stanchèr, frequentissima. Aprile-Maggio.
- C. distans* L. It. Panicastrella acquatica.
Prati umidi del piano e delle valli, frequente. Aprile-Mag.
- C. fulva* Garden. It. Carice lionata.
Rive dell'Oglio presso Pontoglio, rara. Maggio-Giugno.
- C. sylvatica* Huds. It. Carice delle selve.
Selve de' colli e de' monti, frequentissima. Aprile-Maggio.
- C. Pseudo-Cyperus* L. It. Pseudo cipero. Br. Careze.
Ai laghi, ai fossi, nelle risaje, frequentissima. Maggio-Giug.
- C. vesicaria* L. It. Carice vescicosa. Br. Careze.
Fossi, paludi, risaje, frequente. Aprile-Maggio.
- C. paludosa* Gooden. It. Sala di palude. Br. Careze.
Rive dei fossi e dei laghi, frequentissima. Aprile-Maggio.
- C. riparia* Curt. It. Sala grande. Br. Careze.
Ai fossi al sud del Sebino e del Benaco, frequentissima. Aprile-Maggio.

C. hirta L. It. Carice villosa. Br. *Carex* *doc.*

Margini dei fossi a Castrezzato e a Paiazzolo, frequente.
Maggio-Giugno.

ORDO CXXVII. GRAMINACEÆ.

Zea L. Sist. Sex. Triandria Digynia.

Z. Mais L. (species Monoica). It. Grano turco, Formen-
tone, Mais. Br. *Formentù*.

Dell'America meridionale. Se ne coltivano principalmente
le varietà seguenti;

1. *Formentù gross o de coltura.*
2. *Formentù quarantù.*
3. *Formentù ostandl.*

Inoltre colle dette varietà crescono frequentemente anche
quelle a grani rossi, bruni, bianchi e misti.

Una moltitudine di piccoli funghi, *Uredo Maydis* DC., riduce
il grano in quella forma che dicesi Carbone, Br. *Carbù*.

Andropogon L. Sist. Sex. ut supra.

A. angustifolius Smith. (*A. Ischæmum* Koch. Species
Poligamo-Monoica) It. Erba lucciola, Sanguinella.

Colli, margini secchi de' campi, frequentissimo. Giugno-Ag.

A. Gryllus L. (Pollinia *Gryllus* Bertol. Polygamo Mo-
noica) Erba da spazzole. Br. *Bræssie*.

Luoghi secchi del colli, frequente (Maddalena, S. Eufemia).
Maggio-Giugno.

Heteropogon Persoon. Sist. Sex. ut supra.

H. Allionii Röm. et Schult. (Polygamo Monoica) It. Bar-
bone attorcigliato.

Colli asciutti fra le rupi, raro, (Vello, Marone, Rocca d'Anfo).
Agosto-Settembre.

Sorgum L. Sist. Sex. ut supra.

- S. halepense* Persoon (Polygamo Monoica) It. Sagginella selvatica. Br. *Melgher*, *Melgheta*, *Semestrel*.

Strade, margini dei campi, frequente (Desenzano, Lonato).
Giugno-Ottobre.

Cultivansi per foraggio, per farne scope e scopini, e per nutrimento dei polli e dei majali, le specie seguenti:

- S. vulgare* Persoon It. Melica, Saggina. Br. *Melga rossa* dell'Asia.
β. bicolor Willd. Br. *Melga negra* dell'India.

- S. cernuum* Willd. It. Saggina bianca. Br. *Melga bianca*, dell'India? coltivata assai di raro.

- S. saccharatum* Pers. It. Saggina da granate. Br. *Melga spargola*, dell'India. Si può trarne zucchero.

Lappago Schreb. Sist. Sex. ut supra.

- L. racemosa* Willd. (*Tragus racemosus* Koch.) It. Gramigna Lappola.

Margini secchi dei campi e dei fossi, frequente (Garza a Porta Pile). Maggio-Luglio.

Panicum L. Sist. Sex. ut supra.

- P. sanguinale* L. (*Digitaria sanguinalis* Bert.). It. Sanguinello.

Luoghi sterili, campi, frequentissimo. Luglio-Settembre.

- P. ciliare* Retzius (*Digitaria sanguinalis* α . Bert.) It. Sanguinello.

Campi, orti, vie, frequente. Luglio-Settembre.

- P. glabrum* Gaud. (*Digitaria glabra* Bert.) It. Sanguinello sottile.

Campi, orti, vie, poco frequente. Luglio-Settembre.

- P. Crus-galli* L. (Polygamo Monoica). It. Panicastrella.
Br. *Taja goss*, *Cùer*

Prati umidi del piano, risaje, frequentissimo. Giugno-Ottobre.
β. aristatum. Colla specie, frequentissimo.

- P. undulatifolium* Arduin (Polyg. Monoica) It. Raspellone irsuto.

Selve dei colli aprici; poco frequente (colli Benacesi, Venago). Luglio-Ottobre.

Coltivasi estesamente:

P. miliaceum L. It. Miglio. Br. *Mèi*, dell'Asia.

Setaria Palis. Sist. Sex. ut supra.

S. verticillata Beauv. (*Panicum verticillatum* L. Bert. Polyg. Monoica) It. Panicastrella. Br. *Pàbol*.

Campi ed orti, poco frequente. Giugno-Agosto.

S. viridis Beauv. (*Panicum viride* L. Bert. Polyg. Monoica) It. Panico selvatico. Br. *Pàbol*.

Campi, strade, orti, frequentissimo, Luglio-Settembre.

S. glauca Beauv. (*P. glaucum* L. Bert. Polyg. Monoica) It. Pesarone. Br. *Pàbol*.

Come la precedente.

Coltivasi nelle valli per foraggio, e pel semi mangiabili

S. Italica Beauv. (*Panicum italicum* L.) It. Panico, Br. *Panic*, dell'Asia.

Phalaris L. Sist. Sex. ut supra.

P. arundinacea L. It. Scagliola, Cannella.

Terreni umidi, frequente (lame di Bagnolo e della Scovola, fossi a Carpenedolò). Giugno-Luglio.

β. variegata. Br. *Erba seda*. Coltivasi per ornamento.

Hierochloa Gmelin. Sist. Sex. ut supra.

H. australis Röm. et Schult. (Polyg. Monoica). It. Avena odorosa.

Selvette del monte Dragone e dei colli Benacesi, poco frequente. Marzo-Aprile.

Anthoxanthum L. Sist. Sex. ut supra.

A. odoratum L. (Species Diandra) It. Paleino odoroso. Br. *Erba fenarola*.

Luoghi erbosi dal piano alle prealpi, frequentiss. Aprile-Mag.

Alopecurus L. Sist. Sex. ut supra.

A. pratensis L. It. Codina di prato. Br. *Cuine*.

Prati grassi de' colli intorno al Benaco, poco frequente. Maggio-Giugno.

A. agrestis L. It. Codoline, Erba codina. Br. *Cuine*.

Campi, prati, frequentissimo. Aprile-Giugno.

A. geniculatus L. It. Codolina. Br. *Cuine*.

Prati paludosi presso Iseo e Provaglio. Maggio-Giugno.

A. utriculatus Willd. It. Borsette.

Prati e vie erbose a Desenzano, Piffione, Borgosatollo, frequente. Aprile-Maggio.

Phleum L. Sist. Sex. ut supra.

Ph. *Michelii* Rehb. It. Codolina. Br. *Cuine*.

Pascoli prealpini, frequente (a Pezzòro frequentissimo).
Giugno-Luglio.

Ph. *Boehmeri* Willd. It. Codolina nuda. Br. *Cuine*.

Pascoli sterili sul Maddalena; colli a Venzago. Giugno-Lug.

Ph. *asperum* Beauv. It. Codolina lima. Br. *Cuine*.

Muri, vie, luoghi secchi dei colli, frequentiss. Maggio-Giug.

Ph. *pratense* L. It. Codolina, Coda di topo. Br. *Cuine*.

Prati umidi dal piano ai monti, frequente (Val di Marone).
Maggio-Agosto.

β. *nodosum* (L.). Prati asciutti. Maggio-Luglio.

Ph. *alpinum* L. It. Codolina violetta.

Falde del Cigoletto; dorso e cime del Guglielmo e delle Colombine, frequente. Luglio-Agosto.

Cynodon Richard. Sist. Sex. ut supra.

C. *Dactylon* Persoon. It. Gramigna. Br. *Gramègna*, *Pabol rampighi*.

Vie, campi, muri, selvette, frequentissimo. Maggio-Agosto.

Leersia Swartz. Sist. Sex. ut supra.

L. *orizoides* Willd. It. Asperella. Br. *Ris mat.*

Fossi, paludi, lame, frequente (Torbole). Agosto-Settembre.
Coltivasi nel basso piano, ma poco estesamente.

Oriza sativa L. (species hexandra) It. Riso. Br. *Ris*, dell' India.

Polypogon Desfont. Sist. Sex. ut supra.

P. *monspeliensis* Desfont. It. Coda di lepre.

Parecchi esemplari appiè dei muri in Borgo S. Giovanni. Giug.

Agrostis L. Sist. Sex. ut supra.

A. *stolonifera* L. (A. *vulgaris* variet. Bert.) It. Capellini.

(4) *Humilis*, racemo abbreviato.

Pascoli, selve, paludi, campi, vie, frequente (Badia, Iseo, Provaglio). Giugno-Luglio.

A. vulgaris Smith. (*A. vulgaris* Bert. ex parte) It. Capellini.

Prati e pascoli asciutti del colle e del piano, frequentissima. Giugno-Agosto.

β . capillata (1). A Capriano.

γ . alba L. (2). Colla specie.

A. verticillata Vill. It. Miglio d'acquitrino.

Rive paludose al sud del Benaco, rarissima. Luglio-Settem.

A. canina L. It. Capellini.

Pascoli umidi, lame, frequente (Bagnolo, Poncarale). Giugno-Luglio.

β . capillata (3). Colla specie, rara.

A. alpina Scopol. (*A. rupestris* Bertol.) It. Capellini d'alpe dorati.

Vette del Broffione, rara. Luglio-Agosto.

A. rupestris Allion. (*A. alpina* Bertol.) It. Capellini d'alpe.

Rupi prealpine, frequente (monte Colombine). Luglio-Ag.

Apèra Adans. Sist. Sex. ut supra.

A. Spica-venti Beauv. (*Agrostis Spica-venti* L. Bert.)

Campi del piano e delle valli, frequente. Maggio-Luglio.

A. interrupta Beauv. It. Spica venti sottile.

Campi, come l'antecedente ma più rara. Maggio-Luglio.

Calamagrostis Roth. Sist. Sex. ut supra.

C. lanceolata DC. (*Arundo Calamagrostis* L. Bertol.) It. Cannella paleina.

Fossi e risaje a Torhole, rara. Giugno.

C. Epigejos DC (*Arundo Epigejos* L. Bert.) It. Cannucca.

Risaje e luoghi umidi dal piano al monte, frequente (Torhole). Giugno.

(1) Culmo ad nodos fasciculis densis foliorum capillarum.

(2) Panicula albo-virenti.

(3) Ut in β *Agrostidis vulgaris*.

C. montana Hoff. (*Arundo montana* Bert.) It. cannella montana.

Selvette dei colli e dei monti (lungo il Garza a Caino; monte Dragone). Luglio-Agosto.

C. sylvatica DC. (*A. sylvatica* Bert.) It. Cannella di selva.

Selve prealpine, frequente (dorso delle Colombine e dell'Ario). Luglio-Agosto.

Millum L. Sist. Sex. ut supra.

M. effusum L. It. Gramigna cedrata.

Monti alla sinistra del Sebino (Sulzano, Vello). Luglio-Ag.

Stipa L. Sist. Sex. ut supra.

S. pennata L. It. Lino delle fate. Br. *Penine*, *Piùmine*.

Luoghi sassosi dei colli, frequente (Badia, S. Eufemia, Maddalena). Maggio.

Lasiaagrostis Link. Sist. Sex. ut supra.

L. Calamagrostis Link. (*Arundo speciosa* Bertol.) It. Cannella ingannavena.

Castello e fossa; lungo il Garza sopra Caino. Luglio.

Phragmites Trininus. Sist. Sex. ut supra.

Ph. communis Trin. (*Arundo Phragmites* L. Bert.) It.

Canna da spazzole. Br. *Arèle*, *Smansarine*.

Paludi, rive de' laghi, frequentissima. Maggio-Giugno.

β . *repens* (1). Lame di Bagnolo.

Arundo L. Sist. Sex. ut supra.

A. Donax L. It. Canna montana. Br. *Cana*.

Colli a Salò, Gargnano. Coltivasi anche a vari usi. Ag. Set.

Sesleria Arduin. Sist. Sex. ut supra.

S. caerulea Arduin. It. Codino azzurro. Br. *Erba mas-sæchina*.

Pascoli rupestri dei monti (Maddalena, Dragone). Marzo-Apr.

β . abbreviata (2). Lame secche fra Ghedi e Leno.

γ . *Argentea* (3). Colla specie fra le rupi.

(1) Culmo repente, ad nodos radicante.

(2) Spicis parvis subrotundis.

(3) Spicis argenteis.

S. disticha Pers. It. Fienaruola cerulea.

Rupi erbose e muscose delle prealpi (dorso occidentale dell'Ario). Luglio-Agosto.

Koeleria Pers. Sist. Sex. ut supra.

K. cristata Pers. (Aira cristata L. Bert.). It. Paleo argentino sottile.

Mura della città, campi, prati asciutti del piano e dei colli, frequentissima. Maggio.

K. phleoides Rehb. (Festuca cristata L. Bert.) It. Paléo codolina.

Margini delle vie e dei campi del piano e dei colli, frequente. Maggio-Giugno.

K. hirsuta Gaud. (Aira hirsuta Bertol.) It. Pulcino peloso.

Rupi erbose prealpine, frequente (Colombine, Mufetto). Luglio-Agosto.

K. grandiflora Bertol. (Aira grandiflora Bert. Fl. It.) It. Paleo argentino cipolloso.

Colli e monti sopra Virle, Serle, Sopraponte, rara. Giug. Lug.

Aira L. Sist. Sex. ut supra.

A. cæspitosa L. It. Migliarino, Nebbia.

Rupi apriche dei colli e dei monti, frequente (vie da Vestone a Collo). Giugno-Luglio.

A. flexuosa L. It. Panico capellino.

Monti bassi a Collo; monti Mufetto ed Ario, frequente. Lugl. σ sessiliflora (1). Pascoli a Pezzoro.

A. capillaris Host. (Avena capillaris Koch.) It. Ghingola, Nebbia.

Pascoli sterili dei colli e dei monti (Badia, Provaglio, Serle). Maggio-Giugno.

A. caryophyllæa L. (Avena caryophyllæa Koch.) It. Pabbio.

Pascoli sterili, frequente (Montechiaro, Provaglio d'Iseo). Aprile-Maggio.

A. canescens L. (Corynephorus canescens Koch.) It. Panico bianco.

Arene al Chiese e all'Oglio, frequente. Giugno-Agosto.

(1) Flore utroque sessili.

Avena L. Sist. Sex. ut supra.

A. sativa L. It. Avena, Vena. Br. *Vena, Ena, Biàa*.
Forse dell' Asia. Coltivasi e trovasi spontanea ne' campi.
Maggio-Giugno.

A. orientalis Schreb. It. Avena, Vena. Br. *Ena, Vena, Biàa*.
Importata dall'Asia; coltivasi altrove. Da noi trovasi ne'
frumenti.

A. strigosa Schreb. It. Avena forestiera.
Coltivasi altrove. Da noi rara tra i frumenti. Giugno-Lugl.

A. sterilis L. It. Vena selvatica maggiore. Br. *Ena salvadega*.

Fra le messi, rara. Giugno-Luglio.

A. fatua L. It. Vena selvatica. Br. *Ena salvadega*.
Messi e luoghi erbosi, frequentissima. Maggio-Giugno.
 β . *hirsuta* Roth. Colli a S. Giorgio presso Montechiaro. Giu-
gno-Luglio.

A. pubescens L. It. Vena pelosa.
Pascoli e luoghi erbosi dei colli, frequente (Sarezzo, Virie).
Maggio-Giugno.

A. lucida Bertol. (*A. fallax* Pollin.) It. Vena lucciola.
Colli e monti da Gargnano a Limone, frequente. Giugno-Lug.

A. flavescens L. It. Gramigna bianca.
Prati, margini del piano e dei colli, frequente (Badia, Mad-
dalena). Maggio-Luglio.

β . *alpina* Bertol. Alpi di Vaja e M. Ario. Luglio.

A. pratensis L. It. Vena pratajola.
Pascoli delle Colombine, poco frequente. Giugno-Luglio.

A. versicolor Willd. It. Vena bronzina.
Dove l' antecedente, di cui è forse varietà. Giugno-Luglio.

A. argentea Willd. It. Avena argentina.
Torrentelli prealpini, frequente (Broffione, Gazzo). Lugl.-Ag.

A. myriantha Bertol. It. Paleo migliarino.
Campi sotto Orzinuovi, rara. Luglio-Agosto.

Arrhenatherum Beauv. Sist. Sex. ut supra.

A. avenaceum Beauv. (*Avena elatior* L. Species Poly-
gamo Monoica) It. Vena maggiore.

Campi e prati montani, frequente (Irma, Pezzoro). Luglio.
β. bulbosum Willd. Campi a Polpenazze e alla Raffa. Giugno.

Holcus L. Sist. Sex. ut supra (Species utraque Polygamo Monoica).

H. lanatus L. It. Bambagina, Fieno bianco.

Prati e margini erbosi dei colli e del piano, frequente.
 Aprile-Maggio.

H. mollis L. It. Fieno canino.

Declivi erbosi della valletta di Toscolano, raro. Giugno-Lug.

Tridolia R Br. Sist. Sex. ut supra.

T. decumbens Beauv. It. Gramigna loglierella.

Prati e selvette nei dintorni di Gardone di Salò. Giugno.

Danthonia DC. Sist. Sex. ut supra.

D. provincialis DC. (Avena spicata Vill.) It. Paleo barbatello.

Lungo l'Oglio presso Règona. Maggio-Luglio.

Melica L. Sist. Sex. ut supra.

M. ciliata L. It. Gramigna barbata.

Terreni sassosi all'aprile (Ponte di S. Marco, Calcinatello, frequentissima). Maggio-Giugno.

M. nutans L. It. Melica penzola.

Boschetti dal piano ai monti, frequente. Aprile-Maggio.

M. uniflora Retzius It. Vena rossa.

Boschetti erbosi dei colli e dei monti (Badia). Giugno-Lugl.

Briza L. Sist. Sex. ut supra.

B. minor L. It. Erba brillantina.

Luoghi erbosi presso Orzivecchi, rara. Maggio.

B. media L. It. Tentennino, Tremolino. Br. Tremarèi.

Luoghi erbosi dal piano ai monti, frequentiss. Maggio-Giug.

Eragrostis Beauv. Sist. Sex ut supra.

E. pilosa Beauv. (Poa pilosa Bertol.) It. Fienarola porporina.

Campi, vie umide, orti, frequentissima. Luglio-Agosto.

E. megastachya Link. (*E. poeoides* Kock. *Poa megastachya* Bertol.) It. Gramignone.

Campi, vie, orti, frequentissima. Giugno-Agosto.

Poa L. Sist. Sex. ut supra.

P. dura Serp. It. Fienarola crestatà.

Pascoli a Pezzoro, rara. Maggio-Giugno.

P. annua L. It. Gramigna delle vie.

Campi, orti, vie, cortili, frequentissima. Febbraio-Dicembre.

P. laxa Willd. It. Fienaruola ciondola.

Pascoli prealpini, poco frequente (Guglielmo, Vaja). Luglio-Agosto.

P. bulbosa L. It. Fienarola Scalogna.

Pascoli, vie dei colli e dei monti, frequente. Aprile-Maggio.

β. vivipara Scop. Colla specie, frequente (Castello).

P. alpina L. It. Fienarola alpina.

Pascoli prealpini, frequente (monti Guglielmo e Marchione). Luglio-Agosto.

β. vivipara L. Colla specie, poco frequente.

γ. brevifolia Koch. Alpi di Vaja.

δ. badensis Haenk. Alpi di Vaja.

P. nemoralis L. It. Fienarola de' boschi.

Selve apriche, margini dei campi di collina (Iseo). Giugno-Agosto.

β. coarctata Hall. fl. Monti a Vello.

γ. glauca Koch. Selvette della valletta Bertone sopra Caino.

P. fertilis Host. It. Fienarola di palude.

Paludi e risaje, frequente (Torbole, Macloedio). Maggio-Giug.

P. sudetica Haenk. It. Fienarola grande.

In una valletta del monte Vaja al sud; rarissima. Luglio.

P. trivialis L. It. Gramigna de' prati.

Prati, vie, cortili, frequentissima. Maggio.

P. pratensis L. It. Sciammica, Spannocchina.

Prati e pascoli all'aprico, frequente (Castello, Badia). Mag.

P. cenisia All. ?

Pochi esemplari secchi in un mucchio di fieno sui monti Vaja.

p. compressa L. It. Ruba lana.

Pascoli, campi, ruderali, vie dal piano ai monti, frequente. Giugno-Agosto.

Glyceria R Br. Sist. Sex. ut supra.

G. spectabilis Koch. (*Poa aquatica* L. Bert.) It. Gramigna de' fossi.

Lame e torbiere, poco frequente (Iseo, Provaglio). Maggio.

G. fluitans R Br. (*Poa fluitans* Bertol.) It. Gramigna olivella.

Paludi, acque morte, frequente (Bornada, Sirmione). Maggio-Giugno (1).

Molinia Schrank. Sist. Sex. ut supra.

M. cerulea Moench. It. Gramigna liscia.

Luoghi erbosi al piano e sui colli, frequente (Badia, Bagnolo, Torbiato). Giugno-Agosto.

M. serotina Koch. (*Festuca serotina* L. Bert.) It. Paleo cannerella.

Colli e campi arenosi, frequente (Margine del Garza). Sett.

Dactylis L. Sist. Sex. ut supra.

D. glomerata L. It. Erba mazzolina, Spica bianca.

Prati e luoghi erbosi dal piano ai monti, frequentissima. Aprile-Agosto.

Cynosurus L. Sist. Sex. ut supra.

C. cristatus L. It. Gramigna cannajola.

Prati del piano e dei monti, frequente (Badia, Dragone). Aprile-Giugno.

C. echinatus L. It. Covetta, Ventolana.

Campi a frumento, poco frequente. Maggio-Giugno.

Festuca L. Sist. Sex. ut supra.

F. rigida Kunt. (*Poa rigida* L. Bert.) It. Fienarola de'muri.

Colli e monti all'aprico: muri campestri, frequente (Castello). Maggio-Giugno.

F. ciliata DC. It. Paleo barbato.

Colli fra Desenzano e Venzago, frequente. Maggio-Giugno.

F. myuros L. It. Gramigna de' greppi.

Margini secchi, muriccioli, frane, frequente. Maggio-Giugno.

β. bromoides L. Qua e là colla specie (muriccioli a S. Gervasio).

(1) In prospectu Florae Bergomensis Doct. Rotæ est *Glyceria distans* Vahlmb., sed puto pro errore; hæc enim stirps non nisi solo et aquis salis enascitur.

F. Halleri All. It. Paleo capellino.

Rupi sopra Vello; vette delle Colombine e del Dossalto, frequente. Maggio-Giugno.

β . longe aristata (1). Vette delle Colombine.

F. duriuscula L. Bert. (*Festuca ovina* cum varietat. Koch.).

Prati e luoghi erbosi dal piano alle prealpi, frequente. Maggio-Luglio.

β . hirsuta Host. Colli a Nave e a Caino.

γ . ovina L. Colla specie, comunissima.

δ . tenuifolia Pers. Colli ad Iseo e a Provaglio.

ϵ . alpina Gaud. Pascoli prealpini, frequente.

ζ . violacea Gaud. Colla varietà antecedente.

η . vivipara. Qua e là sulle prealpi (vette del Cigoletto.)

F. heterophylla Lamk. It. Paleo delicato.

Prati e margini dei campi a Vestone. Maggio-Luglio.

β . nigrescens Lamk. Alpi di Vaja, rara. Luglio.

γ . rubra L. Koch (2). Valletta Bertone oltre Caino.

F. varia Haenk (*F. flavescens* α . Bertol.) It. Gramigna pavonazza.

Vette delle Colombine, frequente. Giugno-Luglio.

β . flavescens (*F. flavescens* α , β . Bertol.). It. Gramigna dorata.

Rupi sopra Marone, e sulle Colombine. Giugno-Luglio.

γ . pumila Villars. Rupì del Cigoletto, rara.

F. poæformis Host. Bertol. (*F. pilosa* Hall. Koch.) It. Festuca fienarola.

Vette delle Colombine e del monte Gazzo. Luglio.

F. spectabilis Jan. It. Paleo zolfino.

Monti sopra Limone nelle selve, rara. Giugno-Luglio.

F. gigantea Villars (*Bromus giganteus* L. Bertol.) It. Ventolana gracile.

Pascoli dal piano ai monti (monti a Pezzoro, frequentissima). Luglio-Agosto.

F. elatior L. It. Gramigna fusajola, Paleo doppio.

(1) *Aristia valis longiore*.

(2) *Radice stolonifera*.

Prati e lame del piano; pascoli montani, frequentissima.
Maggio-Giugno.

F. arundinacea Schreb. (*F. elatior* Bert. ex parte).

Colle Badia; sud del Benaco; lame *Bissa*, *Pranduna*, *Chiodo*,
frequentissima. Maggio.

Brachypodium Palisot. Sist. Sex. ut supra.

B. sylvaticum Röm. et Schult. (*Festuca gracilis* Moench.
Bertol.) It. Pennacchio, Paleo peloso.

Pascoli dei colli e dei monti, frequente (Maddalena, S. Onofrio).
Giugno-Agosto

B. pinnatum Beauv. (*Festuca pinnata* Huds. Bert.) It.
Pennacchi.

Selvette e siepi dei colli e dei monti, frequente. Maggio-Giug.

B. Halleri Link. (*Triticum tenellum* L. Bert., *Festuca Lachenalii* Koch.) It. Paleo granecchino.

Pochi individui nella Campagna di Montechiaro. Maggio-Giug.

B. distachium Röm. et Schult. It. Paleo a due spighe.

Lama la *Scovola* nei rialzi asciutti. Maggio-Giugno.

Bromus L. Sist. Sex. ut supra.

B. secalinus L. It. Segale lanajola, Ventolana. Br. *Biàa salvadega*.

Campi a Vestone, frequente. Maggio-Giugno.

β. velutinus Schrad. Colla specie, frequente.

B. racemosus L. It. Forasacco di pannocchia lunga. Br.
Furasàc.

Margini dei campi e delle vie, muri, messi, frequente. Maggio-Giugno.

β. commutatus Schrad. Messi nella Riviera Bassa, frequente.

B. mollis L. It. Forasacco peloso. Br. *Biàa salvadega*.

Prati, pascoli, campi, frequentissimo. Maggio-Giugno.

B. arvensis L. It. Ventolana. Br. *Furasàc*.

Campi, prati, vigne, frequente. Maggio-Luglio.

B. squarrosus L. It. Forasacco pendolino. Br. *Furasàc*.

Margini asciutti dei campi e delle vie, frequente. Mag. Giug.

β. villosus Gmel. Colla specie nella bassa provincia,

- B. asper** Murr. It. Ventolana ruvida. Br. *Furasàc*
Selvette e siepi dei colli e dei monti, frequente. Magg. Lug.
- B. erectus** Huds. It. Forasacco di corte barbe. Br. *Furasàc*.
Colli e prati secchi (Desenzano, Salò, Riviera, frequente).
Maggio-Giugno.
- B. inermis** Willd. It. Forasacco spuntato. Br. *Furasàc*.
Vigne ad Ome, raro. Giugno-Luglio.
- B. sterilis** L. It. Forasacco rosso, Orzo selvatico. Br. *Furasàc*.
Messi, margini dei campi, e luoghi incolti, frequente. Aprile-Maggio.
- B. tectorum** L. It. Forasacco dei tetti.
Muri campestri, ruderali, vie, frequente. Aprile-Maggio.
- B. scaberrimus** Ten. Bertol. (B. diandrus Koch.) It. Forasacco de'muri.
Muri, margini delle vie, colli aprici, frequente. Aprile-Mag.
- β. madrilensis** Allion. Castello; argini del Garza, frequente.
- B. maximum** Presl. Bertol. It. Squala.
Margini d' un campo al sud di Pontoglio, rarissimo. Aprile-Maggio.

Triticum L. Sist. Sex. ut supra.

- T. repens** L. It. Gramigna, Dente canino. Br. *Gramegna*, *Grem*.
Campi, vigne, muri, vie dappertutto. Maggio-Giugno.
- β. caesium** Presl. Luoghi erbosi.
- γ. firmum** Presl. Luoghi secchi.
- T. caninum** Huds. It. Grano cattivo.
Selve, siepi, boschetti dei monti e dei colli, raro (Serle).
Maggio-Luglio.
Si coltivano
- T. vulgare** Vill. It. Frumento, Grano. Br. *Forment*.
- α. hibernum** L. It. Saligine; Frumento nostrano. Br. *Forment corezal*.
Sotto varietà a spighe rosse, Br. *corezal ross*.
- β. aestivum** L. It. Formento marzòlo. Br. *Forment marsal*.
- γ. siligineum** It. Frumento tosello. Br. *Forment senza barba*.

Il Bertoloni vuole che il frumento sia indigeno dell'Italia, e asserisce trovarsi ancora allo stato selvatico in Val di Mazzara nella Sicilia, e sui monti della Sardegna.

T. turgidum L. It. Grano duro, Andriolo. Br. *Forment gross*.

β . *rufum* It. Grano duro rosso Br. *Forment gross ross*.

γ . *caeruleum* It. Grano duro azzurro. Br. *Forment gross selest*.

δ . *compositum* L. It. Grano a grappoli. Coltivasi per capriccio assai di raro.

T. Spelta L. It. Spelta, Farro. Br. *Far*. Coltivasi assai di raro.

Secale cereale It. Segale. Br. *Seghel*.

Si semina di raro nel piano, a larga mano sui monti. Maggio-Giugno.

La degenerazione in *Segale cornuta* prodotta da un fungo parassita, lo *Sclerotium Clavus* DC, che si sostituisce al grano assorbendolo, è nella provincia nostra piuttosto rara.

L'*Uredo segetum* DC., e l'*U. Caries* DC., funghi picciolissimi, inducono nei gran di frumento e d'altri cereali quel che si dice Carie, Carbone. Br. *Strat*.

Hordeum L. Sist. Sex. ut supra.

H. murinum L. It. Orzo selvatico. Br. *Erba spigarola*.

Vie, margini dei campi, siepi dappertutto. Maggio-Ottobre.
Coltivansi:

H. vulgare L. It. Orzo. Br. *Ors*. Di patria incerta.

β . *celeste seminibus liberis*. It. Orzo mondo. Di raro.

H. disticon L. } It. Orzo. Br. *Scandela*. Di patria incerta.

H. hexasticon L. }

Si coltivano queste due specie nei terreni magri, p. es. nella Campagna di Montechiaro.

Lolium L. Sist. Sex. ut supra.

L. perenne L. It. Loglierella, Loglio selvatico. Br. *Erba lerghèla, Fràina*.

Luoghi erbosi, frequentissimo. Coltivasi anche per foraggio primaverile.

β . *italicum* Alex. Braun. Prati pingui.

γ . *multiflorum* Gaud, Prati a Verolano.

L. temulentum L. It. Lolio zucco, Zizzania. Br. *Lòi*.

Fra le messi dappertutto. Maggio. Venefico.

β. arvense Pollin. Nel frumento e nella segale.

L. linicola Sonder. It. Loglio. Br. *Lói*.

Fra il lino sul colle di Capriano, raro. Giugno-Luglio.

Æglops L. Sist. Sex. ut supra.

Æ. ovata L. It. Egilope, Cerere, Fenice.

Vie e margini dei campi, muri, ruderali, frequente. (Castenedolo). Maggio.

Æ. neglecta Req. Bertol. It. Fenice delle biade.

Tra le messi nella Campagna di Montechiaro, rara. Maggio.

Pellurus Trinius. Sist. Sex. ut supra.

P. nardoides Trin. It. Erba setolina.

Colli aridi presso Venzago, e sul Dosso alto, raro. Apr. Magg.

Nardus L. Sist. Sex. ut supra.

N. stricta L. It. Fieno di monte.

Monti Guglielmo, Dossalto, Manlva ecc. nei pascoli umidi. Maggio-Luglio.

Il *Saccharum officinarum* L. It. Canna da zucchero, Br. *Cana de sacher*, onde si estraggono lo zucchero, il *rum* e il *ratapá*, è indigeno delle Indie orientali, ed ora estesamente coltivato in America.

La *Bambusa arundinacea* Retz. It. e Br. *Bambù*, è indigena delle Indie orientali. Altri invece ritiene che il vero Bambù sia la *Arundo Bambus*.

CLASSIS III.^a

ACOTILEDONEÆ

ORDO CXXVIII. EQUISETACEÆ.

Equisetum L. Sist. Sex. Cryptogamia Filices (Gono-
pterides).

E. arvense L. It. Coda cavallina. Br. *Cue d'azen, Erba piltrina*.

Prati, campi e pascoli magri, frequentissimo. Marzo-Aprile.

E. Telmateja Ehrh. (*E. fluviatile* Pollin. non L.) It. Coda cavallina. Br. *Cue de caâl, Erba piltrina*.

Margini boscosi dei fossi al piano (Flero, Bagnolo). Aprile.

E. sylvaticum L. It. Setolone. Br. *Cuc de caâl, Sprela..*

Selve umide dei monti e delle prealpi, raro (Graticelle).
Aprile-Maggio.

β. umbrosum Meyer. Rive boschive dell' Oglio, raro.

E. palustre L. It. Equiseto, Asprella. Br. *Sprela*.

Paludi al sud del Sebino e del Benaco, frequente. Giugno.

β. polystachyum (1). Colla specie, frequente.

E. limosum L. It. Asperella. Br. *Sprela*.

Luoghi palustri a Torbole, Lograto, frequente. Aprile-Mag.

E. hiemale L. It. Asperella, Cucitoli. Br. *Sprela*.

Rive dei fossi paludosi a Flero, Torbole. Maggio-Giugno.

E. variegatum Schleich?

Alle Fornaci lungo il Mella.

(1) *Ramus apiciferus*.

ORDO CXXIX. MARSILEACEÆ.

Marsilèa L. Sist. Sex. Cryptogamia Filices (Hydropterides).

M. quadrifolia L. It. Lente palustre. Br. *Erba ranina*.

Paludi e risaje, frequente.

Pilularia L. Sist. Sex. ut supra.

P. globulifera L. It. Mazzetti di palude.

Lame la *Panduna* e la *Bissa*, rara. Luglio-Settembre.

Salvinia Michel. Sist. Sex. ut supra.

S. natans Hoffm. It. Lente palustre. Br. *Ranina*.

Fossi paludosi presso Sirmione, frequente. Giugno-Agosto.

ORDO CXXX. LICOPODIACEÆ.

Lycopodium L. Sist. Sex. Cryptogamia Filices (Stachiopterides).

L. Selàgo L. It. Selagine. Br. *Erba piagèra*.

Rupi settentrionali delle vette del Mufetto. Giugno-Luglio.

L. inundatum L.

Lama la *Bissa*, rarissimo. Giugno-Luglio.

L. annòtinum L. It. Piè di lupo gineprino.

Boschi presso Irma, raro. Agosto.

L. alpinum L.

Rupi delle vette del monte Gazzo, raro. Agosto.

L. complanatum L. It. Piè di lupo cipressino.

Selve dei colli e dei monti, frequente (Maddalena, Mom-piano). Luglio-Agosto.

L. clavatum L. It. Licopodio, Musco terrestre.

Insieme coll' antecedente. Luglio-Agosto. — Produce una polvere infiammabile detta *Zolfo vegetale*.

Selaginella Spring. Sist. Sex. ut supra.

S. spinulosa A. Braun. (*Lycopodium selaginoides* L.) Licopodio spinoso.

Pascoli prealpini, frequente (Maniva, Mufetto). Giugno-Lug.

S. helvetica Spring. (*Lycopodium helveticum* L.).

Colli e monti nelle selve e sui muriccioli, frequente. Lugl.-Ag.

ORDO CXXXI. FILICES.

Botrychium Swartz. Sist. Sex. Cryptog. Filices.

B. Lunaria Swartz. (Osmunda Lunaria L.) It. Lunaria minore.

Pascoli secchi dei colli e dei monti della Riviera alta; monte Mufetto, frequente. Maggio-Luglio.

Ophloglossum L. Sist. Sex. ut supra.

O. vulgatum L. It. Lingua serpentina.

Nelle stesse località del precedente. Giugno-Luglio.

Osmunda L. Sist. Sex. ut supra.

O. regalis L. It. Osmunda, Felce florida.

Lama la Bissa, abbondante. Maggio-Giugno.

Grammitis Swartz. Sist. Sex. Cryptog. Filices (Phyllopterides).

G. Ceterach Swartz. (Asplenium Ceterach. L.) It. Erba dorata.

Rupi, muri dal piano ai monti, frequentissimo. Giugno-Lugl.

Polypodium L. Sist. Sex. ut supra.

P. vulgare L. It. Felce quercina. Br. *Feles*, *Radis dolsa*, *Regolessia*.

Rupi appiè delle querce e de' castagni, frequente (Costa-lunga). Giugno-Luglio.

P. Phegopteris. L. Br. *Felezina*.

Selve prealpina, poco frequente (dorso settentrionale delle Colombine). Maggio-Luglio.

P. Dryopteris L. Br. *Felezina*.

Val di Marone ascendendo al Guglielmo, frequente. Maggio-Luglio.

P. alpestre Hoppe?

Pochi esemplari già secchi ed imperfetti in una selvetta presso Irma.

Aspidium L. Sist. Sex. ut supra.

A. Lonchitis Swartz. (Polypodium Lonchitis L.) Br. *Felezina*.

Selve prealpina, frequente (monte Mufetto). Giugno-Lugl.

A. aculeatum Döll (*Polypodium aculeatum* L.). Br. *Feles*.

Selve dei colli e dei monti, frequentissimo. Maggio-Giugno.

Polystichum Roth. Sist. Sex. ut supra.

P. Thelypteris Roth. (*Polypodium Thelypteris* L.). Br. *Feles*.

Paludi, frequente (lame Bissa, Chiodo ecc.). Luglio-Agosto.

P. Oreopteris DC. Br. *Feles*.

Selve montane e prealpine, frequente. Luglio-Agosto.

P. Filix-mas Roth (*Polypodium Filix-mas* L.) It. Felce maschia. Br. *Feles masce*.

Tutte le selve dal piano alle prealpi, frequentissimo. Giugno-Luglio.

P. spinulosum β . dilatatum Koch (*Aspidium dilatatum* Pollin:).

Selve montane e prealpine, frequente (Mufetto, Ario). Giugno-Luglio.

P. rigidum DC. (*Aspidium rigidum* Swartz).

Rupi e frane delle prealpi, raro (Vaja). Giugno-Luglio

Cystopteris Bernhard. Sist. Sex. ut supra.

C. fragilis Bern. (*Polypodium fragile* L.) It. Felce sassatile. Br. *Felezina*.

Luoghi umidi di collina; rupi e muri a Collio. Giugno-Ag.

C. regia Presl. (*Aspidium regium* Willd.). Br. *Felezina*.

Rupi dei monti Fronden e Dossalto, frequente. Giugno-Ag.

C. montana Link. (*Aspidium montanum* Will.). Br. *Felezina*.

Rupi delle Colombine, frequente. Giugno-Luglio.

Asplenium L. Sist. Sex. ut supra.

A. Filix-fœmina Bernhard. (*Polypodium Filix-Fœmina* L.)

It. Felce femina. Br. *Feles femina*.

Selve dal piano ai monti, frequentissima. Luglio-Agosto.

A. Halleri R Brown.

Rupi prealpine, raro (monti Ario e Mufetto). Luglio-Agosto.

A. Trichomanes L. It. Tricomane. Br. *Felezine de mür*.

Muri, rupi, dappertutto.

A. viride Huds. It. Tricomane de' monti. Br. *Felezina*.

Rupi delle prealpi, poco frequente. Giugno-Agosto.

A. Breynii Retz. (A. germanicum Weis.).

Rupi laterali alla via da Collio al Giogo, raro. Luglio-Ag.

A. Ruta-muraria L. Br. *Capelvèner bastard*.

Rupi e muri dal piano ai monti, frequentissima. Giug. Ag.

A. Adiantum-nigrum L.

Rupi montane e prealpine, frequente (Maddalena, Lavenone).
Giugno-Luglio.

A. septentrionale Swartz. (Acrosticum septentrionale L.).

Rupi prealpine, frequente (Da Graticelle al Mufetto). Giugno-Luglio.

Scoleopendrium Smith. Sist. Sex. ut supra:

S. officinarum Swartz. It. Lingua cervina. Br. *Erba milsera*, *Regolessia*.

Luoghi erbosi umidi; alle sorgenti, frequente. Giugno-Ag.

Blechnum L. Sist. Sex. ut supra.

B. Spicant Roth. (Osmunda Spicant L.).

Dorso settentrionale dei monti ad Agnosine, raro. Giug. Lug.

Pteris L. Sist. Sex. ut supra.

P. aquilina L. It. Felce maggiore. Br. *Feles de l'Aquila*.

Luoghi sterili dal piano ai monti, frequentissima. Lug. Ag.

P. crispa L. (Allosorus crispus Bernhard, Koch.) Br.

Felizina.

Pascoli prealpini, frequente (Cornablacca, Cigoletto, Dosalto). Luglio-Agosto.

P. cretica L.

Via lacuale del Sebino presso Marone nelle rupi, rarissima.
Giugno-Luglio.

Adiantum L. Sist. Sex. ut supra.

A. Capillus-Veneris L. It. Capelvenere. Br. *Capelvèner*, *Capiler*.

Alle scaturigini, ed alle rupi lungo i fiumi, frequente. (Seriola Fusa tra Paratico e Palazzolo). Giugno Luglio.

Notholaena Rob. Brown. Sist. Sex. ut supra.

N. Marantæ R Br. (Acrosticum Marantæ L.)

Rupi prealpine e montane, raro (Irma, Preseglie). Luglio.



INDEX GENERUM

Abies . . .	Pag. 194	Anarrhinum . . .	Pag. 155
Acacia . . .	70	Anchusa . . .	149
Acer . . .	46	Andropogon . . .	222
Aceras . . .	201	Androsace . . .	172
Achillea . . .	117	Androsæmum . . .	45
Acônitum . . .	47	Anémone . . .	12
Acrósticum . . .	242	Anethum . . .	97
Actæa . . .	17	Angelica . . .	97
Adenostyles . . .	110	Anthemis . . .	117
Adiantum . . .	242	Anthëricum . . .	208
Adonis . . .	13	Anthoxanthum . . .	224
Adôxa . . .	103	Anthriscus . . .	101
Ægopodium . . .	95	Anthyllis . . .	58
Ægylops . . .	237	Antirrhinum . . .	155
Æsculus . . .	46	Apargia . . .	128
Æthionëma . . .	29	Apëra . . .	226
Ætusa . . .	97	Apium . . .	95
Agave . . .	211	Apôseris . . .	127
Agrimonia . . .	77	Aquilegia . . .	16
Agrostemma . . .	38	Arabis . . .	21
Agrostis . . .	225	Arbutus . . .	139
Ailanthus . . .	56	Archangelica . . .	97
Aira . . .	228	Arctium . . .	124
Ajuga . . .	169	Aretostaphylos . . .	139
Alchemilla . . .	78	Arëca . . .	198
Alisma . . .	196	Aremonia . . .	77
Allium . . .	209	Arenaria . . .	40
Allôsorus . . .	242	Aretia . . .	172
Alnus . . .	193	Aristolochia . . .	183
Alopecûrus . . .	224	Armeria . . .	175
Alsine . . .	39	Arnica . . .	120
Althæa . . .	44	Aronia . . .	82
Alyssum . . .	26	Aronicum . . .	120
Amaranthus . . .	176	Arrhenatherum . . .	229
Amorpha . . .	69	Armoracia . . .	27
Ampellôpsis . . .	50	Artemisia . . .	116
Amigdalus . . .	72	Arum . . .	198
Anacamptis . . .	200	Arundo . . .	227
Anagallis . . .	172	Asarum . . .	183

Asparagus . . .	Pag 205	Bupthalmum . . .	Pag. 113
Asperugo . . .	150	Bupleurum . . .	93
Asperula . . .	103	Butomus . . .	196
Asphodelus . . .	208	Buxus . . .	181
Aspidium . . .	211		
Asplenium . . .	211	Cæsalpinia . . .	70
Aster . . .	111	Calamagrostis . . .	226
Astragalus . . .	63	Calamus . . .	211
Astrantia . . .	93	Calamintha . . .	164
Athamanta . . .	96	Caléndula . . .	122
Atragène . . .	11	Calepina . . .	29
Atriplex . . .	178	Callitriche . . .	84
Atropa . . .	151	Calluna . . .	140
Avena . . .	229	Caltha . . .	15
Azalea . . .	140	Calycanthus . . .	18
		Cambodia . . .	45
Ballota . . .	168	Camelina . . .	27
Bambusa . . .	237	Camellia . . .	48
Barbarea . . .	21	Campánula . . .	137
Barkhausia . . .	131	Canna . . .	198
Barisia . . .	161	Cannabis . . .	187
Begonia . . .	179	Capparis . . .	30
bellidiastrum. . .	112	Capsella . . .	29
Bellis . . .	112	Capsicum . . .	152
Berberis . . .	18	Cardamine . . .	22
Berteroa . . .	26	Carduus . . .	124
Bérula . . .	94	Carex . . .	217
Beta . . .	178	Cariophyllus . . .	36
Betónica . . .	168	Carlina . . .	125
Bétula . . .	193	Carpesium . . .	115
Bidens . . .	113	Carpinus . . .	190
Bifora . . .	102	Cärthamas . . .	125
Bignonia . . .	146	Carum . . .	94
Biscutella . . .	28	Cassia . . .	69
Bixa . . .	30	Castanea . . .	189
Blechnum . . .	242	Caucalis . . .	101
Borago . . .	150	Celosia . . .	177
Boswellia . . .	56	Celtis . . .	188
Botrychium . . .	240	Centaurea . . .	125
Brachipodium . . .	234	Centranthus . . .	108
Brassica . . .	24	Centunculus . . .	172
Briza . . .	230	Cephalanthera . . .	203
Bromelia . . .	212	Cephalaria . . .	109
Bromus . . .	234	Cephælis . . .	107
Bryonia . . .	86	Cerastium . . .	61
Bunias . . .	29	Geratonia . . .	70

Ceratophyllum . . .	Pag. 81
Cercis . . .	70
Cerithe . . .	148
Cesalpinia . . .	70
Chærophyllum . . .	102
Chaiturus . . .	168
Chamæorchis . . .	202
Cheiranthus . . .	20
Chelidonium . . .	19
Chenopodium . . .	177
Cherleria . . .	39
Chlora . . .	144
Chondrilla . . .	130
Chrysanthemum . . .	119
Chrysosplenium . . .	92
Cleer . . .	64
Cichorium . . .	127
Cicuta . . .	95
Cineraria . . .	120
Cinchona . . .	107
Circæa . . .	83
Cirsium . . .	122
Cistus . . .	30
Citrus . . .	47
Cladium . . .	216
Clématis . . .	11
Clinopodium . . .	165
Cnicus . . .	122
Cnidium . . .	96
Cochlearia . . .	27
Cocos . . .	198
Coffea . . .	107
Côlchicum . . .	212
Colutèa . . .	62
Conium . . .	102
Coniza . . .	113
Cónvallaria . . .	206
Convolvulus . . .	146
Copallera . . .	70
Corallorhiza . . .	201
Côrchorus . . .	46
Coriandrum . . .	103
Cornus . . .	103
Coronilla . . .	63
Corydalis . . .	19
Corylus . . .	190

Corynephorus . . .	Pag. 228
Cotoneaster . . .	80
Crassula . . .	88
Crategus . . .	79
Crepis . . .	132
Crocus . . .	204
Croton . . .	186
Crupina . . .	127
Cucùhalus . . .	36
Cûcumis . . .	87
Cucûrbita . . .	86
Cuminum . . .	103
Cupressus . . .	194
Cupularia . . .	
Cuscûta . . .	147
Cyclamen . . .	174
Cydonia . . .	80
Cynanchum . . .	143
Cynara . . .	124
Cynodon . . .	225
Cynoglossum . . .	150
Cynosûrus . . .	232
Cyperus . . .	215
Cystopteris . . .	241
Cytisus . . .	56
Dactylis . . .	232
Dahlia . . .	121
Danthonia . . .	230
Daphne . . .	182
Datura . . .	152
Daucus . . .	100
Delphinium . . .	17
Deutaria . . .	23
Diauthus . . .	34
Dictamus . . .	53
Digitalis . . .	154
Diôspyros . . .	141
Diplotaxis . . .	26
Dipsacus . . .	108
Dôlicos . . .	69
Doronicum . . .	120
Doricium . . .	61
Draba . . .	27
Drosëra . . .	33
Dryas . . .	74

Echinosperrnum	Pag. 150
Echium	147
Elatine	42
Eleocharis	216
Empetrum	184
Epidendron	203
Epilohium	82
Epimedium	48
Epipactis	103
Epiphyllum	90
Equisetum	238
Eragrostis	230
Erica	140
Erigeron	112
Eriophorum	217
Eritrichium	149
Erodium	52
Ervum	66
Eryngium	93
Erysimum	24
Erythraea	144
Erythronium	208
Erythroxylon	195
Ethionema	29
Eupatorium	110
Euphorbia	184
Euphrasia	161
Evonymus	59
Fagus	189
Farsetia	26
Ferula	98
Ferulago	98
Festuca	232
Ficus	187
Filago	115
Fimbristylis	217
Foeniculum	97
Fragaria	73
Fraxinus	142
Fumaria	20
Gagea	208
Galanthus	205
Galèga	62
Galerbdolon	166

Galeopsis	Pag. 166
Gallium	103
Gaya	96
Genista	56
Gentiana	144
Geranium	51
Geum	74
Gladiolus	204
Glechoma	166
Gleditschia	69
Globularia	175
Glyceria	232
Glycirrhiza	70
Gnaphalium	115
Gomphrena	177
Goodiera	203
Gossypium	44
Grammitis	240
Gratiola	154
Guajacum	54
Gymnadenia	201
Gypsophila	34
Habenaria	202
Hedera	103
Hedysarum	64
Heleocharis	216
Helianthemum	30
Helianthus	113
Helichrysum	117
Heliotropium	151
Helleborus	16
Helosciadum	95
Hematoxylum	70
Hemerocallis	211
Heracleum	99
Hernium	200
Herniaria	87
Hesperis	23
Heteropogon	222
Hibiscus	44
Hieracium	133
Hierochloa	224
Himantoglossum	200
Hippocrepis	64
Hippophae	183

Hippuris . . .	Pag. 84	Lathyrus . . .	Pag. 66
Hissopus . . .	165	Laurus . . .	182
Holcus . . .	230	Lavandula . . .	163
Holosteum . . .	40	Leersia . . .	225
Homogyne . . .	111	Lemna . . .	197
Hordeum . . .	236	Leontodon . . .	128
Horminum . . .	165	Leonurus . . .	168
Hottonia . . .	174	Lepidium . . .	28
Humulus . . .	187	Lepigonum . . .	39
Hutchintia . . .	28	Leucôjum . . .	205
Hyacinthus . . .	211	Libanotis . . .	96
Hydrôcharis . . .	195	Ligusticum . . .	96
Hydrangæa . . .	92	Ligustrum . . .	142
Hyoscyamus . . .	152	Lilium . . .	207
Hyosérís . . .	127	Limodôrum . . .	203
Hypericum . . .	45	L. naria . . .	155
Hypochæris . . .	129	Liudernia . . .	157
Hyssopus . . .	165	Linnæa . . .	105
		Linosyris . . .	111
Ilex . . .	142	Linum . . .	43
Impatiens . . .	52	Listera . . .	103
Imperatoria . . .	99	Littorella . . .	175
Indigôfera . . .	69	Lithospermum . . .	148
Inula . . .	114	Lloydia . . .	208
Iris . . .	204	Lolium . . .	236
Isatis . . .	29	Lonicera . . .	104
Isnardia . . .	83	Loranthus . . .	103
Isonandra . . .		Lotus . . .	62
Isopyrum . . .	16	Lunaria . . .	26
		Lupinus . . .	57
Jasione . . .	136	Luzula . . .	214
Jasminum . . .	143	Lychnis . . .	37
Jatropha . . .	187	Lycopodium . . .	239
Juglans . . .	188	Lycopersicum . . .	152
Juncus . . .	212	Lycopsis . . .	150
Juniperus . . .	194	Lycopus . . .	162
		Lysimachia . . .	171
Lactuca . . .		Lythrum . . .	85
Lamium . . .	166		
Lappa . . .	124	Magnolia . . .	18
Lappago . . .	223	Majanthemum . . .	206
Lapsana . . .	127	Malachium . . .	41
Laserpitium . . .	99	Malva . . .	43
Lasiagrostis . . .	227	Mamillaria . . .	90
Lactuca . . .	130	Margarita . . .	112
Lathræa . . .	159	Marsilea . . .	239

Martynia	Pag. 146	Nicotiana	Pag. 152
Marrubium	" 168	Nigella	" 16
Matricaria	" 119	Nigritella	" 201
Matthiola	" 20	Notholena	" 242
Medicago	" 58	Nuphar	" 19
Melampyrum	" 159	Nymphæa	" 18
Melica	" 230		
Melilotus	" 59	Ocimum	" 164
Melissa	" 163	Œnanthe	" 27
Melittis	" 166	Œnothera	" 83
Melocactus	" 90	Olea	" 142
Melongena	" 152	Omphalodes	" 150
Menispermum	" 18	Onobrychis	" 61
Mentha	" 162	Onopordon	" 124
Menyanthes	" 144	Ononis	" 57
Mercurialis	" 186	Onosma	" 148
Mespilus	" 80	Ophoglossum	" 240
Meum	" 95	Ophrys	" 202
Micropus	" 115	Opuntia	" 90
Milium	" 227	Orchis	" 199
Mimosa	" 70	Origanum	" 164
Mirabilis	" 176	Orlaya	" 100
Mnœchia	" 41	Ornithogalum	" 208
Mœringia	" 39	Ornithopus	" 64
Molinia	" 232	Orobanche	" 158
Molospermum	" 102	Orobus	" 68
Momordica	" 87	Osmunda	" 240
Monotropa	" 141	Ostrya	" 190
Montia	" 87	Oxalis	" 53
Morus	" 188	Oxiria	" 180
Muscari	" 211	Oxitropis	" 63
Myagrum	" 29		
Myosotis	" 148	Pæderota	" 157
Myricaria	" 85	Pæonia	" 17
Myriophyllum	" 84	Paliurus	" 54
Myristica	" 189	Pallenis	" 114
Myrrhils	" 102	Panicum	" 223
		Papaver	" 19
Najas	" 197	Paradisïa	" 208
Narcissus	" 205	Parietaria	" 187
Nardus	" 237	Paris	" 206
Nasturtium	" 20	Parnassia	" 33
Neottia	" 203	Passerina	" 182
Nepeta	" 166	Passiflora	" 87
Nerium	" 143	Pastinaca	" 99
Neslia	" 29	Pedicularis	" 159

Pelargonium	Pag. 53	Primula	Pag. 173
Peplis	" 83	Prunella	" 169
Persica	" 73	Prunus	" 71
Petasites	" 111	Psilurus	" 237
Petrocallis	" 26	Psycotria	" 107
Petroselinum	" 95	Pteris	" 342
Peucedanum	" 98	Pterocarpus	" 70
Phaca	" 62	Ptychotis	" 95
Phalaris	" 224	Pulegium	" 162
Phaseolus	" 68	Pulicaria	" 114
Philadelphus	" 85	Pulmonaria	" 168
Phillyrea	" 142	Punica	" 82
Phleum	" 223	Pyræthrum	" 119
Phoenix	" 198	Pyrola	" 141
Phragmites	" 227	Pyrus	" 80
Phyllocactus	" 90	Quassia	" 54
Physalis	" 151	Quercus	" 189
Phytoloma	" 136		
Phytolacca	" 177	Ranunculus	" 13
Pieris	" 128	Raphanus	" 29
Pilularia	" 239	Rapistrum	" 29
Pimpinella	" 94	Reseda	" 33
Pinguicula	" 171	Rhagadiolus	" 127
Pinus	" 194	Rhamnus	" 55
Piper	" 188	Rheum	" 182
Pistacia	" 55	Rhinanthus	" 160
Pisum	" 66	Rhincospora	" 215
Plantago	" 175	Rhodiola	" 88
Platanthera	" 201	Rhododendron	" 140
Platanus	" 193	Rhus	" 55
Pleurospermum	" 102	Ribes	" 90
Poa	" 231	Ricinus	" 186
Polyanthes	" 211	Robinia	" 69
Polycarpon	" 87	Rosa	" 77
Polycnemum	" 177	Rosmarinus	" 163
Polygala	" 33	Rubia	" 107
Polygonum	" 180	Rubus	" 74
Polypodium	" 240	Rumex	" 179
Polypogon	" 225	Ruscus	" 206
Polysticum	" 241	Ruta	" 53
Populus	" 192		
Portulaca	" 87	Saccharum	" 237
Potamogeton	" 196	Sagina	" 38
Potentilla	" 75	Sagittaria	" 196
Poterium	" 79	Sagus	" 198
Prenanthes	" 130		

Salix	Pag. 190	Smilax	Pag. 206
Salvia	" 163	Solanum	" 151
Salvinia	" 239	Soldanella	" 171
Sambucus	" 101	Solidago	" 113
Samolus	" 175	Sonchus	" 131
Sanguisorba	" 79	Sorbus	" 79
Sanicula	" 93	Sorgum	" 223
Santalum	" 70	Sparganium	" 198
Saponaria	" 36	Spartium	" 56
Sarothamnus	" 56	Specularia	" 139
Satureja	" 164	Spergula	" 38
Satyrium	" 203	Spinacia	" 179
Saussurea	" 125	Spiraea	" 73
Saxifraga	" 90	Spiranthes	" 201
Scabiosa	" 108	Stachys	" 167
Scandix	" 101	Stalagmitis	" 45
Schænus	" 215	Staphyléa	" 54
Scilla	" 209	Statice	" 175
Scirpus	" 216	Stellaria	" 60
Scleranthus	" 88	Stenactis	" 112
Scolopendrium	" 242	Stipa	" 227
Scorzonera	" 129	Streptopus	" 206
Scrophularia	" 154	Strycnos	" 144
Scutellaria	" 169	Styrax	" 141
Sécale	" 236	Succisa	" 109
Sedum	" 88	Suffrenia	" 85
Selaginella	" 239	Swertia	" 146
Selinum	" 98	Swietenia	" 47
Sempervivum	" 89	Sylibum	" 124
Seneciôla	" 29	Symphoricarpus	" 105
Senecio	" 120	Sympbitum	" 150
Serapias	" 202		
Serratula	" 125	Tamarindus	" 69
Séseli	" 96	Tamus	" 207
Sesleria	" 227	Tanacetum	" 117
Setaria	" 224	Taraxacum	" 130
Sherardia	" 105	Taxus	" 193
Sideritis	" 168	Tetragonolobus	" 62
Silauis	" 96	Teucrium	" 170
Silène	" 36	Thalictrum	" 41
Silybum	" 124	Thea	" 48
Sinapis	" 25	Theobroma	" 44
Siphonia	" 186	Thesium	" 183
Sison	" 95	Thlaspi	" 27
Sisymbrium	" 24	Thrinicia	" 128
Sium	" 94	Thymus	" 164

Thysselinum	Pag. 99	Valeriana	Pag. 107
Tilia	" 46	Valerianella	" 108
Toffeldia	" 212	Vallisneria	" 193
Tordylium	" 99	Veratrum	" 212
Törilis	" 101	Verbascum	" 152
Tozzia	" 159	Verbena	" 170
Tragopogon	" 129	Veronica	" 155
Trapa	" 83	Viburnum	" 104
Tribulus	" 53	Vicia	" 64
Trifolium	" 59	Villarsia	" 144
Triglochin	" 196	Vinca	" 143
Trigonella	" 59	Viola	" 31
Trinia	" 93	Viscum	" 103
Triodia	" 230	Vitex	" 170
Triticum	" 235	Vitis	" 48
Trixago	" 161	Zannichèlia	" 197
Trollius	" 52	Zea	" 222
Tropaeolum	" 52	Zingiber	" 199
Tuja	" 194	Zinnia	" 122
Tunica	" 207	Zizyphus	" 51
Tulipa	" 34	Kentrophyllum	" 125
Turgenia	" 101	Kernera	" 27
Turritis	" 21	Knantia	" 109
Tussilago	" 111	Kochia	" 177
Typha	" 198	Kœleria	" 228
Ulmus	" 188	Xanthium	" 136
Urtica	" 187	Xeranthemum	" 127
Urèdo	" 222	Wiborgia	" 113
Utricularia	" 171		
Vaccinium	" 139		

INDICE DEI NOMI VOLGARI

Acacia	Pag. 70	Arans	2 Pag. 47
Al	210	Arèle	227
" de biss	209	Arnica	120
" de luff	208, 209, 211 bis	Articiòc	124
" salvadeg	210 bis	" salvadeg	125
Agramonia	77	Articiocchi	123
Albarèla	193	Arsis	100, 211
" molenera	192	Asfor	125
Albaròt	193	Assafètida	98
Albera	193	Assensio	116
" molenera	192	Avèss	191
" pina	193	Azalèa	140
Albicòc	72	Azarèla	79
Alèlūja	53 bis	Azer	46
" zalda	53	" bastard	46
Aliana bianca	46	Bàcara	174
" rossa	48	" senza udùr	174
Aloè	211	Bagati	142
Altèa	44	Bale de nev.	101
Amarant	177	Bagolèr	82
Amaro-calice	211	Halòta	168
Ambrogn	117	Balsarèza	126
Ambrogn mas-cc	117	Balsem de Copai	70
" bastard	117	Halunsi	131
Ambrognaga	72	Bambù	237
Ampoma	74	Harba de bec	129 bis
Amur perfet	16 bis	Bardana	124 bis
Anasse bianche	18	" minur	136
" zalde	19	Basalèco	161
Ananàs	73, 211	" gross.	164
Anegàl	150	Bazi	16
" de mont	150	Bec d'ozèl	52
Anèt	97	Bèdola	193
Angūria	86	Bei òm	53
Ansiana	146	Bela de drè	179
Ansianella	143, bis 146	Bela dòna	151
Antà	104	Beretine de pret.	54 bis
Antana		Bergamota	48
Antanel			

Berzami	Pag. 48
Berzamina grossa	48
" gentile	49
Betonega	168
Biàa	229
" salvadega 229 bis, 234	
Biancù	79
Bioscù	54
Bidù	176
Bira	187
Boca de ca	153
" zalda	155
Bombàs	44
Bonaòs-cc	44
Bonàghe	124 bis
Bonàgre	57
Borài	150
Boriline de ruer	190
Bràgosse	97
" salvadeghe	97
Brùcoi	25
Brogne del meschi	71
" porchère	71
" salvadeghe	71 bis
" sarèze	71
Brognèl	71
Brognèla (ùva)	49
Brognine negre	71
" verde	71
" zalde	71
Brognò-cc	71
Brössie	222
Brüc	140
Brünèla	169 bis
Brüzaboca	180
Brüzacùl	77
Brüzafer	161
Brüza-cc	45
Brüsarèl	160 bis
Bùlighi	136
Buligù	136
Cacào	44
Cafè	69, 107
Càlem	72
Calicanto	18

Calmèder	Pag. 170
Calse de cœc	143
Calse e braghe	16 bis
Camamèla	119
" salvadega	118
Cambrössen	142
Cambrössol	142
Camèlia	48
Campanele	138 bis
Campanili	146
Campanù de sess	147
Canparò-cc	204
Campüren	16 bis
" vert	16
Cana	227
" de søcher	237
" d'India grossa	211
" d'India sitila	211
Canarò-cc	98
Cànef	187
" salvadeg	110, 167
Canèla	182
Cànfora	182
Cano-cc	97
Cantagal	139
Caoi flur	25
Capelòcc	111
Capelvener	252
" bastard	252
Càpero	30 bis
Capilèr	252
Capiline de pret	51
Carbù del formentù	222
Cardo	123, 124
Car de fè	130
Carèze 215 , bis 219, 220, 221 bis	
Carezècc 218, 219, 220	
Carezòt 198, 216 , bis 222	
Carizi 212, 213 , bis 214, 215 , bis	
Carezù	198, 204
Carlina	125
Carnièla	143
Carmi (colore)	90
Carota	100
Càrpen	190
Càssia	69

Castegna . . .	Pag. 189	Cue de luf . . .	Pag. 159
" amara . . .	16	" de rœze . . .	85
Castegnœle 83, 199, bis	200 bis	" de sorœc . . .	148
" bianche . . .	199 bis	" de volp . . .	73
Catrâm (resina) . . .	195	Cûer . . .	223
Caver zald . . .	174	Cuina . . .	224 bis 225 bis
Cedro . . .	47	Cutù . . .	41
Cedro del Libano . . .	195		
Cechingi . . .	151		
China . . .	107	Dalia . . .	122
Chinœta . . .	48	Danèt . . .	117
Cicia bossi . . .	166	Dâtolo (frutto) . . .	198
" bianco . . .	166	Dentanœla . . .	23, 69
Ciodei . . .	36	Didai . . .	154
Coc . . .	198	Didaline . . .	154
Coca . . .	195	Digitâl . . .	154
Co d'elefant . . .	146	Discipline . . .	177
Cocardine zalde . . .	16	Diûmo . . .	164
Cocleargia } . . .	22	Dragant (resina) . . .	63
Coclearia } . . .		Dragù . . .	117
Cocleariôt . . .	15	Droghe . . .	111
Côcola . . .	18	Ducaamara . . .	151
Cojò de ca . . .	199, 200		
Coloquinzia . . .	87	Èhano . . .	144
Colsât } . . .	25	Èghen . . .	56 bis
Consêr } . . .		Èles . . .	190
Comi . . .	103	Embrogna . . .	72
Copai (balsem) . . .	70	Empêsec . . .	55
Corbêl . . .	80	Emperatoria . . .	90
" salvadeg . . .	79	Èna . . .	229
Coriândol . . .	103	" salvadega . . .	229 bis
Cornâl . . .	103	Èndec . . .	69
Cornazêi . . .	69	Endormia . . .	152
Cornicela . . .	56 bis	Endivia . . .	127
Corva (uva) . . .	49	Engûria . . .	86
Cœgià-pirù . . .	62	" moscadœla . . .	86
Cœcœmer . . .	87	Ensalata d'âzen 93	127
" d'âzen . . .	87	" d'âzen vicela . . .	93
Cœden . . .	55	Ensens . . .	56
Cren . . .	27	Erba achêra . . .	148
Crêspola . . .	119	" amara . . .	119
Crispi . . .	18	" artètica . . .	169
Crotontiglio (olio) . . .	186	" benedœta . . .	74
Cue d'âzen . . .	238	" borsa . . .	29
" de câal . . .	238	" brùnela . . .	164 bis
" de foss . . .	84, 85	" caguna . . .	182

Erba camossèra .	Pag	13
" canèla .		52
" castegnèra .		159 bis
" cazonsela .		117
" che fa cantà le galine		173
" che spoessa	102, 103	
" che spoessa de bacalà		177
" china .	144, 170	
" de biss .		16
" de càl .		88
" dei ga-cc .		166
" del lat zald .		19
" de mœs-cc .		52
" de moròidi .		153
" de piœgg .		47
" de S. Giacom .		121
" de S. Gioan	45, 170, 179	
" de S. Maria .	169 bis	
" de S. Polonia .	152 bis	
" de S. Roc .		52
" de siateghe .		28
" de la Madona .		181
" de tòi .		171
" diauluna .		162
" falcuna .		24
" fenocèla .		224
" ghislèta .	169 bis	
" gialdina .		125
" grassa .		36
" issighèta .		37
" iva .		170
" latarœla .	184, 185 bis	
" legn .		116
" lerghèta .		236
" limunsina }		170
" luigia }		
" luna .		97
" maga .		83
" maistra .		49
" manteca .		186
" martilina .		143
" massœchina .		227
" mèdica .		58
" milsèra .		212
" mora }		154
" morela }		

Erba moscadela .	Pag.	163
" pèr .		52
" péer .	52, 180	
" persighina .		79
" per la fèer .		113
" per la roгна .		102
" per le sœmèghe	114, 120	
" piltrina .		238
" picègèra .		239
" poeiza .		167
" qua-cc .		107
" ranina	84 bis, 197, 198 bis, 239	
" regina .		114
" rœsa .		52
" rûga .		53
" sabina .		194
" salina .	53, 179 bis	
" santa .		117
" seda .		224
" segrezœla }		164
" segrezina }		
" selestina .	148, 159	
" semper via .	89 bis	
" serpentària .		208
" setronèla .		165
" sœmèga .		187
" spigarœla .		236
" stela .		78
" spagna .		58
" " salvadega	58, 64	
" tajadûza .		118
" terèstra .		166
" trementina .		118
" vedreœla .		187
Erbe .		178
Esòpo .		165
Essa .		65 bis
" piccola .		66
" salvadega .		65 bis
Essina .		63
Essuna .		64
Eufrasia .		161
Ezel }		56
Ezèn }		

Faa	Pag. 65	Figadela	Pag. 12
Faa goza	126	Finòcc	97
Faa grassa	88	" salvadeg	94, 95
Faa grega	57	Fiur d'arzent	26
Faèta	65	" de carizi	205
Falcuna	25	" de la Madona	208
Falò	212	" de lana	116
Fambros	74	" de luff	124
Far	236	" de mort	143 bis
Farfara	111	" de nev	205
Farinèi	177, 178 bis	" de paradìs	85
Fazœi	68	" de passiù	87
Fazœi cremonès	68	" de rass	26
" de la regina	68	" de S Gioàn	207
" grass	68	" d'inverno	120
" marmori	68	" ress	152
" nani	68	Fiuras	158
" negher	69	Fiure	187
" nostrà	68	Fò	189
" rampigbi	68	Forbizine	113 bis
" ross	68	" de ria	113
" temporicc	69	Forment	235
Fazoli bianc	69	" corezœl	235
" del œci	69	" corezœl ross	235
" negher e zalec	69	" gross ross	236
Fazoline bianche	69	" gros selest	236
Fazœi caffè	69	" marsœl	235
Fasœi de bosc	207	" senza barba	235
Fèles	240, 241 bis	Formentù	222
" dell'acquila	242	" de colliura }	222
" femina	241	" gross }	222
" mas-cc	241	" ostanel	222
Felizina 240, bis, 244 bis, 242		" quaranti	222
" de mür	241	Formentù negher	181
Fenocèla	95	Fom	20, 140
Feno-cc	97	Fraina	336
" salvadeg	97	Frassen	142
Fic	187	Frassinèla	53
" beriti	188	Furasac	234 bis 235 bis
" de la gossa	187	Gabüss	24
" de la Madona	188	Gaie	190
" de la marca	188	Galbèna }	62
" nègher	188	Galèga {	179 bis
" salvadeg	187	Galèi	180
" ver-cc	188	" de luff	180
" d'India	90		

Gali . . .	Pag. 56
Garansa . . .	107
Garnère . . .	140, 177
Garofol salvadeg . . .	35
" piœmi . . .	35
" veludi . . .	36
Garofol, Ciodei . . .	36
Garofolada . . .	74
" de foss . . .	74
" de mont . . .	74
Garofolete . . .	36
Garofoline de camp . . .	34
" salvadeghe . . .	36
Garofoli a massecc . . .	35
" de mont . . .	35
" selès-cc . . .	126
Garze-cc de ciòs . . .	123
" de rie . . .	131
Garzù . . .	123
Gàtol . . .	192
" de montagna . . .	192
Gazia . . .	70
Gelosie . . .	177
Gensiana . . .	146
" falsa . . .	146
Geranio salvadeg . . .	50, 51 bis
" de mont . . .	51
" de prat . . .	51
Gialdina . . .	125
Giassint . . .	211
" salvadeg . . .	105
Ginestra . . .	56 bis, 140
Ginestrina . . .	57
Gionchiglie . . .	205
Girasùl . . .	113
Glizù . . .	139 bis
" ross . . .	139
Glòtù . . .	38
" salvadeg . . .	38
" ross . . .	38
Gomma . . .	70
" elastica . . .	186
" gota . . .	46
" laca . . .	188
Gosmine . . .	142
" salvadeghe . . .	38

Gosse de sang . . .	Pag. 13
Gramègna . . .	225, 225
Grana . . .	181
Grassèi . . .	108, bis
Grassù . . .	20, 22
" salvadeg . . .	156 bis
Grasiœla . . .	154
Grem . . .	235
Greste . . .	177
Gresta de gal . . .	160
Grisantèmo . . .	120
Grispignœla . . .	131 bis
Gropel . . .	49
Grozœle . . .	90
Grœm . . .	147 bis
Guad . . .	29
Guado . . .	
Guaine . . .	70
Guainèr . . .	70
Guainòt . . .	
Idassa . . .	11
" bastarda . . .	11
Idèle . . .	147
Iderèle . . .	
Idola . . .	11
Idorela . . .	
Ignà . . .	48
Ireos (polvere) . . .	204
Isòpo . . .	165
Issole . . .	72
It . . .	48
Laànda . . .	163 bis
Lacrime de la Madòna . . .	206
Laedù . . .	152, 153 bis
Lànsér . . .	29
Laoro . . .	182
" bastard . . .	72
" ceraso . . .	
Lapàs . . .	179
Làres . . .	194
Latarœi . . .	184, 185 bis, 186
Latüga 'mbregada . . .	131
" 'ngabuzada . . .	131
" 'nressolada . . .	131

Latüga romana	Pag. 131	Maigola	Pag. 100, 201
" salvadega	131	" bastarda	52
Lazaröla	79	Maine	179, 180 bis
Leander	144	Wainö-cc	179, 180
" salvadeg	143	Maläeghe	57
Legn bianc	105	" zalde	58
" de quassia	54	Mali	80
" dols	70	Malva	43
" negher	55	" ressa	44
" quader	54	" salvadega	52
" rodio	88	Malvazia (uva)	49
" sant	54	Malvèta	44
" tiäoro	70	Malvina	44
Lègnass	190	Malvöt	43
Lelli	206	Malvâ	44
" salvadeg	206 bis	Mana	142
Lengua de ca	176	Mandole	72
" de bo 149, 150,	198	" amare	73
Lentâ mas-cc	104	" dure	72
Lentana	104	" secarele	72
Lentécia	66	Mandrägola	152
Less	190	Manine	200
Li	43	Mantèca	186
" salvadeg	43 bis	Maolö-cc	75
Liga	107	Maole de mont	75
Ligabosc	103	" d'ortaja	75
" sic fœ	50	" salvadeghe	75
Lilla	142	Mapel	17
Limù dols	47	Maràee	176
" genoès	47	" americane	176
" gropolùs	47	Maregiana	152
" maderni	47	Marëndol	77
" manine	47	Marene	72
" mazeng	47	Marenele	151
" pianta ressa	47	Marenù	72
Loertis	187	Margaritine	112
Löi	236, 237	Margaritune	119
Lui	57	Maròss	193
Lussignœl	45	Marœzen	80
Macis	189	Martel	184
Madöi	49	Martili	139
Madenine	49 bis	Martilina	34
" smorte	49	Marù	189
Magnòlia	18	Massœchè-cc	198
Majalegor	57, 63	Massœchi	198
		Massœcù	198

Matrical . . .	Pag. 119
Mazzerana . . .	164
" de mont . . .	164
'Mbrunesca (uva) . . .	49
Medàe . . .	26
Mèdec gros . . .	116
" gentil . . .	117
Mèi . . .	224
Melansàna . . .	152
Melga negra . . .	223
" rossa . . .	223
" spargola . . .	223
" bianca . . .	223
Melgher . . .	223
Melghèta . . .	
Melissa . . .	165
Melù . . .	87
Milù . . .	
Menta . . .	162 bis
" de foss . . .	162
Mercorela . . .	186
" bastarda . . .	186
Merda del diaol . . .	98
" de gat . . .	104
Mestolasse . . .	196
Mèstole . . .	
Miglionèt . . .	33
" salvadeg . . .	33 bis
Migliol . . .	82
Mòghen . . .	47
Mordène . . .	140
" pelùze . . .	140
More . . .	74 bis
" de ria . . .	74
" rosse . . .	74
Moscatel (uva) . . .	49
Mœg . . .	194
Mur . . .	188
Müs-ci . . .	211 bis
Müscio greco . . .	211
Naasse . . .	18
Narans . . .	47
" dols . . .	48
" sanguani . . .	48

Naròncol . . .	Pag. 15
Narsiss . . .	211
" salvadeg . . .	209
Näss . . .	193
Nastroessie . . .	52
Naù . . .	25 bis
Nazarœle . . .	79
Nèspol . . .	80
" del Gipòne . . .	80
Nessœle . . .	190
Nessœla longa . . .	190
" tonda . . .	190
Nessolœc . . .	190
Niofa . . .	18
Nispoline . . .	80
Nuss . . .	188
" moscada . . .	189
" vomica . . .	144
" sœchèra . . .	189
Olane . . .	190
Oles . . .	104
Olia . . .	142
Omassi . . .	200
Onès . . .	193
" salvadeg . . .	53
Onizi . . .	53
Opol . . .	46
Opolèt . . .	46
Orcanèt . . .	148
Orèce d'azen . . .	173
Orècla d'ors . . .	174
Oriana . . .	30
Oricine . . .	89 bis
Oreciù . . .	88
Orgna . . .	55
Ormadel . . .	188
Ormizi . . .	
Ors . . .	236
Osmari . . .	163
Ortensia . . .	92
Ortiga . . .	187 bis
" bianca . . .	166
" zalda . . .	166
Ortighela . . .	187
Ortigocc . . .	166

Ozili al spe-cc . . .	Pag. 202 bis	Per salvadeg . . .	Pag. 80
OEcc de bo . . .	114	" botèr . . .	80
OEv de vas . . .	152	" biœ-cc e bu . . .	80
OEv de sa-cc . . .	171 bis	" d' autùno . . .	81
OEza . . .	152	" del doce . . .	81
		" de spina . . .	81
Paarina . . .	40	" gnòo . . .	81
" grossa . . .	41	" limùnsi . . .	81
Pabol . . .	224 bis	" moscatei . . .	81
" rampighi . . .	225	" pirle . . .	81
Paciùc . . .	179	" rœzegn . . .	81
Pa de cùco . . .	151	" san Zermà . . .	81
Paerà . . .	79	" tœrc . . .	81
Paghèra . . .	194	" verdi longhi . . .	81
Pamfoi . . .	142	Peroli de S. Piero . . .	81
Panadi de la Madona . . .	104	Per del Gipone . . .	82
Panic . . .	224	Per de tera . . .	113
Pancùc . . .	179	Perète . . .	48
Panvi . . .	179 bis	Perfèt amùr . . .	46
Papaciùc de luff . . .	198	Perforàda . . .	45
Papàer . . .	19	Perlèt } . . .	82
Paradèi . . .	126	Perli } . . .	82
Pastenàghe } . . .	99	Persec . . .	73
Pastenadeghe } . . .		" de la Madalena . . .	73
Patata . . .	151	" che sa lasa de pasta	
Pecaquana . . .	107	bianca . . .	73
Pedenèbol . . .	15 bis	" verda . . .	73
" de foss . . .	15	" sanguani . . .	73
Pe-de-pol . . .	76 bis	" moscatèl bianc . . .	73
Pedersòm . . .	95	" che sa te bianc . . .	73
" velenus . . .	97	" codogn che sa te . . .	73
Pèer . . .	188	" codogn chesa lassa . . .	73
Pèer d' acqua . . .	180	" müsù . . .	73
Pèerèl . . .	164	" nuss . . .	73
Pèerù . . .	152	Pi . . .	194
Pègola (resina) . . .	195	" salvadeg . . .	194
Pelcèzèla . . .	133	Piantana . . .	175 bis
Penà-cc . . .	217 bis	" de foss . . .	196
Penaci . . .	217 bis	Pigna . . .	195
Pèndol . . .	191 bis	Pignœi (seme) . . .	195
Penine . . .	227	Pignatine . . .	79
Pensèr . . .	32	Piloti . . .	144
" salvadeg . . .	32	Pimpinèla . . .	79
" viœla . . .	32	Plùpa . . .	193
Peonia . . .	17	Piœ-gg . . .	150
" salvadega . . .	17, 18	Piœmine . . .	227

Pirœi	Pag. 79
Pisagrega (resina)	195
Pistac	55
» salvadeg	54
Platen	193
Polmonéra	148
Polver per le sœmeghe	120
Polzi	202
Pom salvadeg	81
» apiù	81
» calamâr	81
» corai	81
» rœzegn	81
Pomasse rosse	82
» verde	82
Pomates	152
Pomele	81
» sœcherine	82
Pom codogn	80
» de tera	151
» d'Adamo	48
» granât	82
» lazari	79
» sant	141
» d'or	152
Por	208
» salvadeg	208
Porselâga	87
Porselâna	143
Portogâl	47
Pœleza	167
Pœlezœl	165
Prat ross	59
Prat caali	53 bis
Prazûre	121 bis
Prezoli	15
Primaëra	173 bis
Qua-cc	107
Quassia	54
Raanêl blanc	30
» ross	30
» salvadeg	30
Râdica	140
Radis de Zœi	204

Râe salvadeghe	Pag. 25
» bianche	25
» rosse	25
» de mont	25
Raa vieda	178
Ragn	16
Rais de de bo	16
Raissù	25
Ramolas	30
» negher	30
» blanc	30
Ramolassi	138
Rampônso	197
Ranêla	239
Ranina	197 bis, 237
Ratafiâ	127
Redê-cc	127
» salvadeg	127
Redecine	140
Rêgogna	140
Regolessia	70, 240, 242
Renegâl	130
Reobârbaro	182
Ress de dama	33
Ressêda	90
Ribes	186
Ricino	111
Ridoi	111
» blanc	225
Riss	88, 89 bis
» del diaol	225
» mat	89
» ross	89
» grass	66
Roajôt	66
» gross	66
» salvadeg	66
Roajoti	111
Rôdoi	74
Roêda	184, 185 bis
Rogna	188
Romiglie	49
Rossêra (uva)	18
Rozolie	145
Rœbâghe	107
Rœbia	107

Ròbia salvadega	Pag. 107	Sanguani	}	Pag. 103
Ròmes	179 bis, 180 bis	Sanguen		
Ròss	55	Santonina (medicin.)		117
Rèze	77	Santrigola		210
Rèza	17	Saponaria		36
Rèze de la tepa	78	Saradèl		189 bis
» de mont	77	Sareze bianche		72
» de sento foe	78	» negre		72
» de sess	77	» rosse		72
» de sess rossa	78	» temporide		72
» del meschi	78	Sarizi salvadeg ross		71
» d'ogni temp	78	» negher		71
» ordinaria	78	Sarizi bastard	71 104 bis	105
» salvadega	77 bis	Sarvezi salvadeg		163
» salvadega rossa	78	Sbri		191 bis
» zalda	78	Scabiuza		109
Rozina	78	Scalete		94
Rozine de Spagna	78	Scalogua		210
Rosolie	19	Scamonèa		147
Rùer	189 bis	» zalda		45
Rùbina	{	Scandèla		236
Rùbi		Scamfoi		142
» senza spi	69	Scarpine de la Madona	62 bis	
» ombrele	69	Scarpa laès		55
Rùga	53	Scartossi		97
Rùm (liquore)	237	S-cèrcia salvadega		167
		Scheletro d'ozèl		146
Sabadiglia	212	S-clàa	{	uva
Safrà	204	S-claèta		49
Safranù	125	S-cioparai		62
Safrà salvadeg	121, 204	S-ciopi		36
Sagù (farina)	198	S-ciopù		145
Salès	191	Sclarèa		163
» de sestèi	191	Segrezela		181
» piangente	192	Scorlândoi		79
Salèzèt de rie	191	Scorlò-cc		179
Salghet	190 bis, 191 bis	Scórsoi		140
Salsapariglia	206	Scorsonèra		129
Salvia	163	Schøden		58
» de prat	163	Scue		177
» splendida	163	Sdormia		19
Sambüc	104	Sedro		47
» ross	104	Sèghel		236
Sambughina	104	» cornüta		236
Sàndol	70	Segrezina	{	164
Sandraca (resina)	198	Segrezela		

Sogrezèla salvadega	Pag. 164
Selèno	95
• bastard	13
Seme-sante	177
Semestrel	223
Sempitèrni blanc	117
• d'or	116
• de mont	116
• ross	177
• salvadeg	116
• solfer	116
Sena	69
Sena be sena mal	62
Senàer	26 bis
• bastard	26
Ser	189
Seradèl	189 bis
Serfol	101
Setronèla	165
Sèzer	61
Sezercia	67
• salvadega	67 bis
Sgars salvadeg	108 109
Siberia	181
Sibörgole	212
Sic foe	76 bis
• blanc	76
Sicomòro	46, 152, 188
Sicoria	130
Stèuta	95, 97, 102 lis
Sigùta	
Sigola	210
• pomasca	210
• rossa	210
Sigolèt	210
Silapa	147
Simarùga	53
Sinforgha	105
Siparo	215
Siprèss	194
Siziml	139 bis
• bianc	139 nota
• salvadeg	139
Slavàs	178
Smansarine	227
Smassete	117

Smorffa	Pag. 69
Soldarèla	171
Solfer d'erba	239
Sominsina	27
Nominsine sante	117
Soncù	131
Sospir	112
Sèche	86
• barèche	86
• bûze	86
• de cioss	86
• del vi	86
• marine	86
• sante	86
• trombe	86
Sèche salvadeghe	86
Sèchiline	86
Sèchili salvadeg	181
Sèchine de cami	86
• turchè	86
Sècher	237
Semàc	55
Sèza	102
Spadine	201
Spadù	211
Sparès	206
• de mont	73
• salvadeg	205
Speronele	17
• salvadeghe	17
Spi bianchèr	79
• brognèi	71
• d'azen	127
• de capèla	51
• del Signùr	69
• de roèda	71
• de salezèt	80
• morel	55
• servi	
• zardi	55
Spilù	52
Spinacristi	69
Spinacorèc	206
Spinàss	123
Spinasse	179
Spine	58

Sprela . . .	Pag. 238
• prezoli . . .	15
Stalaàs . . .	18
Stele . . .	14, 15
Störe . . .	216
Stermonio . . .	152
Stirâce . . .	441
Stopacül . . .	77
Strafüzare . . .	17
Stragonsèl . . .	117
Stringùla bo . . .	159
Strobliù . . .	123
Stropèi . . .	191
• ross . . .	191
• salvadeg . . .	191
• zal-cc . . .	191
Sræt . . .	236
Sùer . . .	190
Tabàc . . .	152
Tacamà . . .	105, 106
Tàer . . .	190
Tàera . . .	190
Tajaduza . . .	118
• zalda . . .	118
Taja goss . . .	223
Tamarindo . . .	69
Tapiùca . . .	187
Tass . . .	193
Tas barbàss . . .	152, 153 bis
Tassèta . . .	205
• salvadega . . .	205 bis
• de mont . . .	205
Te . . .	48
• de mont . . .	156 bis
Tej . . .	46 bis
Tend a l'ort . . .	186
Teta bossi . . .	166
Tetù . . .	166
Timo . . .	164
• salvadeg . . .	164
• pelùs . . .	164
Tira caèl . . .	136 bis
Tossec . . .	207
• negher . . .	151

Tossec ross . . .	Pag. 151
Trefòl caali salvadeg . . .	60
• fibrì . . .	144
• gätol . . .	60
• ladi . . .	61
• ross . . .	59, 60
• zald . . .	61
Trefoi . . .	61
Tremarei . . .	230 bis
Trementina . . .	195
Trifole bastarde . . .	113
Turnasul . . .	187
Tüa . . .	191
Tüberòsa . . .	211
Tülipà . . .	207
• salvadeg . . .	207
Tülipani . . .	207
Ua . . .	48
• aliana bianca . . .	48
• aliana rossa . . .	48
• americana . . .	50
• berzamina grossa . . .	48
• berzanina gentila . . .	49
• brognœla . . .	49
• cangiòta . . .	50
• corva . . .	49
• corva del angüa . . .	49
• de la Madona . . .	18
• erba-mat . . .	49
• gropèla . . .	49
• Isabèla . . .	50
• malvazia bianca . . .	49
• malvazia negra . . .	49
• marina . . .	90
• 'mbrunesca bianca . . .	49
• . . . rossa . . .	49
• . . . negra . . .	49
• molenèra . . .	49
• moscatela bianca . . .	49
• . . . rossa . . .	49
• negrèra . . .	49
• passa . . .	50
• rossera . . .	49
• s-ciaa, s-claèta . . .	49
• Spagna . . .	171

Ua uzilina	Pag. 49	Vidàrbola	Pag. 41
• vernassa negra	49	Vigna	48
• vernassa bianca	50	Viœia	31
• vernassù	50	• bastarda	31
• Zebèbo blanc	50	• bianca	31
• • ross	50	• mata	32
• • moscatel	50	• rossa	20
• lambresca	50	• salvadega	24
Uciù	130	• sopa	31
Ules	103	• zalda	20, 173
Ulem	188	Viœline molenere	173
Uzili al specc	202 bis	Vissole	72
Valeriana	107	Vit	48
Vaniglia	151, 203	Zamarèi	57, 58
• salvadega	151	Zebèbo blanc	50
Vèdolne	110	• moscatel	50
Vedoine salvad. 109 bis,	110	• ross	50
• de mont	110	Zei de mont	207
Vedreœla	187	• de S. Antone	207
Velâr }	212	• de spada	204
Velâdri }	212	• ross	207
• scûr	212	• seles-cc	204
Veludi (garofol)	36	Zenèr	194 bis
Vena	229	Zenèstra	86 bis
Vernassa (uva)	49, 50	Zenevri	90
Veronica	156 bis, 157	Zenzèr	199
Vers	24	Zigol 212, 213 bis, 214,	215, 216 bis
• rae	25	Zigoli 213 bis, 215, 216 bis	216 bis
Verzi	70, 177	Zigol triangolat 215 bis 216 bis	215 bis
Verzò-cc	25	Zigoli triangolat	215
Verzoli	37	Zinia	122
Ves-cc	103	Zizola }	54
Vessa	65 bis	Zœbia }	11
• piccola	66	Zûta	94
Vessina	65	Kimel	94
Vessuna	64		
Viadù	176 bis		



				ERRATA	CORRIGE
Pag.	1	l.in.	30	Flumaricæ	Fumaricæ
"	20	"	6	Ditarnola	Ditaruola
"	27	"	27	Asarifolia	asarifolia
"	46	"	2	Tilla	Tilia
"	46	"	25	saro	raro
"	50	"	7	rari	—
"	58	"	5	nutrix	natrix
"	83	"	28	It. Circea	It. Circèa
"	86	"	27	del cani	del camì
"	"	"	31	Citrillus	Citrullus
"	95	"	1	Egopodium	Ægopodium
"	119	"	13	Patyg.	Polyg.
"	120	"	3	Timo	Fiur
"	123	"	penult.	Erisithetes	Erisithales
"	135	"	8	Taquilli	Jaquinii
"	139	"	24	d'orzo	d'orso
"	143	"	17, 22	Cornicla	Carnicla
"	152	"	24	Maregiuna	Maregiana
"	"	"	penult.	Barabasco	Barabasco
"	"	"	ultima	Tas-barboss	Tas-barbàs
"	163	"	15	L.	8.
"	173	"	quartult.	Orecchio	Orecchia
"	177	"	7	biacn	blanc
"	181	"	14	Scorazzola	Scoreazola
"	183	"	22	Laurindæ	Laurineæ



A. 14/

Per L. Apollonio
G. Lanzetti Livetti

1109
414065





BRESCIA

Tip. Apollonio

1872





